




وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت بهداشت
دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس
اداره سلامت سالمندان

سیمای سلامت سالمندان

(جلد ۱)

شیوع عوامل خطر رفتاری



الرشيد الرحيم
الرحمن الرحيم

عنوان و نام پدیدآور/پدیدآورندگان: شیوع عوامل خطر رفتاری / نویسندگان محسن شتی... [و دیگران]. مشخصات نشر: قم: اندیشه ماندگار، ۱۴۰۱. مشخصات ظاهری: ۱۴۱ص:، جدول، نمودار: ۲۲×۲۹ س.م. فروست: سیمای سلامت سالمندان؛ [ج.۱]. شابک دوره: ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۸۲-۴۴-۷؛ شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۸۲-۰۰-۳

وضعیت فهرست نویسی: فیبا

یادداشت: نویسندگان فرشاد فرزادفر، سحر سعیدی مقدم، محسن شتی، سیده صالحه مرتضوی.

موضوع: سالمندان -- سلامتی و بهداشت -- ایران -- آمار Older people -- Health and hygiene -- Iran -- Statistics

سالمندان -- استعمال دخانیات -- ایران -- آمار Older people -- Tobacco use -- Iran -- Statistics

تمرین های ورزشی برای سالمندان -- ایران -- آمار Exercise for older people -- Iran -- Statistics

شناسه افزوده: شتی، محسن، ۱۳۵۰-

شناسه افزوده: سیمای سلامت سالمندان؛ [ج.۱].

رده بندی کنگره: RA۵۶۴/۸

رده بندی دیویی: ۶۱۳/۰۴۳۸

شماره کتابشناسی ملی: ۹۰۷۳۳۹۰

اطلاعات رکورد کتابشناسی: فیبا

سیمای سلامت سالمندان

شیوع عوامل خطر رفتاری

نویسندگان: فرشاد فرزاد فر، سحر سعیدی مقدم، محسن شتی، سیده صالحه مرتضوی

ناشر: اندیشه ماندگار

تیراژ: ۱۰۰ نسخه

نوبت چاپ: اول - ۱۴۰۱

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۸۲-۰۰-۳

شابک دوره: ۹۷۸-۶۰۰-۶۷۸۲-۴۴-۷

مجموعه سیمای سلامت سالمندان ایران، به سفارش اداره سلامت سالمندان، دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسط مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از پیمایش های انجام شده در سالیان گذشته تهیه شده و با حمایت صندوق جمعیت سازمان ملل متحد منتشر می گردد. ضمن تقدیر از صندوق جمعیت سازمان، ملل متحد بابت این حمایت، اعلام می دارد کلیه حقوق مادی و معنوی این مجموعه متعلق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بدیهی است استفاده از محتوا، بدون دخل و تصرف و تغییر در شاخص ها و به شرط ذکر منبع بلامانع است.

غیر قابل فروش



انتشارات اندیشه ماندگار

قم ■ خیابان صفائیه ■ انتهای کوی بیگدلی (شماره ۲۸)

نیش کوی شهید گلدوست ■ پلاک ۲۸۴

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۲۶۲۱۳-۰۲۵-۳۷۷۴۲۱۴۲-۳۷۷۳۶۱۶۵

۵	اسامی نویسندگان
۷	مقدمه
۹	راهنمای سیمای سلامت سالمندان در جمهوری اسلامی ایران
۱۱	کشور جمهوری اسلامی ایران
۱۵	آذربایجان شرقی
۱۹	آذربایجان غربی
۲۳	اردبیل
۲۷	اصفهان
۳۱	البرز
۳۵	ایلام
۳۹	بوشهر
۴۳	تهران
۴۷	چهارمحال و بختیاری
۵۱	خراسان جنوبی
۵۵	خراسان رضوی
۵۹	خراسان شمالی
۶۳	خوزستان
۶۷	زنجان
۷۱	سمنان
۷۵	سیستان و بلوچستان
۷۹	فارس
۸۳	قزوین
۸۷	قم
۹۱	کردستان

۹۵	کرمان
۹۹	کرمانشاه
۱۰۳	کهگیلویه و بویر احمد
۱۰۷	گلستان
۱۱۱	گیلان
۱۱۵	لرستان
۱۱۹	مازندران
۱۲۳	مرکزی
۱۲۷	هرمزگان
۱۳۱	همدان
۱۳۵	یزد

اسامی نویسندگان اصلی:

..... دکتر فرشاد فرزاد فر
..... سحر سعیدی مقدم
..... دکتر محسن شتی
..... دکتر سیده صالحه مرتضوی

زیر نظر:

..... دکتر سید حامد برکاتی - متخصص کودکان و نوزادان، دفتر سلامت
..... جمعیت خانواده و مدارس، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
..... دکتر محمدرضا صائینی - پزشک عمومی، MPH مدیریت بیماری ها، دفتر
..... سلامت جمعیت خانواده و مدارس، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

همکاران آمار به ترتیب حروف الفبا:

..... فروغ پژوهیان
..... مهتاب روحی فرد خلیل آباد
..... دکتر علی شیدایی
..... دکتر عرفان قاسمی
..... علی قنبری
..... دکتر کیمیا گوهری
..... مسعود مسینایی
..... دکتر پریناز مهدی پور
..... معین یوسفی

همکاران علمی به ترتیب حروف الفبا:

..... دکتر علیرضا احمدوند
..... دکتر سینا آزاد نجف آباد
..... زهرا اصفهانی
..... هانیه باقری
..... دکتر اشکان پورابهری
..... دکتر نیلوفر پیکری
..... دکتر شیرین جلالی نیا
..... دکتر شادی رحیم زاده
..... دکتر شهاب الدین رضایی
..... دکتر نازیلا رضایی
..... دکتر نگار رضایی

..... دکتر صدف سپانلو قاجاریه
 هانیه سهرابی
 یگانه شریف نژاد تهرانی
 دکتر زهرا شکری ورنیاب لنگرودی
 پرنیان شوییری
 دکتر محسن عباسی کنگوری
 دکتر علی غلامی
 یوسف فرضی
 دکتر سید هادی قمری
 دکتر سوگل کولجی
 رزا حق شناس لاکانی
 زینب شیرزاد مقدم
 دکتر شراره نیاکان کلهری

اسامی مشاورین به ترتیب حروف الفبا:

..... دکتر آبتین حیدرزاده
 دکتر بهرام دلاور
 دکتر رضا فدای وطن
 دکتر احمد دلبری
 دکتر شیما رئیسی
 دکتر فرشاد شریفی

همکاران (به ترتیب حروف الفبا) :

..... عاطفه خوشنواز
 اعظم دخت رحیمی
 دکتر مریم صلبی
 طیبه صیفوری
 دکتر منیژه مقدم
 دکتر مهدیه یزدان پناه راوری

بسمه تعالی

جمعیت جهان در حال سالمند شدن است. افزایش جمعیت سالمندان حاصل بهبود وضعیت بهداشتی، کاهش مرگ و میر، توسعه تکنولوژی و افزایش امید به زندگی است و به عنوان یکی از موفقیت‌های جوامع محسوب می‌شود. پیش‌بینی‌ها بیانگر این است که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۵۰، نسبت جمعیت بالای ۶۰ سال جهان تقریباً دو برابر خواهد شد و از ۱۲ درصد به ۲۲ درصد خواهد رسید و تا سال ۲۰۲۰، تعداد افراد ۶۰ ساله و مسن‌تر، از کودکان کمتر از ۵ سال بیشتر خواهد شد. در این بین، کشورهای رو به توسعه همچون ایران که تاکنون جمعیتی جوان داشته‌اند، به طور جدی‌تری نسبت به کشورهای توسعه یافته، با افزایش جمعیت سالمندان رو به رو خواهند بود و زمان کمتری برای برنامه‌ریزی جهت سالمندی جمعیت خود دارند. به گزارش سازمان جهانی بهداشت، در سال ۲۰۵۰ هشتاد درصد جمعیت سالمندان دنیا در کشورهای با درآمد پایین و متوسط زندگی خواهند کرد. پیش‌بینی‌های انجام شده بر اساس سرشماری‌های کشوری انجام شده در ایران نیز این مهم را مورد تأیید قرار داده است. باید این واقعیت را نیز مد نظر داشت که از سال ۱۴۲۰ شمسی، متولیدین دهه ۶۰ ایران به سنین سالمندی خواهند رسید و در واقع با انفجار جمعیت سالمند مواجه خواهیم شد. بنابراین در فرصت پیش روی بیست ساله، باید کشور را برای مواجهه با پدیده سالمندی آماده سازیم.

افزایش روز افزون جمعیت سالمندان با افزایش تعداد مبتلایان به بیماری‌های مزمن همراه است. براساس نتایج حاصل از مطالعات انجام شده، شیوع ابتلا به بیماری‌هایی نظیر فشارخون، دیابت، بیماری‌های قلبی-عروقی، سرطان‌ها، آرتریت و اختلالات روان‌پزشکی، با افزایش سن افزایش می‌یابد و آنچه شرایط سالمند را پیچیده‌تر می‌کند، ابتلای همزمان به این بیماری‌ها (هم ابتلایی) است که در جمعیت قابل ملاحظه‌ای از سالمندان دیده می‌شود. به علاوه سالخوردگی جمعیت، جوامع را با چالش‌هایی نظیر افزایش نسبت سرباری و کاهش نیروی کار، مسائل مرتبط با بیمه و بازنشستگی، مسائل مرتبط با مراقبت و مشکلات مربوط به آن مواجه می‌کند. بنابراین، رشد فزاینده جمعیت سالمند و پیامدهای آن باعث شده است که در اکثر جوامع، سالخوردگی جمعیت به عنوان مسئله‌ای مهم و اساسی مورد توجه قرار گیرد، چراکه، نبود برنامه‌ریزی مناسب برای پیشگیری از پیامدها و چالش‌های سالمندی، به ایجاد چالشی بزرگ در جامعه منجر خواهد شد.

بدیهی است که برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در حوزه سالمندی، مانند هر حوزه دیگری، نیازمند شواهد و مستندات علمی است. برنامه‌ریزی مبتنی بر شواهد با قرار دادن بهترین شواهد و مدارک موجود کمک می‌کند که تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد برنامه‌ها و پروژه‌ها اخذ شود و از آن در کنار تجارب، تخصص و قضاوت‌های فردی و جمعی، از شواهد و مستندات قابل اعتماد و اتکای حاصل از پژوهش‌های هدفمند، برای برنامه‌ریزی استفاده شود.

نظر به اینکه طی سال‌های اخیر، پژوهش ملی اختصاصی در حوزه سالمندی کشور انجام نشده است، برای آنکه بتوان با بهره‌گیری از مستندات علمی و شواهد متقن برای چالش‌ها و مشکلات این جمعیت روزافزون در کشور برنامه‌ریزی و سیاستگذاری نمود، اداره سلامت سالمندان دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس این معاونت، اقدام به طراحی و تدوین مجموعه‌ای متشکل از مهمترین شاخص‌های سلامت سالمندان، تحت عنوان سیمای سلامت سالمندان نموده است. در این مجموعه، که حاصل کار تیمی ارزشمند همکاران مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی تهران است، با رویکردی علمی، از داده‌های پژوهش‌های معتبر موجود مانند مطالعه‌ی بار بیماری‌ها، سوانح و حوادث و عوامل خطر در سطوح ملی و استانی (NASBOD^۱)، مطالعه جهانی بار بیماری‌ها (GBD^۲) و پیمایش ملی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر (STEPS^۳) استفاده شده و این داده‌ها برای جمعیت بالای ۶۰ سال، باز تحلیل شده است.

۱ National and Subnational Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors

۲ Global Burden of Diseases

۳ STEPwise Approach to NCD Risk Factor Surveillance

این اطلس‌ها، شامل شاخص‌های ذیل (به تفکیک جنسیت و گروه سنی سالمندی در سطوح ملی و استانی) است:

روند زمانی مرگ و شیوع، به تفکیک بیماری‌ها و مشکلات سلامتی از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷، شیوع عوامل خطر بیماری‌های غیر واگیر در سال ۲۰۱۶، روند زمانی بروز سرطان‌ها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶، روند زمانی بستری پذیری و بستری دهی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۸، روند زمانی شیوع عوامل خطر تغذیه‌ای از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷، روند زمانی شیوع عوامل خطر متابولیک از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶، روند زمانی شیوع عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی و مصرف دخانیات از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹.

هدف اصلی از طراحی و تدوین اطلس‌ها و الگوی بهره‌مندی از آنها، فراهم آوردن فرصتی برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مبتنی بر شواهد، به منظور ارتقاء کمی و کیفی زندگی سالمندان کشور و برقراری امکان مدیریت سلامت این گروه سنی در سطوح استانی و ملی است. پژوهشگران حوزه سلامت، اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان، سیاستگذاران ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، معاونین و زیرمجموعه ایشان و همچنین مدیران ارشد استانی، می‌توانند از اطلاعات موجود در اطلس‌ها استفاده نمایند. امید است علاوه بر ترویج مدیریت و تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد در سطوح ملی و منطقه‌ای، در نهایت سالمندان عزیز کشور نیز از برکات این اقدام ارزشمند بهره‌مند گردند.

دکتر حسین فرشیدی

معاون بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

راهنمای سیمای سلامت سالمندان (شیوع عوامل خطر رفتاری)

جهت گزارش شیوع عوامل خطر رفتاری از سری مجموعه گزاره برگ‌های سیمای سلامت سالمندان؛ از اطلاعات برآورد شده در مطالعه‌ی بار بیماری‌ها، سوانح و حوادث و عوامل خطر در سطوح ملی و استانی (NASBOD)^۱ استفاده شد. جمعیت مورد مطالعه شامل هر دو جنس، ۱۲ گروه سنی از ۱۸ سال تا ۷۵ سال و بالاتر (۱۸ تا ۲۴ سال و ۱۱ گروه سنی ۵ ساله)، ۳۱ استان و ۱۵ سال از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ در نظر گرفته شد. برای برآورد دو عامل خطر استعمال دخانیات و فعالیت فیزیکی ناکافی از داده‌های پیمایش ملی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر (STEPS) استفاده شد. برای محاسبه شیوع استعمال دخانیات؛ سوال مصرف روزانه سیگار در حال حاضر در داده‌های هفت دوره از این پیمایش در سال‌های ۱۳۸۳، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ استفاده شد. برای محاسبه شیوع فعالیت فیزیکی ناکافی از داده‌های شش دوره از این پیمایش استفاده شد؛ داده‌های سال ۱۳۸۳ به جهت هماهنگ نبودن پرسش‌ها در این سال با سایر سال‌ها کنار گذاشته شد. فعالیت فیزیکی براساس راهنمای تحلیل پرسشنامه جهانی فعالیت فیزیکی (GPAQ)^۲ محاسبه و شیوع کم تحرکی براساس کمتر از MET^۳ ۶۰۰ در نظر گرفته شد.

جهت برآورد شیوع این دو عامل خطر طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ از مدل فضایی-زمانی استفاده شد. شاخص ثروت، تعداد سال‌های تحصیل و میزان شهرنشینی به عنوان متغیرهای کمکی استفاده شده در این مدل آماری؛ از مطالعه‌ی ملی هزینه و درآمد خانوار و همچنین داده‌های سرشماری که توسط مرکز آمار ایران انجام شده بود، استخراج شدند. نتایج در قالب شیوع (خام یا استاندارد شده‌ی سنی) گزارش شده‌اند. جهت محاسبه‌ی درصد خام شیوع؛ تعداد موارد هر استان در هر سال بر جمعیت همان استان در هر سال تقسیم و سپس در صد ضرب شده است. جهت ایجاد امکان مقایسه بین استان‌های مختلف؛ اطلاعات شیوع علاوه بر درصد خام به صورت درصد استاندارد شده‌ی سنی نیز گزارش شده است. در واقع برای مقایسه‌ی درصد شیوع در دو استان؛ درصد خام شیوع شاخص مناسبی نیست، زیرا درصد شیوع تنها هنگامی قابل مقایسه با یکدیگر هستند که جمعیت پایه‌ی آن‌ها قابل مقایسه باشند. با انجام تطبیق سنی یا استاندارد کردن سنی اثر مخدوش‌کننده اختلاف ساختارهای سنی از بین می‌رود و یک درصد شیوع ساده تطبیق‌شده یا استاندارد بدست می‌آید که می‌توان درصدهای شیوع را مستقیماً بین استان‌های مختلف مقایسه کرد. در نمودارها درصدهای استاندارد شده سنی شیوع گزارش شده‌اند و می‌توان درصدهای شیوع را مستقیماً بین استان‌های مختلف مقایسه کرد. در گزاره برگ‌های ملی و استانی تمامی درصدهای شیوع همراه با یک رقم اعشار گزارش شده‌اند.

در ادامه توضیحات مربوط به گزاره برگ‌های ملی و استانی به تفکیک هر صفحه ذکر شده است:

- در صفحه‌ی اول گزاره برگ‌های ملی و استانی توضیح کلی مختص هر گزاره برگ همراه با کلیاتی از تفسیر نتایج آورده شده است.
- در جدول صفحه‌ی دوم و سوم گزاره برگ‌های ملی و استانی درصد شیوع فعالیت فیزیکی ناکافی و استعمال دخانیات به تفکیک گروه سنی و جنسیت برای هر استان یا ملی در قالب جدول گزارش شده است. در این جدول درصدهای شیوع به صورت خام گزارش شده‌اند و امکان مقایسه اطلاعات این جدول با جداول سایر استان‌ها و یا ملی وجود ندارد. براساس این جدول برای مثال عدد ۷۱/۰ در سال ۲۰۱۹ (سال ۱۳۹۸) در گزاره برگ ملی نشان می‌دهد که از هر صد نفر زن بالای ۱۸ سال در کشور؛ ۷۱ نفر

^۱ National and Subnational Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors

^۲ Global Physical Activity Questionnaire

^۳ Metabolic Equivalent of Task

زن فعالیت فیزیکی کافی ندارد و از هر صد نفر زن در گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال ساکن کشور این عدد حدوداً ۶۹ نفر و از هر صد نفر زن سالمند ۶۰ سال و بالاتر حدود ۷۵ نفر برآورد شده است.

• در نمودار سمت چپ صفحه‌ی دوم و سوم گزاره برگ‌های ملی و استانی؛ روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی فعالیت فیزیکی ناکافی و استعمال دخانیات به تفکیک جنسیت آورده شده است. عدد دقیق درصد شیوع استاندارد شده‌ی سنی برای سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۰۹، ۲۰۱۳، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ (سال‌های ۱۳۸۴، ۱۳۸۸، ۱۳۹۲، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸) به تفکیک جنسیت در قالب جدول پس از نمودار آورده شده است. با توجه به اینکه اعداد این جدول و نمودار به صورت شیوع استاندارد شده‌ی سنی هستند امکان مقایسه هر عامل خطر در هر گزاره برگ ملی و استانی و با استان‌های دیگر و ملی وجود دارد. لازم به ذکر است که مقیاس محور عمودی برای هر گزاره برگ ملی و استانی و هر عامل خطر رفتاری برای هر گزاره برگ متفاوت و با توجه به اعداد در سطح ملی و یا استانی در نظر گرفته شده است؛ لذا پیشنهاد می‌شود برای مقایسه از اطلاعات جدول استفاده شود.

• در نمودار سمت راست صفحه‌ی دوم و سوم گزاره برگ ملی؛ پراکندگی جغرافیایی شیوع استاندارد شده‌ی سنی برای هر عامل خطر در سطح استانی در سال ۲۰۱۹ (سال ۱۳۹۸) و در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در قالب نقشه همراه با کد HASC^۴ مختص هر استان و به تفکیک جنسیت گزارش شده است. با توجه به اینکه در این نقشه‌ها راهنمای طیف بندی برای زنان و مردان یکسان در نظر گرفته شده است؛ هر چه رنگ هر استان به سمت رنگ تیره‌تری نزدیک شود نشان می‌دهد که آن استان برای آن عامل خطر رفتاری دارای شیوع استاندارد شده‌ی سنی بیشتری در مقایسه با سایر استان‌ها در همان عامل خطر است. در واقع با استفاده از این نمودار به دنبال پیدا کردن الگوی جغرافیایی شیوع استاندارد شده‌ی سنی در کشور هستیم. لازم به ذکر است با توجه به اینکه نمودار براساس شیوع استاندارد شده‌ی سنی آماده شده است قابلیت مقایسه بین استان‌های مختلف وجود دارد. در هر گزاره برگ استانی؛ مقایسه هر استان با استان‌های همسایه خود براساس شیوع استاندارد شده‌ی سنی در سال ۲۰۱۹ (سال ۱۳۹۸) و به تفکیک جنسیت انجام شده است. در این نمودار؛ استان مختص هر گزاره برگ به عنوان استان اول در پایین نمودار در نظر گرفته شده است و سایر استان‌ها براساس حروف الفبای لاتین چیده شده‌اند. در این نمودار علاوه بر اینکه می‌توان شیوع استاندارد شده‌ی سنی را به تفکیک جنسیت در استان‌های همسایه مقایسه کرد؛ با توجه به اینکه مقیاس در محور افقی برای زنان و مردان و برای هر عامل خطر رفتاری در هر گزاره برگ استانی یکسان در نظر گرفته شده است؛ با بررسی خطوط عمودی موجود در نمودار می‌توان شیوع را در بین زنان و مردان و برای هر عامل خطر و در هر گزاره برگ مقایسه کرد.

کد HASC مختص هر استان:


اردبیل	AR	چهارمحال و بختیاری	CM	فارس	FA	گیلان	GI
اصفهان	ES	خراسان جنوبی	KJ	قزوین	QZ	لرستان	LO
البرز	AL	خراسان رضوی	KV	قم	QM	مازندران	MN
ایلام	IL	خراسان شمالی	KS	کردستان	KD	مرکزی	MK
آذربایجان شرقی	EA	خوزستان	KZ	کرمان	KE	هرمزگان	HG
آذربایجان غربی	WA	زنجان	ZA	کرمانشاه	BK	همدان	HD
بوشهر	BS	سمنان	SM	کهگیلویه و بویراحمد	KB	یزد	YA
تهران	TE	سیستان و بلوچستان	SB	گلستان	GO		

^۴ Hierarchical Administrative Subdivision Codes

سیمای سلامت سالمندان

کشور جمهوری اسلامی ایران

شیوع عوامل خطر رفتاری



سیمای سلامت سالمندان

کشور جمهوری اسلامی ایران

(شیوع عوامل خطر رفتاری)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با شیوع عوامل خطر رفتاری در کل جمعیت (افراد ۱۸ سال و بالاتر)، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (افراد ۱۸ تا ۶۰ سال) و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس، نوع و گروه‌های سنی بیان شده است. به‌منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات کل کشور و مقایسه‌ای بین استان‌های مختلف نیز تدوین و ترسیم شده است.


آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر بیشتر بودن شیوع عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر نسبت به افراد غیر سالمند است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۹ و در هر دو جنسیت؛ در بین گروه‌های سنی سالمندی بالاترین شیوع فعالیت فیزیکی ناکافی در گروه سنی ۷۵ سال و بالاتر مشاهده شد. شیوع فعالیت فیزیکی ناکافی در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی بیشتر بوده است و با افزایش سن اختلاف شیوع در بین زنان و مردان افزایش پیدا می‌کند. در سال ۲۰۰۵ تفاوت ۲/۲ برابری بین بیشترین و کمترین شیوع استاندارد شده سنی فعالیت فیزیکی ناکافی در بین استان‌های کشور مشاهده شد که این تفاوت در سال ۲۰۱۹ به ۱/۷ برابر کاهش پیدا کرد.

شیوع عامل خطر استعمال دخانیات در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر نسبت به افراد غیر سالمند کمتر است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند کاهش یافته است. در سال ۲۰۱۹ و در هر دو جنسیت؛ در بین گروه‌های سنی سالمندی بالاترین درصد استعمال دخانیات در گروه سنی ۶۰ تا ۶۴ سال مشاهده شد. درصد استعمال دخانیات در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی کمتر بوده است و با افزایش سن اختلاف درصد در بین زنان و مردان کاهش پیدا می‌کند. در سال ۲۰۰۵ تفاوت ۲/۴ برابری بین بیشترین و کمترین درصد استعمال دخانیات در بین استان‌های کشور مشاهده شد که این تفاوت در سال ۲۰۱۹ به ۳/۳ برابر کاهش پیدا کرد.




شیوع (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی به تفکیک گروه سنی و جنسیت در سطح ملی								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۱	هر دو	۳۴/۲	۳۸/۵	۴۲/۵	۴۶/۴	۵۰/۶	۵۴/۴	۵۸/۴
	زنان	۴۰/۵	۴۵/۵	۵۰/۱	۵۵/۱	۵۹/۳	۶۳/۲	۶۷/۲
	مردان	۲۷/۸	۳۱/۴	۳۵/۰	۳۷/۷	۴۱/۹	۴۵/۵	۴۹/۷
کمتر از ۶۰ سال ^۲	هر دو	۲۹/۳	۳۴/۰	۳۸/۳	۴۲/۹	۴۷/۵	۵۱/۸	۵۶/۳
	زنان	۳۴/۶	۴۰/۰	۴۵/۱	۵۰/۶	۵۵/۴	۵۹/۹	۶۴/۴
	مردان	۲۴/۱	۲۸/۰	۳۱/۵	۳۵/۲	۳۹/۶	۴۳/۶	۴۸/۱
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۴۳/۸	۴۷/۳	۵۱/۰	۵۳/۵	۵۶/۸	۵۹/۷	۶۲/۸
	زنان	۵۲/۴	۵۶/۴	۶۰/۱	۶۴/۱	۶۷/۲	۶۹/۹	۷۲/۷
	مردان	۳۵/۳	۳۸/۳	۴۱/۸	۴۲/۸	۴۶/۵	۴۹/۴	۵۲/۹
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۳۷/۷	۴۱/۴	۴۵/۴	۴۸/۲	۵۱/۷	۵۴/۳	۵۷/۶
	زنان	۴۴/۹	۴۹/۱	۵۳/۰	۵۷/۲	۵۹/۹	۶۲/۱	۶۵/۰
	مردان	۳۰/۴	۳۳/۷	۳۷/۸	۳۹/۱	۴۳/۴	۴۶/۵	۵۰/۳
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۴۱/۳	۴۴/۹	۴۸/۶	۵۱/۰	۵۴/۱	۵۶/۸	۶۰/۲
	زنان	۴۹/۷	۵۳/۶	۵۷/۳	۶۱/۲	۶۳/۹	۶۶/۶	۶۹/۶
	مردان	۳۳/۰	۳۶/۱	۳۹/۹	۴۰/۸	۴۴/۳	۴۷/۱	۵۰/۸
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۴۵/۷	۴۹/۰	۵۲/۴	۵۴/۵	۵۷/۲	۶۰/۰	۶۳/۱
	زنان	۵۴/۹	۵۸/۹	۶۲/۵	۶۶/۲	۶۹/۱	۷۲/۰	۷۴/۸
	مردان	۳۶/۴	۳۹/۲	۴۲/۴	۴۲/۸	۴۵/۳	۴۸/۰	۵۱/۴
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۵۰/۷	۵۴/۰	۵۷/۵	۶۰/۲	۶۴/۳	۶۷/۵	۷۰/۳
	زنان	۵۹/۹	۶۳/۸	۶۷/۶	۷۱/۸	۷۵/۷	۷۸/۸	۸۱/۴
	مردان	۴۱/۴	۴۴/۱	۴۷/۳	۴۸/۶	۵۲/۸	۵۶/۱	۵۹/۳

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سطح ملی



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۵۱/۲	۵۹/۰	۶۶/۰	۷۱/۵	۷۴/۳
مردان	۳۴/۵	۴۱/۲	۴۶/۱	۵۲/۷	۵۶/۴


پراکندگی جغرافیایی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سال ۲۰۱۹



^۱ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۲ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.


شیوع (%) عامل خطر استعمال دخانیات به تفکیک گروه سنی و جنسیت در سطح ملی								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۲	هر دو	۱۴/۶	۱۴/۳	۱۳/۳	۱۳/۱	۱۲/۱	۱۱/۱	۱۰/۴
	زنان	۴/۱	۳/۰	۲/۲	۲/۲	۱/۷	۱/۴	۱/۰
	مردان	۲۵/۲	۲۵/۵	۲۴/۵	۲۴/۱	۲۲/۵	۲۰/۸	۱۹/۷
کمتر از ۶۰ سال ^۳	هر دو	۱۴/۱	۱۴/۱	۱۳/۵	۱۳/۳	۱۲/۴	۱۱/۵	۱۰/۸
	زنان	۲/۸	۱/۹	۱/۴	۱/۵	۱/۲	۱/۱	۰/۹
	مردان	۲۵/۴	۲۶/۳	۲۵/۶	۲۵/۰	۲۳/۷	۲۱/۸	۲۰/۷
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۵/۸	۱۴/۵	۱۳/۱	۱۲/۹	۱۱/۵	۱۰/۴	۹/۴
	زنان	۶/۹	۵/۰	۳/۷	۳/۵	۲/۷	۲/۱	۱/۱
	مردان	۲۴/۷	۲۴/۱	۲۲/۴	۲۲/۲	۲۰/۳	۱۸/۸	۱۷/۶
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۱۴/۴	۱۳/۵	۱۲/۴	۱۲/۱	۱۱/۳	۱۰/۹	۱۰/۶
	زنان	۴/۷	۲/۹	۱/۶	۱/۳	۰/۳	۰/۰	۰/۰
	مردان	۲۴/۲	۲۴/۰	۲۳/۱	۲۲/۹	۲۲/۲	۲۱/۸	۲۱/۲
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۱۵/۲	۱۴/۰	۱۲/۶	۱۲/۷	۱۱/۴	۱۰/۴	۹/۳
	زنان	۶/۱	۴/۲	۲/۹	۲/۵	۱/۵	۱/۰	۰/۰
	مردان	۲۴/۳	۲۳/۸	۲۲/۳	۲۲/۹	۲۱/۲	۱۹/۸	۱۸/۷
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۱۷/۷	۱۶/۳	۱۴/۶	۱۴/۵	۱۲/۹	۱۱/۶	۱۰/۳
	زنان	۹/۱	۷/۳	۵/۹	۵/۵	۴/۷	۴/۰	۲/۸
	مردان	۲۶/۲	۲۵/۳	۲۳/۴	۲۳/۴	۲۱/۰	۱۹/۲	۱۷/۷
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۱۵/۹	۱۴/۴	۱۲/۶	۱۲/۱	۱۰/۴	۸/۹	۷/۳
	زنان	۷/۵	۵/۸	۴/۵	۴/۵	۴/۰	۳/۲	۱/۸
	مردان	۲۴/۳	۲۳/۱	۲۰/۸	۱۹/۸	۱۶/۷	۱۴/۵	۱۲/۷

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سطح ملی



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۶/۴	۳/۳	۲/۲	۰/۹	۰/۳
مردان	۲۴/۵	۲۲/۴	۲۰/۵	۱۸/۱	۱۷/۰

پراکندگی جغرافیایی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سال ۲۰۱۹



^۲ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۳ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.



سیمای سلامت سالمندان

استان آذربایجان شرقی

شیوع عوامل خطر رفتاری



سیمای سلامت سالمندان

استان آذربایجان شرقی

(شیوع عوامل خطر رفتاری)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با شیوع عوامل خطر رفتاری در کل جمعیت (افراد ۱۸ سال و بالاتر)، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (افراد ۱۸ تا ۶۰ سال) ساکن در استان آذربایجان شرقی و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس، نوع و گروه‌های سنی بیان شده است. به‌منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی جهت مقایسه با استان‌های مجاور استان آذربایجان شرقی شامل: استان‌های اردبیل، آذربایجان غربی و زنجان نیز تدوین و ترسیم شده است.


آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر بیشتر بودن شیوع عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان آذربایجان شرقی نسبت به افراد غیر سالمند است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند افزایش یافته است. شیوع فعالیت فیزیکی ناکافی در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی بیشتر بوده است و با افزایش سن اختلاف شیوع در بین زنان و مردان افزایش پیدا می‌کند. زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان آذربایجان شرقی بیشترین شیوع استاندارد شده‌ی سنی فعالیت فیزیکی ناکافی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.

شیوع عامل خطر استعمال دخانیات در سال ۲۰۱۹ در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان آذربایجان شرقی نسبت به زنان غیر سالمند کمتر و در بین مردان سالمند و غیر سالمند یکسان است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند کاهش یافته است. درصد استعمال دخانیات در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی کمتر بوده است و با افزایش سن اختلاف درصد در بین زنان و مردان کاهش پیدا می‌کند. زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان آذربایجان شرقی دارای کمترین درصد استاندارد شده‌ی سنی استعمال دخانیات نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.




شیوع (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۱	هر دو	۳۴/۹	۳۶/۰	۳۹/۵	۴۴/۷	۴۸/۷	۵۲/۰	۵۹/۶
	زنان	۴۲/۲	۴۳/۴	۴۸/۲	۵۵/۴	۵۹/۱	۶۲/۵	۶۶/۲
	مردان	۲۷/۵	۲۸/۶	۳۰/۸	۳۴/۰	۳۸/۴	۴۱/۵	۴۹/۳
کمتر از ۶۰ سال ^۲	هر دو	۳۰/۰	۳۱/۶	۳۴/۹	۴۰/۵	۴۴/۰	۴۶/۸	۵۰/۶
	زنان	۳۵/۸	۳۷/۵	۴۲/۴	۴۹/۰	۵۲/۸	۵۶/۱	۶۰/۱
	مردان	۲۴/۲	۲۵/۷	۲۷/۴	۳۱/۹	۳۵/۱	۳۷/۵	۴۱/۰
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۴۴/۵	۴۴/۸	۴۸/۷	۵۳/۱	۵۸/۳	۶۲/۵	۶۵/۹
	زنان	۵۵/۰	۵۵/۲	۵۹/۸	۶۸/۰	۷۱/۶	۷۵/۴	۷۸/۳
	مردان	۳۴/۰	۳۴/۴	۳۷/۵	۳۸/۲	۴۴/۹	۴۹/۶	۵۳/۴
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۳۸/۱	۳۸/۵	۴۲/۲	۴۶/۴	۵۰/۵	۵۴/۷	۵۸/۵
	زنان	۴۷/۴	۴۷/۷	۵۲/۴	۶۱/۱	۶۳/۷	۶۷/۶	۷۱/۱
	مردان	۲۸/۸	۲۹/۲	۳۲/۱	۳۱/۷	۳۷/۳	۴۱/۷	۴۵/۹
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۴۱/۹	۴۲/۴	۴۶/۳	۵۰/۶	۵۵/۳	۶۰/۰	۶۳/۹
	زنان	۵۲/۳	۵۲/۴	۵۶/۷	۶۵/۱	۶۸/۴	۷۲/۷	۷۵/۸
	مردان	۳۱/۶	۳۲/۴	۳۵/۹	۳۶/۱	۴۲/۲	۴۷/۲	۵۲/۱
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۴۶/۷	۴۶/۷	۵۰/۱	۵۴/۰	۵۸/۷	۶۲/۵	۶۵/۵
	زنان	۵۸/۲	۵۸/۰	۶۲/۳	۷۰/۰	۷۳/۵	۷۶/۹	۷۹/۵
	مردان	۳۵/۲	۳۵/۵	۳۷/۹	۳۷/۹	۴۳/۹	۴۸/۱	۵۱/۴
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۵۱/۴	۵۱/۶	۵۶/۰	۶۱/۴	۶۸/۵	۷۲/۸	۷۵/۵
	زنان	۶۲/۳	۶۲/۷	۶۷/۸	۷۵/۹	۸۰/۶	۸۴/۲	۸۶/۹
	مردان	۴۰/۴	۴۰/۶	۴۴/۱	۴۷/۰	۵۶/۴	۶۱/۳	۶۴/۲

رشد زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۵۳/۸	۵۸/۶	۷۰/۴	۷۷/۳	۸۰/۱
مردان	۳۳/۲	۳۶/۸	۴۴/۰	۵۲/۶	۵۶/۳

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹




^۱ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۲ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.




شیوع (%) عامل خطر استعمال دخانیات به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۳	هر دو	۱۶/۸	۱۶/۰	۱۵/۷	۱۴/۹	۱۴/۱	۱۳/۳	۱۲/۴
	زنان	۶/۰	۴/۰	۳/۰	۱/۸	۱/۸	۲/۰	۱/۵
	مردان	۲۷/۶	۲۸/۰	۲۸/۳	۲۷/۹	۲۶/۴	۲۴/۶	۲۳/۳
کمتر از ۶۰ سال ^۴	هر دو	۱۵/۸	۱۵/۷	۱۵/۴	۱۵/۴	۱۴/۳	۱۳/۳	۱۲/۵
	زنان	۴/۱	۲/۷	۲/۱	۱/۵	۱/۵	۱/۹	۱/۸
	مردان	۲۷/۶	۲۸/۷	۲۸/۷	۲۹/۲	۲۷/۱	۲۴/۷	۲۳/۱
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۸/۶	۱۶/۶	۱۶/۲	۱۳/۹	۱۳/۷	۱۳/۳	۱۲/۲
	زنان	۹/۶	۶/۶	۴/۸	۲/۵	۲/۴	۲/۱	۰/۸
	مردان	۲۷/۷	۲۶/۵	۲۷/۵	۲۵/۲	۲۴/۹	۲۴/۵	۲۳/۶
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۱۷/۲	۱۵/۳	۱۵/۴	۱۳/۰	۱۳/۰	۱۳/۲	۱۲/۷
	زنان	۷/۵	۴/۶	۳/۱	۰/۸	۰/۷	۰/۸	۰/۱
	مردان	۲۶/۹	۲۶/۰	۲۷/۷	۲۵/۱	۲۵/۳	۲۵/۷	۲۴/۴
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۱۸/۱	۱۶/۲	۱۶/۱	۱۴/۱	۱۴/۳	۱۴/۵	۱۳/۹
	زنان	۸/۹	۵/۹	۴/۰	۱/۵	۱/۲	۱/۱	۰/۰
	مردان	۲۷/۳	۲۶/۶	۲۸/۳	۲۶/۷	۲۷/۳	۲۷/۹	۲۷/۷
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۲۰/۶	۱۸/۴	۱۷/۷	۱۵/۳	۱۵/۲	۱۴/۷	۱۳/۱
	زنان	۱۲/۰	۸/۹	۶/۹	۴/۴	۴/۴	۴/۰	۲/۳
	مردان	۲۹/۳	۲۸/۰	۲۸/۶	۲۶/۳	۲۶/۰	۲۵/۴	۲۴/۰
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۱۸/۶	۱۶/۳	۱۵/۵	۱۳/۰	۱۲/۳	۱۰/۸	۹/۰
	زنان	۱۰/۱	۷/۱	۵/۴	۳/۲	۳/۵	۲/۵	۰/۸
	مردان	۲۷/۲	۲۵/۵	۲۵/۶	۲۲/۸	۲۱/۱	۱۹/۲	۱۷/۲

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۹/۲	۴/۵	۲/۱	۰/۶	۰/۱
مردان	۲۷/۴	۲۷/۵	۲۴/۹	۲۳/۸	۲۲/۷

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹



^۳ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۴ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.



سیمای سلامت سالمندان

استان آذربایجان غربی

شیوع عوامل خطر رفتاری



سیمای سلامت سالمندان

استان آذربایجان غربی

(شیوع عوامل خطر رفتاری)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با شیوع عوامل خطر رفتاری در کل جمعیت (افراد ۱۸ سال و بالاتر)، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (افراد ۱۸ تا ۶۰ سال) ساکن در استان آذربایجان غربی و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس، نوع و گروه‌های سنی بیان شده است. به‌منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی جهت مقایسه با استان‌های مجاور استان آذربایجان غربی شامل: استان‌های آذربایجان شرقی، کردستان و زنجان نیز تدوین و ترسیم شده است.


آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر بیشتر بودن شیوع عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان آذربایجان غربی نسبت به افراد غیر سالمند است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند افزایش یافته است. شیوع فعالیت فیزیکی ناکافی در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی بیشتر بوده است و با افزایش سن (به جز گروه سنی ۶۵ تا ۶۹ سال) اختلاف شیوع در بین زنان و مردان افزایش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان آذربایجان غربی دارای بیشترین و یا کمترین شیوع استاندارد شده‌ی سنی فعالیت فیزیکی ناکافی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ نبوده‌اند.

شیوع عامل خطر استعمال دخانیات در سال ۲۰۱۹ در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان آذربایجان غربی نسبت به زنان غیر سالمند بیشتر و در مردان سالمند نسبت به غیر سالمند کمتر است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند کاهش یافته است. درصد استعمال دخانیات در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی کمتر بوده است و با افزایش سن (به جز گروه سنی ۶۵ تا ۶۹ سال) اختلاف درصد در بین زنان و مردان کاهش پیدا می‌کند. مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان آذربایجان غربی دارای بیشترین درصد استاندارد شده‌ی سنی استعمال دخانیات نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.




شیوع (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۱	هر دو	۳۴/۴	۳۸/۴	۴۰/۷	۴۳/۲	۴۶/۷	۴۹/۳	۵۲/۸
	زنان	۴۲/۰	۴۶/۱	۴۹/۴	۵۳/۸	۵۶/۷	۵۸/۹	۶۲/۰
	مردان	۲۶/۷	۳۰/۶	۳۲/۰	۳۲/۶	۳۶/۷	۳۹/۸	۴۳/۶
کمتر از ۶۰ سال ^۲	هر دو	۲۹/۷	۳۳/۶	۳۶/۰	۳۸/۵	۴۲/۶	۴۵/۵	۴۹/۳
	زنان	۳۶/۱	۴۰/۵	۴۳/۷	۴۸/۲	۵۱/۶	۵۴/۰	۵۷/۴
	مردان	۲۳/۴	۲۶/۷	۲۸/۳	۲۸/۸	۳۳/۶	۳۷/۱	۴۱/۲
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۴۳/۶	۴۷/۹	۵۰/۰	۵۲/۵	۵۴/۹	۵۶/۹	۵۹/۹
	زنان	۵۳/۸	۵۷/۳	۶۰/۸	۶۴/۹	۶۶/۹	۶۸/۷	۷۱/۲
	مردان	۳۳/۴	۳۸/۵	۳۹/۲	۴۰/۰	۴۲/۹	۴۵/۲	۴۸/۵
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۳۶/۷	۴۱/۳	۴۳/۵	۴۶/۴	۴۸/۳	۴۸/۷	۵۱/۲
	زنان	۴۵/۸	۴۹/۶	۵۳/۲	۵۷/۸	۵۹/۱	۵۹/۲	۶۱/۳
	مردان	۲۷/۵	۳۳/۰	۳۳/۹	۳۴/۹	۳۷/۶	۳۸/۳	۴۱/۱
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۴۱/۰	۴۵/۶	۴۸/۰	۵۰/۶	۵۲/۵	۵۴/۳	۵۷/۸
	زنان	۵۱/۵	۵۵/۲	۵۸/۶	۶۲/۷	۶۳/۷	۶۵/۱	۶۷/۸
	مردان	۳۰/۴	۳۶/۰	۳۷/۴	۳۸/۵	۴۱/۳	۴۳/۶	۴۷/۹
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۴۵/۵	۴۹/۷	۵۱/۷	۵۴/۲	۵۷/۳	۶۰/۳	۶۳/۶
	زنان	۵۶/۳	۵۹/۹	۶۳/۳	۶۷/۳	۶۹/۶	۷۲/۴	۷۵/۴
	مردان	۳۴/۷	۳۹/۵	۴۰/۲	۴۱/۱	۴۴/۹	۴۸/۲	۵۱/۸
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۵۱/۲	۵۵/۰	۵۶/۶	۵۸/۷	۶۱/۶	۶۴/۳	۶۶/۹
	زنان	۶۱/۵	۶۴/۶	۶۸/۰	۷۱/۹	۷۵/۴	۷۸/۱	۸۰/۴
	مردان	۴۱/۰	۴۵/۵	۴۵/۲	۴۵/۶	۴۷/۹	۵۰/۵	۵۳/۴

رشد زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۵۲/۶	۵۹/۶	۶۵/۷	۶۹/۶	۷۲/۴
مردان	۳۲/۵	۳۸/۴	۴۲/۰	۴۷/۳	۵۱/۲

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹




^۱ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۲ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.




شیوع (%) عامل خطر استعمال دخانیات به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۳	هر دو	۲۰/۷	۲۱/۱	۱۹/۰	۲۰/۷	۱۸/۲	۱۶/۳	۱۴/۱
	زنان	۶/۵	۵/۸	۴/۴	۴/۷	۳/۴	۲/۵	۱/۵
	مردان	۳۵/۰	۳۶/۴	۳۳/۷	۳۶/۸	۳۳/۰	۳۰/۱	۲۷/۵
کمتر از ۶۰ سال ^۴	هر دو	۱۹/۴	۱۹/۲	۱۸/۳	۱۸/۳	۱۷/۰	۱۵/۸	۱۴/۸
	زنان	۴/۳	۳/۲	۲/۲	۲/۵	۱/۸	۱/۵	۱/۰
	مردان	۳۴/۵	۳۵/۲	۳۴/۳	۳۴/۲	۳۲/۳	۳۰/۰	۲۸/۶
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۲۳/۳	۲۴/۹	۲۰/۵	۲۵/۵	۲۰/۵	۱۷/۳	۱۵/۵
	زنان	۱۰/۸	۱۱/۰	۸/۶	۹/۲	۶/۶	۴/۴	۲/۷
	مردان	۳۵/۹	۳۸/۸	۳۲/۴	۴۱/۹	۳۴/۴	۳۰/۲	۲۸/۳
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۲۱/۵	۲۳/۷	۲۰/۰	۲۲/۰	۱۹/۵	۱۷/۳	۱۵/۸
	زنان	۸/۳	۸/۷	۶/۰	۶/۸	۴/۴	۲/۳	۰/۶
	مردان	۳۴/۶	۳۸/۷	۳۴/۰	۳۷/۱	۳۴/۶	۳۲/۴	۳۱/۱
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۲۲/۷	۲۴/۵	۲۰/۱	۲۷/۷	۲۳/۰	۱۹/۶	۱۸/۰
	زنان	۱۰/۴	۱۰/۷	۸/۳	۹/۳	۶/۵	۴/۰	۲/۳
	مردان	۳۵/۰	۳۸/۳	۳۲/۰	۴۶/۱	۳۹/۵	۳۵/۳	۳۳/۷
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۲۵/۲	۲۶/۶	۲۱/۸	۲۷/۹	۲۱/۴	۱۷/۳	۱۵/۳
	زنان	۱۳/۰	۱۳/۳	۱۱/۰	۱۱/۶	۸/۸	۶/۸	۵/۲
	مردان	۳۷/۴	۳۹/۹	۳۲/۷	۴۴/۲	۳۳/۹	۲۷/۹	۲۵/۵
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۲۴/۰	۲۴/۹	۲۰/۰	۲۴/۶	۱۸/۳	۱۴/۹	۱۲/۸
	زنان	۱۱/۵	۱۱/۵	۹/۱	۹/۱	۶/۷	۴/۷	۲/۷
	مردان	۳۶/۵	۳۸/۳	۳۱/۰	۴۰/۱	۲۹/۸	۲۵/۲	۲۲/۹

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۱۰/۴	۸/۱	۶/۲	۲/۳	۱/۰
مردان	۳۵/۶	۳۲/۶	۳۴/۶	۲۸/۹	۲۷/۸

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹



^۳ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۴ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.



سیمای سلامت سالمندان

استان اردبیل

شیوع عوامل خطر رفتاری



سیمای سلامت سالمندان

استان اردبیل

(شیوع عوامل خطر رفتاری)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با شیوع عوامل خطر رفتاری در کل جمعیت (افراد ۱۸ سال و بالاتر)، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (افراد ۱۸ تا ۶۰ سال) ساکن در استان اردبیل و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس، نوع و گروه‌های سنی بیان شده است. به‌منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی جهت مقایسه با استان‌های مجاور استان اردبیل شامل: استان‌های آذربایجان شرقی، گیلان و زنجان نیز تدوین و ترسیم شده است.


آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر بیشتر بودن شیوع عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان اردبیل نسبت به افراد غیر سالمند است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند افزایش یافته است. شیوع فعالیت فیزیکی ناکافی در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی بیشتر بوده است و با افزایش سن (به جز برای گروه سنی ۶۵ تا ۶۹ سال) اختلاف شیوع در بین زنان و مردان کاهش پیدا می‌کند. مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان اردبیل دارای بیشترین شیوع استاندارد شده‌ی سنی فعالیت فیزیکی ناکافی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.

شیوع عامل خطر استعمال دخانیات در سال ۲۰۱۹ در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان اردبیل نسبت به زنان غیر سالمند بیشتر و در مردان سالمند نسبت به غیر سالمند کمتر است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند کاهش یافته است. درصد استعمال دخانیات در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی کمتر بوده است و با افزایش سن اختلاف درصد در بین زنان و مردان کاهش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان اردبیل دارای بیشترین درصد استاندارد شده‌ی سنی استعمال دخانیات نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.




شیوع (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۱	هر دو	۳۸/۰	۴۲/۱	۴۷/۱	۵۰/۲	۵۴/۹	۵۹/۲	۶۷/۶
	زنان	۴۵/۵	۵۰/۴	۵۷/۳	۶۱/۵	۶۵/۱	۶۸/۷	۷۲/۶
	مردان	۳۰/۵	۳۳/۹	۳۶/۹	۳۸/۸	۴۴/۶	۴۹/۶	۵۸/۸
کمتر از ۶۰ سال ^۲	هر دو	۳۱/۹	۳۶/۶	۴۲/۲	۴۵/۹	۵۱/۵	۵۷/۱	۶۲/۱
	زنان	۳۸/۲	۴۳/۸	۵۱/۴	۵۷/۰	۶۲/۱	۶۷/۳	۷۲/۱
	مردان	۲۵/۶	۲۹/۵	۳۲/۹	۳۴/۸	۴۰/۹	۴۶/۸	۵۲/۲
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۵۰/۲	۵۳/۱	۵۶/۸	۵۸/۸	۶۱/۶	۶۳/۴	۶۶/۲
	زنان	۵۹/۹	۶۳/۶	۶۹/۰	۷۰/۶	۷۱/۱	۷۱/۶	۷۳/۶
	مردان	۴۰/۵	۴۲/۷	۴۴/۷	۴۷/۰	۵۲/۰	۵۵/۲	۵۸/۷
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۴۳/۵	۴۶/۹	۵۱/۱	۵۳/۴	۵۶/۳	۵۷/۲	۶۰/۰
	زنان	۵۱/۷	۵۵/۴	۶۱/۴	۶۳/۷	۶۵/۳	۶۵/۰	۶۶/۹
	مردان	۳۵/۴	۳۸/۳	۴۰/۸	۴۳/۱	۴۷/۳	۴۹/۴	۵۳/۱
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۴۸/۲	۵۱/۲	۵۴/۹	۵۶/۵	۵۸/۶	۶۰/۰	۶۳/۰
	زنان	۵۸/۲	۶۱/۹	۶۷/۵	۶۹/۳	۷۰/۶	۷۱/۵	۷۳/۸
	مردان	۳۸/۲	۴۰/۴	۴۲/۳	۴۳/۸	۴۶/۵	۴۸/۴	۵۲/۳
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۵۲/۸	۵۵/۶	۵۹/۰	۶۰/۵	۶۳/۳	۶۵/۷	۶۸/۴
	زنان	۶۳/۶	۶۷/۳	۷۲/۴	۷۳/۴	۷۲/۶	۷۳/۰	۷۵/۰
	مردان	۴۲/۰	۴۴/۰	۴۵/۶	۴۷/۷	۵۳/۹	۵۸/۴	۶۱/۸
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۵۶/۲	۵۸/۹	۶۲/۴	۶۴/۷	۶۸/۱	۷۰/۶	۷۳/۳
	زنان	۶۶/۱	۶۹/۸	۷۴/۸	۷۶/۱	۷۵/۸	۷۶/۷	۷۸/۸
	مردان	۴۶/۲	۴۸/۱	۵۰/۰	۵۳/۴	۶۰/۴	۶۴/۵	۶۷/۸

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۵۸/۶	۶۷/۸	۷۰/۳	۷۲/۷	۷۵/۱
مردان	۳۹/۷	۴۴/۱	۵۱/۲	۵۷/۷	۶۱/۶

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹




^۱ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۲ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.




شیوع (%) عامل خطر استعمال دخانیات به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۳	هر دو	۱۸/۳	۱۸/۵	۱۸/۵	۱۸/۶	۱۷/۱	۱۵/۶	۱۴/۵
	زنان	۶/۲	۵/۶	۵/۲	۶/۷	۵/۱	۴/۱	۳/۳
	مردان	۳۰/۴	۳۱/۴	۳۱/۹	۳۰/۵	۲۹/۱	۲۷/۱	۲۵/۸
کمتر از ۶۰ سال ^۴	هر دو	۱۷/۴	۱۷/۸	۱۸/۰	۱۷/۹	۱۶/۶	۱۵/۱	۱۴/۲
	زنان	۴/۷	۳/۸	۳/۵	۴/۶	۳/۵	۲/۸	۲/۴
	مردان	۳۰/۱	۳۱/۸	۳۲/۵	۳۱/۱	۲۹/۷	۲۷/۳	۲۶/۰
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۲۰/۲	۱۹/۸	۱۹/۶	۲۰/۰	۱۸/۱	۱۶/۶	۱۵/۲
	زنان	۹/۳	۹/۱	۸/۵	۱۰/۸	۸/۳	۶/۶	۵/۱
	مردان	۳۱/۰	۳۰/۵	۳۰/۷	۲۹/۳	۲۸/۰	۲۶/۵	۲۵/۳
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۱۸/۴	۱۸/۳	۱۸/۵	۱۹/۹	۱۷/۸	۱۶/۳	۱۵/۳
	زنان	۶/۵	۶/۲	۵/۶	۸/۳	۵/۶	۴/۰	۲/۶
	مردان	۳۰/۳	۳۰/۳	۳۱/۳	۳۱/۵	۳۰/۱	۲۸/۶	۲۸/۰
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۱۹/۸	۱۹/۵	۱۹/۳	۱۹/۶	۱۷/۴	۱۵/۶	۱۴/۲
	زنان	۸/۹	۸/۶	۷/۸	۹/۹	۶/۶	۴/۳	۲/۴
	مردان	۳۰/۷	۳۰/۴	۳۰/۸	۲۹/۲	۲۸/۲	۲۶/۹	۲۵/۹
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۲۲/۵	۲۲/۰	۲۱/۶	۲۲/۰	۲۰/۵	۱۹/۲	۱۷/۹
	زنان	۱۲/۴	۱۲/۰	۱۱/۴	۱۳/۶	۱۰/۹	۹/۱	۷/۷
	مردان	۳۲/۵	۳۱/۹	۳۱/۸	۳۰/۴	۳۰/۲	۲۹/۳	۲۸/۱
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۲۰/۰	۱۹/۴	۱۹/۰	۱۸/۷	۱۶/۷	۱۵/۱	۱۳/۴
	زنان	۹/۶	۹/۵	۹/۲	۱۱/۴	۱۰/۰	۹/۰	۷/۶
	مردان	۳۰/۳	۲۹/۳	۲۸/۷	۲۵/۹	۲۳/۴	۲۱/۳	۱۹/۳

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۸/۸	۷/۹	۷/۷	۴/۵	۳/۱
مردان	۳۰/۷	۳۰/۷	۲۸/۰	۲۵/۴	۲۴/۴

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹



^۳ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۴ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.



سیمای سلامت سالمندان

استان اصفهان

شیوع عوامل خطر رفتاری



سیمای سلامت سالمندان

استان اصفهان

(شیوع عوامل خطر رفتاری)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با شیوع عوامل خطر رفتاری در کل جمعیت (افراد ۱۸ سال و بالاتر)، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (افراد ۱۸ تا ۶۰ سال) ساکن در استان اصفهان و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس، نوع و گروه‌های سنی بیان شده است. به‌منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی جهت مقایسه با استان‌های مجاور استان اصفهان شامل: استان‌های چهارمحال و بختیاری، فارس، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی، قم، سمنان و یزد نیز تدوین و ترسیم شده است.


آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر بیشتر بودن شیوع عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان اصفهان نسبت به افراد غیر سالمند است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند افزایش یافته است. شیوع فعالیت فیزیکی ناکافی در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی بیشتر بوده است و با افزایش سن اختلاف شیوع در بین زنان و مردان افزایش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان اصفهان دارای بیشترین و یا کمترین شیوع استاندارد شده‌ی سنی فعالیت فیزیکی ناکافی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ نبوده‌اند.

شیوع عامل خطر استعمال دخانیات در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان اصفهان نسبت به افراد غیر سالمند کمتر است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند کاهش یافته است. درصد استعمال دخانیات در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی کمتر بوده است و با افزایش سن اختلاف درصد در بین زنان و مردان کاهش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان اصفهان دارای بیشترین و یا کمترین درصد استاندارد شده‌ی سنی استعمال دخانیات نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ نبوده‌اند.




شیوع (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۱	هر دو	۴۰/۰	۴۴/۱	۴۴/۸	۵۲/۳	۵۴/۷	۵۷/۳	۶۰/۸
	زنان	۴۷/۴	۵۳/۳	۵۳/۶	۶۰/۵	۶۲/۷	۶۴/۹	۶۷/۹
	مردان	۳۲/۷	۳۴/۹	۳۶/۰	۴۴/۱	۴۶/۶	۴۹/۷	۵۷/۹
کمتر از ۶۰ سال ^۲	هر دو	۳۴/۴	۳۹/۰	۴۰/۱	۴۹/۵	۵۲/۲	۵۵/۱	۵۹/۰
	زنان	۴۰/۷	۴۷/۰	۴۷/۷	۵۶/۲	۵۹/۴	۶۲/۲	۶۵/۸
	مردان	۲۸/۱	۳۱/۰	۳۲/۶	۴۲/۸	۴۵/۰	۴۸/۱	۵۲/۲
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۵۱/۴	۵۴/۴	۵۴/۲	۵۷/۹	۵۹/۶	۶۱/۵	۶۴/۳
	زنان	۶۰/۹	۶۵/۹	۶۵/۴	۶۹/۰	۶۹/۴	۷۰/۳	۷۲/۳
	مردان	۴۱/۹	۴۲/۹	۴۳/۰	۴۶/۷	۴۹/۷	۵۲/۷	۵۶/۳
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۴۴/۰	۴۷/۷	۴۸/۲	۵۳/۳	۵۶/۱	۵۸/۱	۶۱/۳
	زنان	۵۲/۴	۵۸/۰	۵۷/۹	۶۲/۸	۶۴/۰	۶۴/۲	۶۶/۰
	مردان	۳۵/۷	۳۷/۵	۳۸/۶	۴۳/۸	۴۸/۲	۵۲/۱	۵۶/۶
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۴۷/۸	۵۰/۹	۵۰/۹	۵۵/۰	۵۷/۳	۵۹/۵	۶۲/۵
	زنان	۵۷/۲	۶۲/۶	۶۲/۶	۶۷/۰	۶۸/۱	۶۹/۶	۷۱/۹
	مردان	۳۸/۳	۳۹/۳	۳۹/۲	۴۳/۰	۴۶/۴	۴۹/۴	۵۳/۱
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۵۳/۵	۵۶/۲	۵۵/۸	۵۸/۷	۵۹/۲	۶۰/۸	۶۳/۵
	زنان	۶۴/۳	۶۸/۸	۶۸/۰	۷۰/۹	۷۰/۲	۷۰/۸	۷۲/۷
	مردان	۴۲/۷	۴۳/۶	۴۳/۵	۴۶/۶	۴۸/۲	۵۰/۸	۵۴/۴
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۶۰/۳	۶۲/۷	۶۱/۸	۶۴/۶	۶۵/۸	۶۷/۶	۶۹/۷
	زنان	۶۹/۹	۷۴/۲	۷۳/۰	۷۵/۵	۷۵/۵	۷۶/۷	۷۸/۵
	مردان	۵۰/۷	۵۱/۲	۵۰/۷	۵۳/۶	۵۶/۰	۵۸/۶	۶۱/۰

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۵۹/۶	۶۴/۲	۶۸/۷	۷۱/۵	۷۳/۸
مردان	۴۰/۹	۴۲/۳	۴۹/۶	۵۶/۴	۶۰/۱

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹




^۱ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۲ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.




شیوع (%) عامل خطر استعمال دخانیات به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۳	هر دو	۱۴/۹	۱۵/۳	۱۴/۶	۱۲/۶	۱۲/۰	۱۱/۱	۱۰/۳
	زنان	۲/۷	۲/۶	۱/۵	۰/۹	۰/۸	۰/۶	۰/۳
	مردان	۲۷/۰	۲۸/۱	۲۷/۶	۲۴/۲	۲۳/۳	۲۱/۶	۱۹/۲
کمتر از ۶۰ سال ^۴	هر دو	۱۴/۷	۱۵/۵	۱۴/۹	۱۳/۸	۱۳/۱	۱۲/۱	۱۱/۳
	زنان	۱/۶	۱/۴	۰/۹	۰/۶	۰/۵	۰/۶	۰/۵
	مردان	۲۷/۷	۲۹/۷	۲۸/۹	۲۷/۱	۲۵/۷	۲۳/۶	۲۲/۱
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۵/۳	۱۴/۹	۱۳/۹	۱۰/۱	۹/۹	۹/۲	۸/۳
	زنان	۵/۰	۵/۰	۲/۸	۱/۷	۱/۳	۰/۷	۰/۰
	مردان	۲۵/۶	۲۴/۸	۲۴/۹	۱۸/۵	۱۸/۶	۱۷/۸	۱۶/۶
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۱۳/۶	۱۳/۷	۱۳/۲	۱۰/۹	۱۱/۳	۱۱/۵	۱۱/۲
	زنان	۲/۴	۲/۷	۰/۵	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
	مردان	۲۴/۸	۲۴/۸	۲۵/۹	۲۱/۷	۲۲/۶	۲۳/۰	۲۲/۹
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۱۴/۰	۱۳/۷	۱۲/۸	۸/۶	۸/۹	۹/۰	۸/۳
	زنان	۳/۵	۳/۷	۱/۷	۰/۶	۰/۳	۰/۳	۰/۰
	مردان	۲۴/۶	۲۳/۷	۲۳/۹	۱۶/۷	۱۷/۶	۱۷/۶	۱۶/۶
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۱۷/۱	۱۶/۷	۱۵/۴	۱۱/۲	۱۰/۷	۹/۵	۸/۰
	زنان	۷/۵	۷/۵	۵/۰	۳/۵	۲/۹	۱/۹	۰/۱
	مردان	۲۶/۸	۲۵/۹	۲۵/۸	۱۸/۹	۱۸/۵	۱۷/۲	۱۵/۹
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۱۶/۵	۱۵/۶	۱۴/۰	۹/۷	۸/۷	۶/۹	۵/۶
	زنان	۶/۶	۶/۳	۴/۰	۲/۷	۲/۰	۰/۵	۰/۰
	مردان	۲۶/۵	۲۴/۸	۲۳/۹	۱۶/۸	۱۵/۵	۱۳/۳	۱۱/۲

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۴/۵	۲/۴	۱/۰	۰/۰	۰/۰
مردان	۲۵/۴	۲۴/۹	۱۹/۱	۱۷/۵	۱۶/۳

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹



^۳ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۴ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.



سیمای سلامت سالمندان

استان البرز

شیوع عوامل خطر رفتاری



سیمای سلامت سالمندان

استان البرز

(شیوع عوامل خطر رفتاری)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با شیوع عوامل خطر رفتاری در کل جمعیت (افراد ۱۸ سال و بالاتر)، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (افراد ۱۸ تا ۶۰ سال) ساکن در استان البرز و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس، نوع و گروه‌های سنی بیان شده است. به‌منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی جهت مقایسه با استان‌های مجاور استان البرز شامل: استان‌های تهران، مرکزی، مازندران و قزوین نیز تدوین و ترسیم شده است.


آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر بیشتر بودن شیوع عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان البرز نسبت به افراد غیر سالمند است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند افزایش یافته است. شیوع فعالیت فیزیکی ناکافی در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی بیشتر بوده است و با افزایش سن اختلاف شیوع در بین زنان و مردان افزایش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان البرز دارای بیشترین شیوع استاندارد شده‌ی سنی فعالیت فیزیکی ناکافی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.

شیوع عامل خطر استعمال دخانیات در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان البرز نسبت به افراد غیر سالمند کمتر است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند کاهش یافته است. درصد استعمال دخانیات در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی کمتر بوده است و با افزایش سن اختلاف درصد در بین زنان و مردان کاهش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان البرز دارای بیشترین و یا کمترین درصد استاندارد شده‌ی سنی استعمال دخانیات نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ نبوده‌اند.




شیوع (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۱	هر دو	۲۶/۴	۳۰/۷	۳۶/۳	۴۲/۳	۴۹/۱	۵۶/۰	۶۱/۷
	زنان	۳۳/۹	۳۸/۶	۴۳/۹	۴۷/۵	۵۶/۱	۶۳/۸	۶۹/۶
	مردان	۱۸/۸	۲۲/۷	۲۸/۶	۳۷/۰	۴۲/۱	۴۸/۲	۵۳/۹
کمتر از ۶۰ سال ^۲	هر دو	۲۳/۰	۲۷/۹	۳۳/۲	۳۸/۵	۴۴/۸	۵۱/۹	۵۸/۰
	زنان	۲۹/۰	۳۴/۲	۳۹/۳	۴۲/۶	۵۰/۷	۵۹/۰	۶۵/۴
	مردان	۱۷/۱	۲۱/۵	۲۷/۰	۳۴/۳	۳۸/۹	۴۴/۹	۵۰/۷
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۳۳/۰	۳۶/۲	۴۲/۵	۴۹/۹	۵۷/۷	۶۴/۱	۶۹/۱
	زنان	۴۳/۸	۴۷/۴	۵۳/۲	۵۷/۳	۶۶/۹	۷۳/۵	۷۷/۹
	مردان	۲۲/۳	۲۵/۰	۳۱/۸	۴۲/۵	۴۸/۵	۵۴/۸	۶۰/۳
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۳۰/۲	۳۳/۴	۳۹/۳	۴۵/۹	۵۱/۴	۵۷/۲	۶۲/۳
	زنان	۴۰/۱	۴۳/۹	۴۹/۳	۵۲/۱	۵۸/۶	۶۴/۴	۶۸/۸
	مردان	۲۰/۲	۲۲/۹	۲۹/۲	۳۹/۷	۴۴/۱	۵۰/۱	۵۵/۷
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۳۰/۷	۳۴/۱	۴۰/۲	۴۷/۵	۵۵/۱	۶۲/۲	۶۷/۸
	زنان	۴۱/۱	۴۴/۹	۵۰/۳	۵۳/۷	۶۳/۰	۷۰/۴	۷۵/۴
	مردان	۲۰/۳	۲۳/۲	۳۰/۲	۴۱/۳	۴۷/۲	۵۴/۰	۶۰/۱
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۳۴/۱	۳۷/۰	۴۳/۱	۵۰/۵	۵۹/۳	۶۶/۱	۷۱/۱
	زنان	۴۵/۶	۴۹/۱	۵۴/۷	۵۸/۹	۶۹/۷	۷۶/۷	۸۱/۰
	مردان	۲۲/۶	۲۵/۰	۳۱/۶	۴۲/۱	۴۸/۹	۵۵/۶	۶۱/۱
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۳۷/۲	۴۰/۳	۴۷/۳	۵۵/۷	۶۴/۹	۷۰/۹	۷۵/۴
	زنان	۴۸/۴	۵۱/۷	۵۸/۴	۶۴/۶	۷۶/۲	۸۲/۳	۸۶/۵
	مردان	۲۶/۱	۲۹/۰	۳۶/۳	۴۶/۸	۵۳/۷	۵۹/۵	۶۴/۴

رشد زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۴۳/۱	۵۲/۵	۶۵/۵	۷۶/۵	۸۰/۴
مردان	۲۲/۰	۳۱/۵	۴۷/۹	۵۹/۷	۶۴/۷


مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹



^۱ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۲ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.



شیوع (%) عامل خطر استعمال دخانیات به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۳	هر دو	۱۵/۷	۱۵/۷	۱۴/۹	۱۵/۲	۱۳/۸	۱۳/۰	۱۲/۴
	زنان	۴/۰	۴/۴	۴/۳	۵/۷	۳/۸	۲/۷	۲/۳
	مردان	۲۷/۴	۲۷/۰	۲۵/۵	۲۴/۷	۲۳/۸	۲۳/۴	۲۲/۶
کمتر از ۶۰ سال ^۴	هر دو	۱۶/۱	۱۶/۱	۱۵/۳	۱۴/۶	۱۴/۴	۱۴/۱	۱۳/۷
	زنان	۳/۸	۳/۹	۳/۸	۴/۲	۳/۴	۲/۷	۲/۵
	مردان	۲۸/۵	۲۸/۲	۲۶/۹	۲۵/۰	۲۵/۵	۲۵/۶	۲۴/۹
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۴/۹	۱۴/۹	۱۳/۹	۱۶/۴	۱۲/۷	۱۰/۹	۱۰/۱
	زنان	۴/۵	۵/۲	۵/۳	۸/۶	۴/۸	۲/۸	۲/۰
	مردان	۲۵/۴	۲۴/۶	۲۲/۶	۲۴/۲	۲۰/۶	۱۸/۹	۱۷/۹
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۱۶/۳	۱۶/۹	۱۶/۴	۱۹/۴	۱۶/۶	۱۴/۷	۱۳/۸
	زنان	۵/۳	۶/۶	۷/۱	۱۲/۳	۸/۱	۵/۰	۳/۹
	مردان	۲۷/۴	۲۷/۱	۲۵/۶	۲۶/۶	۲۵/۲	۲۴/۴	۲۳/۷
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۱۴/۷	۱۴/۹	۱۴/۲	۱۷/۸	۱۴/۰	۱۲/۱	۱۱/۶
	زنان	۴/۰	۴/۸	۵/۳	۸/۹	۵/۰	۳/۱	۲/۴
	مردان	۲۵/۳	۲۵/۰	۲۳/۲	۲۶/۷	۲۳/۰	۲۱/۱	۲۰/۸
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۱۶/۰	۱۵/۷	۱۴/۳	۱۶/۵	۱۱/۸	۹/۸	۹/۰
	زنان	۶/۰	۶/۴	۶/۲	۸/۷	۴/۴	۲/۷	۱/۶
	مردان	۲۶/۰	۲۴/۹	۲۲/۵	۲۴/۲	۱۹/۲	۱۷/۰	۱۶/۲
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۱۲/۸	۱۲/۲	۱۰/۸	۱۱/۹	۸/۲	۶/۸	۶/۱
	زنان	۲/۸	۳/۱	۲/۷	۴/۵	۱/۵	۰/۴	۰/۰
	مردان	۲۲/۸	۲۱/۴	۱۸/۹	۱۹/۳	۱۴/۹	۱۳/۲	۱۲/۳



^۳ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.

^۴ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.



سیمای سلامت سالمندان

استان ایلام

شیوع عوامل خطر رفتاری



سیمای سلامت سالمندان

استان ایلام

(شیوع عوامل خطر رفتاری)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با شیوع عوامل خطر رفتاری در کل جمعیت (افراد ۱۸ سال و بالاتر)، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (افراد ۱۸ تا ۶۰ سال) ساکن در استان ایلام و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس، نوع و گروه‌های سنی بیان شده است. به منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی جهت مقایسه با استان‌های مجاور استان ایلام شامل: استان‌های کرمانشاه، خوزستان و لرستان نیز تدوین و ترسیم شده است.


آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر کمتر بودن شیوع عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در سال ۲۰۱۹ در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان ایلام نسبت به زنان غیر سالمند و بیشتر بودن در مردان سالمند نسبت به غیر سالمند است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند افزایش یافته است. شیوع فعالیت فیزیکی ناکافی در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی بیشتر (به جز گروه سنی ۶۰ تا ۶۴ سال) بوده است و با افزایش سن اختلاف شیوع در بین زنان و مردان افزایش پیدا می‌کند. زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان ایلام دارای کمترین شیوع استاندارد شده‌ی سنی فعالیت فیزیکی ناکافی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.

شیوع عامل خطر استعمال دخانیات در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان ایلام نسبت به افراد غیر سالمند کمتر است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند کاهش یافته است. درصد استعمال دخانیات در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی کمتر بوده است و با افزایش سن اختلاف درصد در بین زنان و مردان کاهش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان ایلام دارای کمترین درصد استاندارد شده‌ی سنی استعمال دخانیات نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.




شیوع (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۱	هر دو	۲۶/۷	۳۰/۵	۳۵/۴	۳۶/۵	۴۳/۳	۴۹/۲	۵۴/۱
	زنان	۳۱/۰	۳۵/۱	۴۲/۱	۴۴/۵	۵۱/۴	۵۸/۲	۶۳/۴
	مردان	۲۲/۴	۲۵/۹	۲۸/۷	۲۸/۵	۳۵/۱	۴۰/۲	۴۴/۸
کمتر از ۶۰ سال ^۲	هر دو	۲۳/۵	۲۷/۱	۳۱/۶	۳۳/۵	۴۰/۱	۴۶/۳	۵۱/۷
	زنان	۲۶/۳	۳۰/۳	۳۷/۷	۴۱/۹	۴۸/۹	۵۶/۹	۶۳/۱
	مردان	۲۰/۶	۲۳/۹	۲۵/۶	۲۵/۱	۳۱/۲	۳۵/۷	۴۰/۳
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۳۳/۳	۳۷/۴	۴۲/۹	۴۲/۵	۴۹/۷	۵۵/۰	۵۸/۹
	زنان	۴۰/۶	۴۴/۸	۵۰/۸	۴۹/۶	۵۶/۴	۶۰/۹	۶۴/۲
	مردان	۲۶/۰	۳۰/۱	۳۵/۱	۳۵/۳	۴۲/۹	۴۹/۲	۵۳/۷
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۲۷/۸	۳۱/۹	۳۷/۴	۳۶/۲	۴۳/۳	۵۰/۲	۵۵/۱
	زنان	۳۳/۸	۳۷/۹	۴۳/۶	۴۱/۲	۴۶/۵	۵۰/۷	۵۴/۰
	مردان	۲۱/۷	۲۵/۸	۳۱/۱	۳۱/۳	۴۰/۲	۴۹/۷	۵۶/۱
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۳۱/۴	۳۵/۲	۴۰/۳	۳۹/۱	۴۶/۸	۵۲/۷	۵۶/۴
	زنان	۳۸/۰	۴۱/۹	۴۷/۳	۴۵/۰	۵۱/۰	۵۵/۱	۵۸/۲
	مردان	۲۴/۸	۲۸/۵	۳۳/۳	۳۳/۱	۴۲/۷	۵۰/۳	۵۴/۷
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۳۴/۷	۳۹/۰	۴۴/۶	۴۴/۱	۵۰/۷	۵۵/۱	۵۸/۶
	زنان	۴۲/۱	۴۶/۸	۵۳/۰	۵۲/۰	۵۹/۲	۶۴/۱	۶۷/۴
	مردان	۲۷/۲	۳۱/۳	۳۶/۲	۳۶/۱	۴۲/۱	۴۶/۲	۴۹/۸
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۳۹/۴	۴۳/۷	۴۹/۴	۵۰/۵	۵۷/۹	۶۲/۲	۶۵/۶
	زنان	۴۸/۴	۵۲/۷	۵۹/۱	۶۰/۳	۶۹/۰	۷۳/۷	۷۷/۰
	مردان	۳۰/۴	۳۴/۷	۳۹/۷	۴۰/۷	۴۶/۸	۵۰/۶	۵۴/۳

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۳۹/۵	۴۹/۶	۵۴/۹	۶۲/۵	۶۵/۳
مردان	۲۵/۴	۳۴/۵	۴۲/۶	۵۴/۴	۵۸/۳

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹




^۱ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۲ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 اداره سلامت مادران


شیوع (%) عامل خطر استعمال دخانیات به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۱۹	۲۰۱۷	۲۰۱۵	۲۰۱۳	۲۰۱۱	۲۰۰۹	۲۰۰۷
همه سنین ^۳	هر دو	۶/۰	۶/۳	۶/۷	۷/۴	۸/۱	۸/۰	۸/۹
	زنان	۰/۶	۰/۴	۰/۴	۰/۴	۰/۵	۰/۷	۰/۹
	مردان	۱۱/۳	۱۲/۱	۱۳/۱	۱۴/۴	۱۵/۷	۱۵/۲	۱۶/۹
کمتر از ۶۰ سال ^۴	هر دو	۶/۸	۶/۹	۷/۳	۸/۰	۸/۹	۸/۴	۹/۱
	زنان	۰/۹	۰/۷	۰/۵	۰/۴	۰/۳	۰/۱	۰/۴
	مردان	۱۲/۷	۱۳/۲	۱۴/۱	۱۵/۶	۱۷/۴	۱۶/۸	۱۷/۷
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۴/۳	۵/۰	۵/۶	۶/۰	۶/۶	۷/۰	۹/۰
	زنان	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۲	۱/۰	۱/۹	۲/۷
	مردان	۸/۷	۱۰/۰	۱۱/۱	۱۱/۹	۱۲/۲	۱۲/۱	۱۵/۲
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۵/۳	۵/۶	۵/۸	۵/۸	۵/۸	۶/۱	۷/۸
	زنان	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۲	۰/۹
	مردان	۱۰/۷	۱۱/۲	۱۱/۶	۱۱/۵	۱۱/۶	۱۲/۰	۱۴/۷
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۲/۸	۳/۶	۴/۳	۴/۸	۵/۵	۶/۱	۸/۳
	زنان	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۱/۰	۲/۰
	مردان	۵/۵	۷/۱	۸/۶	۹/۶	۱۰/۹	۱۱/۱	۱۴/۷
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۵/۰	۵/۸	۶/۴	۷/۳	۸/۴	۸/۸	۱۰/۸
	زنان	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۹	۳/۰	۴/۰	۴/۸
	مردان	۱۰/۰	۱۱/۵	۱۲/۹	۱۳/۷	۱۳/۹	۱۳/۶	۱۶/۹
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۴/۳	۵/۰	۵/۸	۶/۳	۶/۷	۷/۰	۸/۹
	زنان	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۱/۱	۲/۵	۳/۲
	مردان	۸/۶	۱۰/۱	۱۱/۵	۱۲/۶	۱۲/۴	۱۱/۶	۱۴/۵

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۴/۲	۱/۵	۰/۲	۰/۰	۰/۰
مردان	۱۶/۹	۱۱/۹	۱۱/۶	۱۰/۰	۸/۸

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹



^۳ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۴ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.

سیمای سلامت سالمندان

استان بوشهر

شیوع عوامل خطر رفتاری



سیمای سلامت سالمندان

استان بوشهر

(شیوع عوامل خطر رفتاری)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با شیوع عوامل خطر رفتاری در کل جمعیت (افراد ۱۸ سال و بالاتر)، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (افراد ۱۸ تا ۶۰ سال) ساکن در استان بوشهر و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس، نوع و گروه‌های سنی بیان شده است. به‌منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی جهت مقایسه با استان‌های مجاور استان بوشهر شامل: استان‌های فارس، هرمزگان، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد نیز تدوین و ترسیم شده است.


آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر کمتر بودن شیوع عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان بوشهر نسبت به افراد غیر سالمند است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند افزایش یافته است. شیوع فعالیت فیزیکی ناکافی در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی بیشتر بوده است و با افزایش سن (به جز گروه سنی ۷۵ سال و بالاتر) اختلاف شیوع در بین زنان و مردان افزایش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان بوشهر دارای بیشترین و یا کمترین درصد استاندارد شده‌ی سنی شیوع فعالیت فیزیکی ناکافی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ نبوده‌اند.

شیوع عامل خطر استعمال دخانیات در سال ۲۰۱۹ در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان بوشهر نسبت به زنان غیر سالمند بیشتر و در مردان سالمند نسبت به غیر سالمند کمتر است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند کاهش یافته است. درصد استعمال دخانیات در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی کمتر بوده است و با افزایش سن اختلاف درصد در بین زنان و مردان کاهش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان بوشهر به ترتیب دارای بیشترین و کمترین درصد استاندارد شده‌ی سنی استعمال دخانیات نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.




شیوع (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۱	هر دو	۴۲/۷	۴۷/۰	۵۰/۶	۵۲/۲	۵۷/۸	۶۳/۷	۶۸/۶
	زنان	۴۸/۴	۵۴/۵	۵۸/۰	۵۹/۴	۶۶/۲	۷۳/۱	۷۸/۱
	مردان	۳۶/۹	۳۹/۶	۴۳/۳	۴۵/۰	۴۹/۴	۵۴/۳	۵۹/۲
کمتر از ۶۰ سال ^۲	هر دو	۳۶/۷	۴۲/۲	۴۵/۳	۴۸/۲	۵۵/۶	۶۳/۵	۶۹/۶
	زنان	۴۲/۵	۴۹/۸	۵۳/۰	۵۴/۷	۶۳/۰	۷۱/۷	۷۷/۸
	مردان	۳۰/۹	۳۴/۶	۳۷/۷	۴۱/۷	۴۸/۳	۵۵/۳	۶۱/۳
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۵۴/۶	۵۶/۸	۶۱/۲	۶۰/۲	۶۲/۲	۶۴/۰	۶۶/۸
	زنان	۶۰/۴	۶۳/۹	۶۷/۹	۶۹/۰	۷۲/۸	۷۵/۹	۷۸/۶
	مردان	۴۸/۹	۴۹/۷	۵۴/۶	۵۱/۵	۵۱/۷	۵۲/۱	۵۴/۹
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۴۸/۸	۵۱/۴	۵۶/۷	۵۶/۷	۶۱/۳	۶۴/۶	۶۸/۱
	زنان	۵۳/۳	۵۷/۰	۶۱/۳	۶۳/۱	۶۷/۸	۷۲/۴	۷۶/۰
	مردان	۴۴/۴	۴۵/۸	۵۲/۰	۵۰/۳	۵۴/۷	۵۶/۹	۶۰/۲
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۵۲/۰	۵۴/۳	۵۹/۲	۵۸/۴	۶۰/۳	۶۱/۴	۶۴/۳
	زنان	۵۸/۳	۶۱/۵	۶۵/۶	۶۶/۲	۶۹/۳	۷۱/۸	۷۴/۴
	مردان	۴۵/۷	۴۷/۱	۵۲/۹	۵۰/۶	۵۱/۳	۵۱/۰	۵۴/۲
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۵۶/۴	۵۸/۴	۶۲/۲	۶۰/۰	۵۹/۰	۵۹/۳	۶۱/۵
	زنان	۶۳/۱	۶۶/۹	۷۱/۰	۷۲/۳	۷۶/۱	۷۸/۹	۸۱/۶
	مردان	۴۹/۶	۴۹/۹	۵۳/۴	۴۷/۷	۴۱/۸	۳۹/۷	۴۱/۵
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۶۱/۳	۶۳/۱	۶۶/۷	۶۵/۸	۶۸/۳	۷۰/۷	۷۳/۱
	زنان	۶۷/۰	۷۰/۱	۷۳/۵	۷۴/۵	۷۷/۸	۸۰/۳	۸۲/۴
	مردان	۵۵/۷	۵۶/۱	۵۹/۹	۵۷/۲	۵۸/۸	۶۱/۱	۶۳/۸

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۵۹/۳	۶۶/۸	۷۱/۸	۷۸/۰	۸۰/۶
مردان	۴۸/۲	۵۴/۳	۵۲/۹	۵۶/۷	۶۰/۲

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹




^۱ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.

^۲ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.




شیوع (%) عامل خطر استعمال دخانیات به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۳	هر دو	۱۴/۴	۱۱/۵	۱۰/۳	۱۱/۴	۱۰/۶	۱۰/۲	۹/۶
	زنان	۷/۹	۲/۹	۱/۴	۱/۴	۲/۰	۲/۷	۲/۵
	مردان	۲۰/۹	۲۰/۰	۱۹/۳	۲۱/۴	۱۹/۱	۱۷/۷	۱۶/۸
کمتر از ۶۰ سال ^۴	هر دو	۱۳/۲	۱۱/۳	۱۰/۲	۱۱/۴	۱۰/۷	۱۰/۵	۱۰/۳
	زنان	۶/۰	۲/۱	۰/۹	۰/۹	۱/۲	۱/۹	۲/۱
	مردان	۲۰/۴	۲۰/۴	۱۹/۶	۲۱/۹	۲۰/۳	۱۹/۱	۱۸/۵
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۶/۹	۱۱/۹	۱۰/۵	۱۱/۲	۱۰/۲	۹/۵	۸/۴
	زنان	۱۱/۹	۴/۶	۲/۳	۲/۳	۳/۶	۴/۲	۳/۴
	مردان	۲۲/۰	۱۹/۲	۱۸/۶	۲۰/۲	۱۶/۷	۱۴/۸	۱۳/۳
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۱۵/۷	۱۰/۷	۹/۴	۱۰/۰	۹/۱	۹/۲	۸/۷
	زنان	۹/۸	۲/۳	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۸	۰/۶
	مردان	۲۱/۶	۱۹/۰	۱۸/۷	۲۰/۰	۱۸/۲	۱۷/۶	۱۶/۸
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۱۶/۲	۱۱/۲	۹/۹	۱۰/۹	۹/۲	۸/۶	۷/۷
	زنان	۱۱/۳	۳/۷	۱/۱	۰/۰	۰/۰	۰/۷	۰/۰
	مردان	۲۱/۰	۱۸/۶	۱۸/۷	۲۱/۸	۱۸/۴	۱۶/۵	۱۵/۴
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۱۸/۸	۱۳/۶	۱۲/۲	۱۲/۶	۱۱/۵	۱۰/۵	۹/۲
	زنان	۱۴/۲	۶/۹	۴/۸	۴/۱	۶/۵	۷/۵	۶/۹
	مردان	۲۳/۴	۲۰/۴	۱۹/۶	۲۱/۱	۱۶/۶	۱۳/۵	۱۱/۶
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۱۷/۰	۱۲/۰	۱۰/۵	۱۱/۵	۱۰/۸	۹/۶	۷/۸
	زنان	۱۲/۱	۵/۴	۳/۴	۴/۹	۷/۸	۷/۷	۶/۱
	مردان	۲۱/۹	۱۸/۶	۱۷/۶	۱۸/۱	۱۳/۷	۱۱/۴	۹/۵

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۱۱/۵	۱/۸	۲/۹	۲/۷	۲/۰
مردان	۲۱/۸	۱۸/۶	۱۷/۰	۱۴/۰	۱۲/۷

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹



^۳ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۴ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.

سیمای سلامت سالمندان

استان تهران

شیوع عوامل خطر رفتاری



سیمای سلامت سالمندان

استان تهران

(شیوع عوامل خطر رفتاری)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با شیوع عوامل خطر رفتاری در کل جمعیت (افراد ۱۸ سال و بالاتر)، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (افراد ۱۸ تا ۶۰ سال) ساکن در استان تهران و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس، نوع و گروه‌های سنی بیان شده است. به‌منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی جهت مقایسه با استان‌های مجاور استان تهران شامل: استان‌های البرز، مرکزی، مازندران، قم و سمنان نیز تدوین و ترسیم شده است.


آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر بیشتر بودن شیوع عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان تهران نسبت به افراد غیر سالمند است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند افزایش یافته است. شیوع فعالیت فیزیکی ناکافی در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی بیشتر بوده است و با افزایش سن اختلاف شیوع در بین زنان و مردان افزایش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان تهران دارای بیشترین و یا کمترین شیوع استاندارد شده‌ی سنی فعالیت فیزیکی ناکافی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ نبوده‌اند.

شیوع عامل خطر استعمال دخانیات در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان تهران نسبت به افراد غیر سالمند کمتر است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند کاهش یافته است. درصد استعمال دخانیات در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی کمتر بوده است و با افزایش سن اختلاف درصد در بین زنان و مردان کاهش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان تهران دارای بیشترین و یا کمترین درصد استاندارد شده‌ی سنی استعمال دخانیات نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ نبوده‌اند.




شیوع (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۱	هر دو	۳۲/۹	۳۸/۳	۴۳/۶	۴۶/۳	۵۱/۴	۵۵/۴	۶۰/۰
	زنان	۳۶/۸	۴۳/۸	۴۹/۱	۵۲/۸	۵۹/۰	۶۴/۲	۶۸/۹
	مردان	۲۹/۰	۳۲/۸	۳۸/۱	۳۹/۷	۴۳/۸	۴۶/۷	۵۱/۰
کمتر از ۶۰ سال ^۲	هر دو	۲۸/۷	۳۴/۶	۳۹/۸	۴۲/۷	۴۸/۱	۵۲/۳	۵۷/۱
	زنان	۳۲/۰	۳۹/۷	۴۴/۹	۴۸/۲	۵۴/۷	۶۰/۲	۶۵/۴
	مردان	۲۵/۳	۲۹/۵	۳۴/۷	۳۷/۲	۴۱/۵	۴۴/۴	۴۸/۹
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۴۱/۴	۴۵/۶	۵۱/۲	۵۳/۴	۵۷/۹	۶۱/۵	۶۵/۷
	زنان	۴۶/۳	۵۱/۹	۵۷/۶	۶۲/۰	۶۷/۵	۷۲/۰	۷۶/۱
	مردان	۳۶/۵	۳۹/۳	۴۴/۸	۴۴/۸	۴۸/۴	۵۱/۱	۵۵/۴
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۳۸/۰	۴۲/۳	۴۸/۵	۵۰/۸	۵۵/۳	۵۷/۸	۶۱/۷
	زنان	۴۲/۰	۴۷/۸	۵۳/۹	۵۸/۴	۶۳/۳	۶۷/۰	۷۱/۱
	مردان	۳۳/۹	۳۶/۸	۴۳/۰	۴۳/۱	۴۷/۴	۴۸/۶	۵۲/۳
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۳۹/۴	۴۳/۸	۴۹/۵	۵۱/۶	۵۵/۷	۵۹/۳	۶۳/۶
	زنان	۴۴/۰	۴۹/۸	۵۵/۲	۵۹/۴	۶۴/۵	۶۹/۳	۷۳/۶
	مردان	۳۴/۹	۳۷/۸	۴۳/۷	۴۳/۸	۴۷/۰	۴۹/۲	۵۳/۷
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۴۲/۳	۴۶/۱	۵۱/۴	۵۲/۹	۵۷/۰	۶۰/۹	۶۵/۲
	زنان	۴۷/۴	۵۲/۵	۵۷/۷	۶۱/۳	۶۶/۶	۷۰/۹	۷۵/۰
	مردان	۳۷/۲	۳۹/۸	۴۵/۱	۴۴/۶	۴۷/۴	۵۰/۸	۵۵/۴
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۴۶/۰	۵۰/۱	۵۵/۵	۵۸/۳	۶۳/۷	۶۸/۳	۷۲/۴
	زنان	۵۱/۸	۵۷/۵	۶۳/۵	۶۸/۷	۷۵/۷	۸۰/۸	۸۴/۶
	مردان	۴۰/۲	۴۲/۸	۴۷/۵	۴۷/۹	۵۱/۸	۵۵/۷	۶۰/۲

رشد زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۴۵/۷	۵۷/۱	۶۶/۹	۷۵/۴	۷۹/۱
مردان	۳۶/۱	۴۴/۶	۴۸/۳	۵۵/۰	۵۹/۸

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹




^۱ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.

^۲ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.




شیوع (%) عامل خطر استعمال دخانیات به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۳	هر دو	۱۴/۸	۱۴/۶	۱۴/۵	۱۲/۷	۱۲/۵	۱۱/۸	۱۰/۸
	زنان	۳/۷	۳/۳	۳/۲	۲/۸	۲/۷	۲/۴	۲/۱
	مردان	۲۶/۰	۲۶/۰	۲۵/۷	۲۲/۶	۲۲/۴	۲۱/۲	۲۰/۳
کمتر از ۶۰ سال ^۴	هر دو	۱۵/۲	۱۵/۶	۱۵/۴	۱۳/۷	۱۳/۴	۱۲/۵	۱۱/۹
	زنان	۳/۷	۳/۵	۳/۴	۳/۰	۲/۹	۲/۵	۲/۴
	مردان	۲۶/۸	۲۷/۷	۲۷/۴	۲۴/۳	۲۴/۰	۲۲/۵	۲۱/۵
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۴/۰	۱۲/۷	۱۲/۶	۱۰/۹	۱۰/۷	۱۰/۳	۹/۷
	زنان	۳/۶	۲/۹	۲/۷	۲/۶	۲/۳	۲/۰	۱/۶
	مردان	۲۴/۴	۲۲/۵	۲۲/۴	۱۹/۳	۱۹/۱	۱۸/۵	۱۷/۸
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۱۴/۶	۱۳/۷	۱۴/۳	۱۳/۲	۱۳/۴	۱۳/۵	۱۳/۴
	زنان	۳/۶	۳/۲	۳/۴	۳/۱	۳/۱	۳/۱	۳/۲
	مردان	۲۵/۶	۲۴/۱	۲۵/۲	۲۳/۴	۲۳/۷	۲۳/۸	۲۳/۵
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۱۳/۷	۱۲/۵	۱۲/۴	۱۰/۷	۱۰/۶	۱۰/۴	۹/۹
	زنان	۳/۱	۲/۵	۲/۴	۲/۴	۱/۹	۱/۷	۱/۱
	مردان	۲۴/۲	۲۲/۵	۲۲/۴	۱۹/۰	۱۹/۴	۱۹/۲	۱۸/۷
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۱۵/۲	۱۳/۵	۱۲/۹	۱۰/۸	۱۰/۱	۹/۰	۸/۲
	زنان	۵/۰	۳/۹	۳/۱	۲/۷	۲/۲	۱/۵	۰/۶
	مردان	۲۵/۵	۲۳/۲	۲۲/۷	۱۸/۹	۱۸/۰	۱۶/۶	۱۵/۸
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۱۲/۶	۱۱/۲	۱۰/۷	۹/۰	۸/۷	۸/۱	۷/۲
	زنان	۲/۷	۲/۲	۲/۱	۲/۱	۲/۱	۱/۹	۱/۳
	مردان	۲۲/۴	۲۰/۲	۱۹/۴	۱۵/۸	۱۵/۴	۱۴/۳	۱۳/۲

رشد زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۳/۵	۲/۸	۲/۴	۱/۸	۱/۵
مردان	۲۴/۵	۲۲/۸	۱۹/۸	۱۸/۷	۱۸/۰

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹



^۳ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۴ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.

سیمای سلامت سالمندان

استان چهارمحال و بختیاری

شیوع عوامل خطر رفتاری

سیمای سلامت سالمندان

چهارمحال و استان بختیاری

(شیوع عوامل خطر رفتاری)



در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با شیوع عوامل خطر رفتاری در کل جمعیت (افراد ۱۸ سال و بالاتر)، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (افراد ۱۸ تا ۶۰ سال) ساکن در استان چهارمحال و بختیاری و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس، نوع و گروه‌های سنی بیان شده است. به‌منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی جهت مقایسه با استان‌های مجاور استان چهارمحال و بختیاری شامل: استان‌های اصفهان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان نیز تدوین و ترسیم شده است.


آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر بیشتر بودن شیوع عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به افراد غیر سالمند است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند افزایش یافته است. شیوع فعالیت فیزیکی ناکافی در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی بیشتر بوده است و با افزایش سن (به جز برای گروه سنی ۶۵ تا ۶۹ سال) اختلاف شیوع در بین زنان و مردان افزایش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان کهگیلویه و بویراحمد دارای بیشترین شیوع استاندارد شده‌ی سنی فعالیت فیزیکی ناکافی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.

شیوع عامل خطر استعمال دخانیات در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به افراد غیر سالمند کمتر است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند کاهش یافته است. درصد استعمال دخانیات در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی کمتر بوده است و با افزایش سن اختلاف درصد در بین زنان و مردان کاهش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان کهگیلویه و بویراحمد دارای بیشترین و یا کمترین درصد استاندارد شده‌ی سنی استعمال دخانیات نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ نبوده‌اند.




شیوع (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۱	هر دو	۳۱/۱	۳۷/۳	۳۸/۲	۳۷/۸	۴۶/۵	۵۵/۲	۶۱/۱
	زنان	۳۷/۱	۴۴/۳	۴۵/۱	۴۸/۴	۵۶/۶	۶۵/۴	۷۱/۴
	مردان	۲۵/۰	۳۰/۴	۳۱/۲	۲۷/۱	۳۶/۵	۴۵/۰	۵۰/۸
کمتر از ۶۰ سال ^۲	هر دو	۲۵/۹	۳۲/۴	۳۳/۷	۳۳/۱	۴۱/۸	۵۱/۶	۵۸/۴
	زنان	۳۰/۳	۳۷/۳	۳۹/۱	۴۱/۲	۴۹/۹	۶۰/۲	۶۷/۳
	مردان	۲۱/۵	۲۷/۴	۲۸/۴	۲۵/۰	۳۳/۸	۴۲/۹	۴۹/۵
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۴۱/۵	۴۷/۳	۴۷/۰	۴۷/۰	۵۵/۹	۶۲/۵	۶۶/۵
	زنان	۵۰/۸	۵۸/۲	۵۷/۲	۶۲/۷	۷۰/۰	۷۵/۹	۷۹/۴
	مردان	۳۲/۲	۳۶/۴	۳۶/۹	۳۱/۳	۴۱/۹	۴۹/۱	۵۳/۵
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۳۵/۱	۴۱/۲	۴۱/۰	۳۹/۷	۴۷/۸	۵۶/۳	۶۱/۷
	زنان	۴۳/۶	۵۱/۱	۴۹/۸	۵۴/۶	۶۰/۳	۶۷/۶	۷۲/۴
	مردان	۲۶/۷	۳۱/۴	۳۲/۲	۲۴/۹	۳۵/۳	۴۵/۰	۵۱/۰
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۳۸/۸	۴۴/۸	۴۴/۶	۴۴/۱	۵۳/۷	۶۱/۳	۶۵/۹
	زنان	۴۸/۷	۵۶/۲	۵۴/۷	۵۹/۴	۶۵/۴	۷۱/۱	۷۴/۷
	مردان	۲۸/۹	۳۳/۵	۳۴/۵	۲۸/۸	۴۱/۹	۵۱/۵	۵۷/۰
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۴۳/۰	۴۸/۲	۴۷/۵	۴۷/۶	۵۷/۳	۶۲/۹	۶۵/۹
	زنان	۵۲/۲	۵۸/۹	۵۷/۴	۶۳/۰	۷۱/۶	۷۷/۳	۸۰/۲
	مردان	۳۳/۷	۳۷/۵	۳۷/۶	۳۲/۳	۴۳/۰	۴۸/۵	۵۱/۷
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۴۹/۱	۵۵/۰	۵۵/۱	۵۶/۶	۶۵/۰	۶۹/۵	۷۲/۴
	زنان	۵۸/۸	۶۶/۶	۶۶/۸	۷۳/۹	۸۲/۶	۸۷/۵	۹۰/۵
	مردان	۳۹/۳	۴۳/۴	۴۳/۴	۳۹/۳	۴۷/۴	۵۱/۵	۵۴/۴

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۴۹/۸	۵۶/۲	۶۸/۵	۷۸/۴	۸۱/۲
مردان	۳۱/۳	۳۶/۲	۴۱/۰	۵۳/۴	۵۶/۸

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹




^۱ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۲ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.




شیوع (%) عامل خطر استعمال دخانیات به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۳	هر دو	۱۵/۹	۱۶/۰	۱۵/۴	۱۵/۴	۱۴/۲	۱۳/۲	۱۲/۳
	زنان	۳/۴	۲/۴	۱/۷	۲/۲	۱/۶	۱/۳	۰/۸
	مردان	۲۸/۴	۲۹/۶	۲۹/۲	۲۸/۶	۲۶/۸	۲۵/۱	۲۳/۸
کمتر از ۶۰ سال ^۴	هر دو	۱۵/۷	۱۶/۴	۱۶/۲	۱۶/۱	۱۵/۰	۱۳/۸	۱۳/۰
	زنان	۲/۲	۱/۶	۱/۱	۱/۶	۱/۰	۰/۹	۰/۷
	مردان	۲۹/۳	۳۱/۲	۳۱/۲	۳۰/۷	۲۸/۹	۲۶/۷	۲۵/۴
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۶/۲	۱۵/۲	۱۴/۰	۱۳/۹	۱۲/۶	۱۲/۰	۱۰/۸
	زنان	۵/۸	۴/۱	۳/۰	۳/۶	۲/۶	۲/۱	۰/۹
	مردان	۲۶/۶	۲۶/۳	۲۵/۰	۲۴/۳	۲۲/۷	۲۲/۰	۲۰/۷
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۱۴/۸	۱۴/۲	۱۳/۴	۱۴/۵	۱۴/۱	۱۵/۰	۱۴/۳
	زنان	۳/۸	۲/۳	۱/۳	۱/۹	۰/۹	۱/۰	۰/۰
	مردان	۲۵/۸	۲۶/۲	۲۵/۶	۲۷/۱	۲۷/۳	۲۹/۰	۲۸/۷
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۱۵/۶	۱۴/۹	۱۴/۰	۱۴/۵	۱۴/۲	۱۴/۱	۱۳/۰
	زنان	۵/۵	۴/۰	۲/۹	۳/۵	۲/۴	۱/۸	۰/۵
	مردان	۲۵/۸	۲۵/۸	۲۵/۲	۲۵/۶	۲۶/۰	۲۶/۳	۲۵/۶
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۱۷/۸	۱۶/۴	۱۴/۷	۱۴/۱	۱۲/۱	۱۰/۴	۸/۷
	زنان	۷/۴	۵/۲	۳/۷	۳/۸	۲/۳	۱/۳	۰/۰
	مردان	۲۸/۲	۲۷/۵	۲۵/۸	۲۴/۴	۲۱/۸	۱۹/۶	۱۷/۴
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۱۶/۵	۱۵/۳	۱۳/۷	۱۲/۶	۱۰/۳	۸/۷	۷/۱
	زنان	۶/۳	۵/۰	۴/۱	۵/۱	۴/۸	۴/۳	۳/۲
	مردان	۲۶/۸	۲۵/۶	۲۳/۳	۲۰/۰	۱۵/۷	۱۳/۰	۱۱/۰

رشد زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۵/۴	۲/۷	۲/۴	۰/۸	۰/۴
مردان	۲۶/۴	۲۵/۰	۲۳/۴	۲۲/۰	۲۰/۵

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹



^۳ همه سنین در این گزارش به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۴ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.



سیمای سلامت سالمندان

استان خراسان جنوبی

شیوع عوامل خطر رفتاری



سیمای سلامت سالمندان

استان خراسان جنوبی

(شیوع عوامل خطر رفتاری)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با شیوع عوامل خطر رفتاری در کل جمعیت (افراد ۱۸ سال و بالاتر)، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (افراد ۱۸ تا ۶۰ سال) ساکن در استان خراسان جنوبی و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس، نوع و گروه‌های سنی بیان شده است. به‌منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی جهت مقایسه با استان‌های مجاور استان خراسان جنوبی شامل: استان‌های اصفهان، کرمان، خراسان رضوی، سمنان، سیستان و بلوچستان و یزد نیز تدوین و ترسیم شده است.


آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر بیشتر بودن شیوع عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان خراسان جنوبی نسبت به افراد غیر سالمند است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند افزایش یافته است. شیوع فعالیت فیزیکی ناکافی در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی بیشتر بوده است و با افزایش سن اختلاف شیوع در بین زنان و مردان افزایش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان خراسان جنوبی دارای کمترین شیوع استاندارد شده‌ی سنی فعالیت فیزیکی ناکافی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.

شیوع عامل خطر استعمال دخانیات در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان خراسان جنوبی نسبت به افراد غیر سالمند کمتر است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند کاهش یافته است. درصد استعمال دخانیات در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی کمتر بوده است و با افزایش سن (به جز گروه‌های سنی ۶۵ تا ۶۹ و ۷۰ تا ۷۴ سال) اختلاف درصد در بین زنان و مردان کاهش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان خراسان جنوبی دارای بیشترین و یا کمترین درصد استاندارد شده‌ی سنی استعمال دخانیات نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ نبوده‌اند.




شیوع (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۱	هر دو	۲۸/۳	۳۲/۲	۳۴/۴	۳۸/۱	۴۱/۶	۴۵/۳	۴۹/۲
	زنان	۳۳/۸	۳۸/۴	۴۰/۵	۴۸/۷	۵۱/۳	۵۵/۲	۵۹/۳
	مردان	۲۲/۸	۲۶/۰	۲۸/۳	۲۷/۵	۳۱/۹	۳۵/۵	۳۹/۲
کمتر از ۶۰ سال ^۲	هر دو	۲۳/۹	۲۸/۰	۳۰/۸	۳۴/۸	۳۹/۳	۴۴/۰	۴۸/۵
	زنان	۲۸/۰	۳۳/۰	۳۵/۷	۴۴/۴	۴۸/۴	۵۳/۷	۵۸/۷
	مردان	۱۹/۸	۲۳/۰	۲۵/۸	۲۵/۳	۳۰/۲	۳۴/۳	۳۸/۴
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۳۷/۰	۴۰/۶	۴۱/۶	۴۴/۷	۴۶/۲	۴۸/۰	۵۰/۷
	زنان	۴۵/۳	۴۹/۲	۵۰/۰	۵۷/۴	۵۷/۱	۵۸/۲	۶۰/۶
	مردان	۲۸/۶	۳۱/۹	۳۳/۲	۳۱/۹	۳۵/۲	۳۷/۹	۴۰/۸
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۲۹/۴	۳۳/۰	۳۴/۳	۳۸/۰	۴۱/۲	۴۴/۴	۴۷/۷
	زنان	۳۶/۵	۴۰/۱	۴۰/۵	۴۸/۵	۴۹/۵	۵۱/۰	۵۳/۳
	مردان	۲۲/۲	۲۵/۹	۲۸/۰	۲۷/۴	۳۲/۹	۳۷/۹	۴۲/۱
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۳۳/۳	۳۷/۴	۳۸/۷	۴۲/۰	۴۲/۵	۴۳/۲	۴۵/۹
	زنان	۴۰/۸	۴۵/۴	۴۶/۵	۵۴/۴	۵۲/۴	۵۱/۸	۵۴/۱
	مردان	۲۵/۸	۲۹/۳	۳۱/۰	۲۹/۷	۳۲/۵	۳۴/۶	۳۷/۷
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۳۹/۶	۴۲/۸	۴۳/۱	۴۵/۳	۴۵/۱	۴۶/۲	۴۸/۴
	زنان	۴۸/۳	۵۱/۸	۵۲/۳	۵۹/۱	۵۷/۸	۵۸/۸	۶۱/۵
	مردان	۳۱/۰	۳۳/۷	۳۳/۹	۳۱/۶	۳۲/۴	۳۳/۵	۳۵/۳
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۴۵/۵	۴۹/۱	۵۰/۳	۵۳/۳	۵۵/۹	۵۸/۴	۶۰/۷
	زنان	۵۵/۵	۵۹/۷	۶۰/۸	۶۷/۵	۶۸/۸	۷۱/۰	۷۳/۴
	مردان	۳۵/۵	۳۸/۵	۳۹/۷	۳۹/۱	۴۳/۱	۴۵/۸	۴۷/۹

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۴۳/۹	۴۸/۶	۵۶/۰	۵۹/۴	۶۲/۳
مردان	۲۷/۶	۳۲/۴	۳۵/۱	۴۱/۳	۴۴/۵

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹




^۱ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۲ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.




شیوع (%) عامل خطر استعمال دخانیات به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۱۹	۲۰۱۷	۲۰۱۵	۲۰۱۳	۲۰۱۱	۲۰۰۹	۲۰۰۷
همه سنین ^۳	هر دو	۶/۳	۷/۰	۸/۱	۹/۶	۱۱/۵	۱۰/۹	۱۲/۰
	زنان	۰/۵	۱/۰	۱/۴	۱/۵	۲/۱	۲/۰	۲/۸
	مردان	۱۲/۰	۱۳/۱	۱۴/۷	۱۷/۶	۲۰/۸	۱۹/۸	۲۱/۱
کمتر از ۶۰ سال ^۴	هر دو	۶/۷	۷/۲	۷/۹	۹/۱	۱۰/۲	۱۰/۲	۱۰/۹
	زنان	۰/۷	۱/۰	۱/۱	۰/۷	۰/۹	۰/۷	۱/۲
	مردان	۱۲/۶	۱۳/۳	۱۴/۷	۱۷/۴	۱۹/۵	۱۹/۷	۲۰/۶
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۵/۴	۶/۷	۸/۴	۱۰/۶	۱۳/۹	۱۲/۳	۱۴/۱
	زنان	۰/۰	۰/۹	۲/۰	۳/۰	۴/۵	۴/۵	۵/۹
	مردان	۱۰/۸	۱۲/۶	۱۴/۸	۱۸/۱	۲۳/۳	۲۰/۰	۲۲/۲
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۵/۹	۶/۵	۷/۲	۸/۵	۱۰/۱	۹/۵	۱۱/۴
	زنان	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۱	۰/۸	۲/۷
	مردان	۱۱/۹	۱۲/۹	۱۴/۴	۱۷/۰	۲۰/۱	۱۸/۲	۲۰/۱
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۶/۲	۷/۵	۹/۰	۱۱/۳	۱۵/۰	۱۱/۸	۱۳/۲
	زنان	۰/۰	۱/۲	۲/۲	۲/۸	۴/۴	۳/۶	۴/۵
	مردان	۱۲/۴	۱۳/۸	۱۵/۸	۱۹/۸	۲۵/۵	۲۰/۰	۲۱/۹
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۶/۲	۸/۰	۱۰/۲	۱۲/۷	۱۶/۵	۱۴/۵	۱۶/۵
	زنان	۰/۰	۱/۲	۳/۰	۴/۷	۶/۸	۶/۷	۸/۲
	مردان	۱۲/۴	۱۴/۷	۱۷/۵	۲۰/۷	۲۶/۲	۲۲/۴	۲۴/۸
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۳/۳	۵/۰	۷/۳	۹/۸	۱۴/۱	۱۳/۱	۱۵/۱
	زنان	۰/۰	۱/۱	۲/۹	۴/۶	۶/۷	۶/۷	۸/۱
	مردان	۶/۷	۹/۰	۱۱/۶	۱۵/۱	۲۱/۵	۱۹/۵	۲۲/۱

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۱۹	۲۰۱۷	۲۰۱۳	۲۰۰۹	۲۰۰۵
زنان	۰/۰	۰/۸	۲/۵	۳/۹	۸/۹
مردان	۱۰/۹	۱۲/۵	۱۷/۸	۱۹/۶	۲۳/۱

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹



^۳ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۴ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.



سیمای سلامت سالمندان

استان خراسان رضوی

شیوع عوامل خطر رفتاری



سیمای سلامت سالمندان

استان خراسان رضوی

(شیوع عوامل خطر رفتاری)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با شیوع عوامل خطر رفتاری در کل جمعیت (افراد ۱۸ سال و بالاتر)، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (افراد ۱۸ تا ۶۰ سال) ساکن در استان خراسان رضوی و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس، نوع و گروه‌های سنی بیان شده است. به‌منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی جهت مقایسه با استان‌های مجاور استان خراسان رضوی شامل: استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سمنان نیز تدوین و ترسیم شده است.


آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر بیشتر بودن شیوع عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان خراسان رضوی نسبت به افراد غیر سالمند است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند افزایش یافته است. شیوع فعالیت فیزیکی ناکافی در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی بیشتر بوده است و با افزایش سن اختلاف شیوع در بین زنان و مردان افزایش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان خراسان رضوی دارای بیشترین و یا کمترین شیوع استاندارد شده‌ی سنی فعالیت فیزیکی ناکافی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ نبوده‌اند.

شیوع عامل خطر استعمال دخانیات در سال ۲۰۱۹ در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان خراسان رضوی نسبت به افراد غیر سالمند بیشتر و در مردان سالمند نسبت به غیر سالمند کمتر است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند کاهش یافته است. درصد استعمال دخانیات در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی کمتر بوده است و با افزایش سن اختلاف درصد در بین زنان و مردان کاهش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان خراسان رضوی دارای بیشترین درصد استاندارد شده‌ی سنی استعمال دخانیات نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ نبوده‌اند.




شیوع (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۱	هر دو	۳۱/۲	۳۵/۶	۴۰/۱	۴۶/۷	۵۰/۱	۵۳/۹	۵۸/۲
	زنان	۳۴/۸	۳۹/۴	۴۶/۰	۵۴/۰	۵۷/۲	۶۱/۴	۶۵/۷
	مردان	۲۷/۷	۳۱/۸	۳۴/۳	۳۹/۴	۴۲/۹	۴۶/۵	۵۰/۸
کمتر از ۶۰ سال ^۲	هر دو	۲۵/۸	۳۰/۱	۳۴/۵	۴۱/۸	۴۵/۶	۴۹/۹	۵۴/۶
	زنان	۲۷/۵	۳۲/۴	۳۹/۱	۴۸/۱	۵۲/۱	۵۷/۳	۶۲/۳
	مردان	۲۴/۱	۲۷/۸	۲۹/۹	۳۵/۵	۳۹/۰	۴۲/۶	۴۷/۰
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۴۲/۱	۴۶/۷	۵۱/۴	۵۶/۵	۵۹/۰	۶۱/۹	۶۵/۴
	زنان	۴۹/۲	۵۳/۴	۵۹/۷	۶۵/۹	۶۷/۴	۶۹/۵	۷۳/۵
	مردان	۳۴/۹	۳۹/۹	۴۳/۲	۴۷/۱	۵۰/۷	۵۴/۳	۵۸/۴
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۳۴/۸	۳۹/۴	۴۴/۳	۴۹/۸	۵۲/۵	۵۵/۰	۵۸/۷
	زنان	۴۰/۳	۴۴/۲	۵۰/۵	۵۷/۱	۵۸/۵	۵۹/۹	۶۲/۹
	مردان	۲۹/۴	۳۴/۶	۳۸/۱	۴۲/۵	۴۶/۶	۵۰/۰	۵۴/۴
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۳۹/۱	۴۳/۷	۴۸/۴	۵۳/۴	۵۵/۴	۵۸/۰	۶۱/۵
	زنان	۴۵/۳	۴۹/۳	۵۵/۳	۶۱/۳	۶۱/۶	۶۳/۰	۶۵/۸
	مردان	۳۲/۹	۳۸/۱	۴۱/۵	۴۵/۵	۴۹/۲	۵۳/۰	۵۷/۲
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۴۴/۳	۴۸/۷	۵۳/۱	۵۷/۸	۵۹/۹	۶۳/۰	۶۶/۴
	زنان	۵۳/۰	۵۶/۷	۶۲/۶	۶۸/۰	۶۹/۱	۷۱/۴	۷۴/۲
	مردان	۳۵/۶	۴۰/۶	۴۳/۶	۴۷/۵	۵۰/۶	۵۴/۵	۵۸/۶
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۵۰/۰	۵۴/۹	۶۰/۰	۶۵/۰	۶۸/۳	۷۱/۸	۷۵/۱
	زنان	۵۸/۵	۶۳/۳	۷۰/۶	۷۷/۱	۸۰/۵	۸۳/۸	۸۶/۹
	مردان	۴۱/۶	۴۶/۴	۴۹/۴	۵۲/۸	۵۶/۲	۵۹/۸	۶۳/۳

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹



روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان




جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۴۷/۸	۵۸/۳	۶۶/۰	۷۱/۰	۷۴/۰
مردان	۳۴/۱	۴۲/۴	۵۰/۱	۵۷/۸	۶۲/۰

^۱ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۲ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.




شیوع (%) عامل خطر استعمال دخانیات به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۱۹	۲۰۱۷	۲۰۱۵	۲۰۱۳	۲۰۱۱	۲۰۰۹	۲۰۰۷
همه سنین ^۳	هر دو	۷/۵	۸/۰	۸/۵	۹/۰	۹/۱	۱۰/۱	۱۰/۹
	زنان	۰/۶	۰/۸	۰/۹	۱/۰	۱/۰	۱/۲	۲/۱
	مردان	۱۴/۴	۱۵/۲	۱۶/۱	۱۶/۹	۱۷/۳	۱۹/۱	۱۹/۷
کمتر از ۶۰ سال ^۴	هر دو	۷/۵	۷/۸	۸/۴	۹/۱	۹/۴	۱۰/۶	۱۱/۲
	زنان	۰/۳	۰/۳	۰/۳	۰/۳	۰/۳	۰/۴	۱/۱
	مردان	۱۴/۷	۱۵/۴	۱۶/۵	۱۷/۹	۱۸/۵	۲۰/۷	۲۱/۳
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۷/۶	۸/۳	۸/۸	۸/۸	۸/۶	۹/۳	۱۰/۲
	زنان	۱/۳	۱/۸	۲/۳	۲/۴	۲/۴	۲/۷	۴/۰
	مردان	۱۳/۸	۱۴/۸	۱۵/۴	۱۵/۱	۱۴/۹	۱۵/۸	۱۶/۳
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۸/۷	۹/۰	۸/۸	۸/۳	۸/۲	۸/۰	۸/۶
	زنان	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۱/۱
	مردان	۱۷/۴	۱۷/۹	۱۷/۷	۱۶/۶	۱۶/۳	۱۶/۰	۱۶/۰
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۶/۹	۷/۳	۷/۶	۷/۳	۷/۴	۸/۴	۹/۳
	زنان	۰/۰	۰/۰	۰/۱	۰/۰	۰/۲	۰/۹	۲/۴
	مردان	۱۳/۷	۱۴/۶	۱۵/۱	۱۴/۶	۱۴/۶	۱۵/۹	۱۶/۲
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۷/۹	۹/۱	۱۰/۱	۱۰/۲	۹/۹	۱۰/۸	۱۲/۰
	زنان	۰/۹	۲/۴	۳/۷	۴/۱	۴/۲	۴/۹	۶/۶
	مردان	۱۴/۹	۱۵/۹	۱۶/۵	۱۶/۳	۱۵/۵	۱۶/۷	۱۷/۳
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۶/۷	۷/۹	۸/۸	۹/۳	۹/۲	۹/۹	۱۰/۸
	زنان	۴/۴	۵/۰	۵/۳	۵/۶	۵/۳	۵/۱	۵/۸
	مردان	۹/۰	۱۰/۷	۱۲/۲	۱۳/۱	۱۳/۰	۱۴/۶	۱۵/۸

رشد زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۵/۷	۲/۲	۲/۰	۱/۵	۱/۱
مردان	۱۷/۴	۱۵/۸	۱۵/۲	۱۵/۱	۱۴/۲

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹



^۳ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۴ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.



سیمای سلامت سالمندان

استان خراسان شمالی

شیوع عوامل خطر رفتاری



سیمای سلامت سالمندان

استان خراسان شمالی

(شیوع عوامل خطر رفتاری)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با شیوع عوامل خطر رفتاری در کل جمعیت (افراد ۱۸ سال و بالاتر)، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (افراد ۱۸ تا ۶۰ سال) ساکن در استان خراسان شمالی و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس، نوع و گروه‌های سنی بیان شده است. به‌منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی جهت مقایسه با استان‌های مجاور استان خراسان شمالی شامل: استان‌های گلستان، خراسان رضوی و سمنان نیز تدوین و ترسیم شده است.


آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر بیشتر بودن شیوع عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان خراسان شمالی نسبت به افراد غیر سالمند است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند افزایش یافته است. شیوع فعالیت فیزیکی ناکافی در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی بیشتر بوده است و با افزایش سن (به جز گروه سنی ۷۵ سال و بالاتر) اختلاف شیوع در بین زنان و مردان افزایش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان خراسان شمالی دارای کمترین شیوع استاندارد شده‌ی سنی فعالیت فیزیکی ناکافی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.

شیوع عامل خطر استعمال دخانیات در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان خراسان شمالی نسبت به افراد غیر سالمند یکسان است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند کاهش یافته است. درصد استعمال دخانیات در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی کمتر بوده است و با افزایش سن اختلاف درصد در بین زنان و مردان کاهش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان خراسان شمالی دارای بیشترین و یا کمترین درصد استاندارد شده‌ی سنی استعمال دخانیات نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ نبوده‌اند.




شیوع (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۱	هر دو	۳۳/۷	۳۹/۱	۴۱/۰	۴۰/۱	۴۴/۳	۴۶/۴	۴۹/۶
	زنان	۴۱/۶	۴۸/۳	۵۱/۰	۵۵/۰	۵۶/۶	۵۷/۱	۵۹/۵
	مردان	۲۵/۷	۲۹/۹	۳۱/۰	۲۵/۲	۳۲/۰	۳۵/۷	۳۹/۶
کمتر از ۶۰ سال ^۲	هر دو	۲۷/۹	۳۴/۱	۳۶/۶	۳۶/۹	۴۱/۵	۴۳/۹	۴۷/۶
	زنان	۳۴/۳	۴۲/۱	۴۵/۶	۵۱/۲	۵۳/۷	۵۴/۵	۵۷/۳
	مردان	۲۱/۴	۲۶/۲	۲۷/۵	۲۲/۶	۲۹/۳	۳۳/۴	۳۷/۸
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۴۵/۳	۴۹/۰	۴۹/۸	۴۶/۶	۴۹/۹	۵۱/۲	۵۳/۶
	زنان	۵۶/۴	۶۰/۸	۶۱/۷	۶۲/۸	۶۲/۵	۶۲/۲	۶۴/۰
	مردان	۳۴/۳	۳۷/۲	۳۷/۹	۳۰/۳	۳۷/۴	۴۰/۲	۴۳/۱
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۳۷/۳	۴۱/۴	۴۲/۸	۳۹/۳	۴۲/۴	۴۲/۴	۴۴/۶
	زنان	۴۷/۹	۵۲/۶	۵۳/۷	۵۵/۳	۵۴/۳	۵۱/۱	۵۱/۷
	مردان	۲۶/۷	۳۰/۲	۳۱/۹	۲۳/۲	۳۰/۴	۳۳/۸	۳۷/۶
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۴۲/۶	۴۶/۲	۴۶/۹	۴۲/۸	۴۴/۸	۴۵/۴	۴۷/۷
	زنان	۵۳/۶	۵۸/۲	۵۹/۱	۶۰/۴	۵۹/۷	۵۹/۴	۶۱/۲
	مردان	۳۱/۵	۳۴/۳	۳۴/۷	۲۵/۳	۳۰/۰	۳۱/۴	۳۴/۱
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۴۶/۹	۵۰/۱	۵۰/۳	۴۶/۳	۴۸/۵	۵۰/۱	۵۲/۲
	زنان	۵۸/۵	۶۲/۴	۶۳/۱	۶۳/۵	۶۲/۶	۶۳/۳	۶۵/۵
	مردان	۳۵/۳	۳۷/۷	۳۷/۶	۲۹/۰	۳۴/۴	۳۶/۹	۳۹/۰
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۵۴/۶	۵۸/۲	۵۹/۲	۵۷/۹	۶۳/۹	۶۷/۱	۶۹/۷
	زنان	۶۵/۴	۷۰/۰	۷۰/۸	۷۲/۰	۷۳/۳	۷۵/۲	۷۷/۶
	مردان	۴۳/۷	۴۶/۴	۴۷/۵	۴۳/۸	۵۴/۶	۵۸/۹	۶۱/۹

رشد زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۵۵/۱	۶۰/۵	۶۱/۳	۶۲/۳	۶۴/۶
مردان	۳۳/۲	۳۷/۱	۳۶/۶	۴۲/۶	۴۵/۸

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹




^۱ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۲ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.




شیوع (%) عامل خطر استعمال دخانیات به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۳	هر دو	۱۲/۱	۱۲/۱	۱۰/۹	۱۰/۶	۹/۱	۷/۶	۶/۸
	زنان	۲/۵	۱/۹	۱/۴	۱/۰	۰/۷	۰/۵	۰/۳
	مردان	۲۱/۶	۲۲/۳	۲۰/۴	۲۰/۲	۱۷/۵	۱۴/۷	۱۳/۳
کمتر از ۶۰ سال ^۴	هر دو	۱۰/۸	۱۰/۸	۱۰/۰	۹/۶	۸/۶	۷/۱	۶/۵
	زنان	۱/۲	۰/۵	۰/۲	۰/۱	۰/۱	۰/۱	۰/۱
	مردان	۲۰/۴	۲۱/۲	۱۹/۹	۱۹/۲	۱۷/۱	۱۴/۲	۱۲/۹
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۴/۶	۱۴/۷	۱۲/۵	۱۲/۵	۱۰/۲	۸/۶	۷/۳
	زنان	۵/۲	۴/۷	۳/۷	۲/۹	۲/۰	۱/۳	۰/۵
	مردان	۲۳/۹	۲۴/۶	۲۱/۳	۲۲/۱	۱۸/۴	۱۵/۹	۱۴/۱
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۱۱/۸	۱۲/۵	۱۰/۸	۱۰/۳	۹/۳	۸/۴	۷/۹
	زنان	۲/۴	۲/۰	۰/۹	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
	مردان	۲۱/۳	۲۲/۹	۲۰/۷	۲۰/۷	۱۸/۷	۱۶/۸	۱۵/۷
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۱۳/۷	۱۳/۸	۱۱/۵	۱۲/۳	۹/۳	۸/۱	۷/۱
	زنان	۴/۳	۳/۷	۲/۵	۱/۶	۰/۰	۰/۰	۰/۰
	مردان	۲۳/۰	۲۳/۹	۲۰/۵	۲۲/۹	۱۸/۵	۱۶/۱	۱۴/۳
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۱۶/۴	۱۶/۳	۱۳/۹	۱۴/۲	۱۱/۵	۹/۴	۷/۶
	زنان	۷/۲	۶/۵	۵/۴	۴/۵	۳/۰	۱/۵	۰/۰
	مردان	۲۵/۶	۲۶/۱	۲۲/۵	۲۳/۹	۲۰/۰	۱۷/۴	۱۵/۱
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۱۶/۴	۱۶/۱	۱۳/۷	۱۳/۳	۱۰/۵	۸/۵	۶/۷
	زنان	۷/۰	۶/۸	۶/۰	۵/۷	۴/۹	۳/۷	۲/۲
	مردان	۲۵/۷	۲۵/۵	۲۱/۴	۲۰/۸	۱۶/۲	۱۳/۳	۱۱/۳

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۴/۷	۳/۲	۱/۶	۰/۵	۰/۱
مردان	۲۳/۴	۲۱/۱	۱۸/۳	۱۴/۲	۱۲/۶

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹



^۳ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۴ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.



سیمای سلامت سالمندان

استان خوزستان

شیوع عوامل خطر رفتاری



سیمای سلامت سالمندان

استان خوزستان

(شیوع عوامل خطر رفتاری)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با شیوع عوامل خطر رفتاری در کل جمعیت (افراد ۱۸ سال و بالاتر)، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (افراد ۱۸ تا ۶۰ سال) ساکن در استان خوزستان و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس، نوع و گروه‌های سنی بیان شده است. به‌منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی جهت مقایسه با استان‌های مجاور استان خوزستان شامل: استان‌های بوشهر، چهارمحال و بختیاری، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان نیز تدوین و ترسیم شده است.


آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر بیشتر بودن شیوع عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان خوزستان نسبت به افراد غیر سالمند است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند افزایش یافته است. شیوع فعالیت فیزیکی ناکافی در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی بیشتر بوده است و با افزایش سن (به جز گروه سنی ۷۰ تا ۷۴ سال) اختلاف شیوع در بین زنان و مردان افزایش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان خوزستان دارای بیشترین شیوع استاندارد شده‌ی سنی فعالیت فیزیکی ناکافی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.

شیوع عامل خطر استعمال دخانیات در سال ۲۰۱۹ در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان خوزستان نسبت به زنان غیر سالمند بیشتر و در مردان سالمند نسبت به غیر سالمند کمتر است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند کاهش یافته است. درصد استعمال دخانیات در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی کمتر بوده است و با افزایش سن اختلاف درصد در بین زنان و مردان کاهش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان خوزستان دارای بیشترین و یا کمترین درصد استاندارد شده‌ی سنی استعمال دخانیات نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ نبوده‌اند.




شیوع (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۱	هر دو	۵۱/۶	۵۷/۴	۷۰/۲	۷۳/۴	۷۲/۵	۶۹/۴	۷۲/۷
	زنان	۵۷/۹	۶۴/۴	۷۶/۸	۸۰/۸	۷۹/۸	۷۷/۲	۷۷/۶
	مردان	۴۵/۳	۵۰/۳	۶۳/۵	۶۵/۹	۶۵/۲	۶۱/۶	۶۲/۵
کمتر از ۶۰ سال ^۲	هر دو	۴۶/۷	۵۳/۲	۶۷/۰	۷۱/۴	۷۰/۸	۶۶/۶	۶۶/۸
	زنان	۵۳/۲	۶۰/۴	۷۴/۱	۷۷/۹	۷۷/۷	۷۴/۳	۷۴/۳
	مردان	۴۰/۱	۴۵/۹	۶۰/۰	۶۵/۰	۶۳/۹	۵۸/۹	۵۹/۲
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۶۱/۵	۶۵/۷	۷۶/۵	۷۷/۳	۷۶/۰	۷۵/۱	۷۶/۵
	زنان	۶۷/۳	۷۲/۵	۸۲/۳	۸۶/۷	۸۴/۱	۸۳/۱	۸۴/۱
	مردان	۵۵/۸	۵۹/۰	۷۰/۷	۶۷/۸	۶۷/۹	۶۷/۱	۶۹/۰
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۵۶/۶	۶۱/۴	۷۳/۷	۷۵/۶	۷۴/۷	۷۰/۸	۷۱/۳
	زنان	۶۲/۲	۶۷/۸	۷۸/۶	۸۴/۴	۸۱/۷	۷۸/۱	۷۸/۲
	مردان	۵۱/۱	۵۵/۱	۶۸/۸	۶۶/۹	۶۷/۷	۶۳/۵	۶۴/۴
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۵۸/۹	۶۳/۱	۷۴/۲	۷۵/۱	۷۲/۸	۷۱/۱	۷۲/۶
	زنان	۶۴/۷	۶۹/۹	۸۰/۲	۸۵/۲	۸۱/۸	۸۰/۴	۸۱/۵
	مردان	۵۳/۱	۵۶/۳	۶۸/۱	۶۴/۹	۶۳/۷	۶۱/۸	۶۳/۷
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۶۳/۰	۶۷/۰	۷۷/۴	۷۷/۹	۷۶/۸	۷۷/۶	۷۹/۶
	زنان	۶۹/۱	۷۴/۱	۸۳/۱	۸۶/۸	۸۳/۶	۸۳/۶	۸۴/۹
	مردان	۵۶/۹	۶۰/۰	۷۱/۶	۶۹/۰	۷۰/۰	۷۱/۵	۷۴/۳
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۶۷/۶	۷۱/۴	۸۰/۶	۸۰/۵	۷۹/۸	۸۱/۰	۸۲/۷
	زنان	۷۳/۱	۷۸/۱	۸۷/۰	۹۰/۴	۸۹/۲	۹۰/۵	۹۱/۸
	مردان	۶۲/۰	۶۴/۶	۷۴/۳	۷۰/۶	۷۰/۳	۷۱/۵	۷۳/۷

رشد زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۶۶/۴	۸۱/۷	۸۳/۷	۸۳/۲	۸۴/۹
مردان	۵۵/۰	۷۰/۳	۶۷/۷	۶۷/۹	۷۰/۵

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹




^۱ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۲ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.




شیوع (%) عامل خطر استعمال دخانیات به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۳	هر دو	۱۳/۳	۱۲/۰	۱۱/۰	۱۱/۱	۱۰/۳	۹/۶	۹/۲
	زنان	۳/۸	۳/۱	۱/۹	۱/۳	۰/۹	۰/۶	۰/۴
	مردان	۲۲/۸	۲۰/۸	۲۰/۱	۲۰/۹	۱۹/۶	۱۸/۷	۱۷/۳
کمتر از ۶۰ سال ^۴	هر دو	۱۲/۸	۱۱/۸	۱۱/۵	۱۱/۶	۱۰/۸	۹/۸	۹/۶
	زنان	۲/۵	۲/۰	۱/۱	۰/۸	۰/۴	۰/۱	۰/۱
	مردان	۲۳/۰	۲۱/۵	۲۱/۸	۲۲/۳	۲۱/۳	۲۰/۲	۱۹/۵
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۴/۳	۱۲/۴	۱۰/۰	۱۰/۲	۹/۱	۸/۵	۷/۹
	زنان	۶/۴	۵/۴	۳/۴	۲/۳	۱/۹	۱/۵	۱/۱
	مردان	۲۲/۲	۱۹/۴	۱۶/۶	۱۸/۲	۱۶/۳	۱۵/۶	۱۴/۷
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۱۳/۵	۱۱/۹	۹/۸	۹/۷	۹/۸	۱۰/۷	۱۱/۰
	زنان	۵/۰	۳/۹	۱/۹	۰/۹	۰/۲	۰/۰	۰/۰
	مردان	۲۲/۱	۱۹/۹	۱۷/۸	۱۸/۵	۱۹/۴	۲۱/۴	۲۲/۰
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۱۳/۵	۱۱/۵	۹/۰	۹/۵	۸/۵	۸/۰	۷/۵
	زنان	۵/۴	۴/۲	۲/۱	۰/۷	۰/۳	۰/۰	۰/۰
	مردان	۲۱/۷	۱۸/۸	۱۵/۸	۱۸/۲	۱۶/۷	۱۶/۱	۱۵/۰
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۱۵/۹	۱۳/۹	۱۱/۵	۱۱/۸	۱۰/۳	۹/۰	۷/۹
	زنان	۸/۶	۷/۳	۵/۲	۳/۹	۳/۵	۲/۷	۱/۶
	مردان	۲۳/۳	۲۰/۵	۱۷/۷	۱۹/۸	۱۷/۲	۱۵/۴	۱۴/۲
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۱۴/۳	۱۲/۲	۹/۸	۹/۹	۷/۸	۶/۴	۵/۲
	زنان	۶/۸	۶/۰	۴/۴	۳/۵	۳/۸	۳/۴	۲/۷
	مردان	۲۱/۸	۱۸/۵	۱۵/۳	۱۶/۲	۱۱/۹	۹/۴	۷/۶

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۶/۱	۳/۱	۱/۶	۰/۹	۰/۴
مردان	۲۲/۱	۱۶/۷	۱۶/۶	۱۵/۷	۱۴/۹

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹



^۳ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۴ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.



سیمای سلامت سالمندان

استان زنجان

شیوع عوامل خطر رفتاری



سیمای سلامت سالمندان

استان زنجان

(شیوع عوامل خطر رفتاری)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با شیوع عوامل خطر رفتاری در کل جمعیت (افراد ۱۸ سال و بالاتر)، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (افراد ۱۸ تا ۶۰ سال) ساکن در استان زنجان و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس، نوع و گروه‌های سنی بیان شده است. به‌منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی جهت مقایسه با استان‌های مجاور استان زنجان شامل: استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، همدان، کردستان و قزوین نیز تدوین و ترسیم شده است.


آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر بیشتر بودن شیوع عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان زنجان نسبت به افراد غیر سالمند است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند افزایش یافته است. شیوع فعالیت فیزیکی ناکافی در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی بیشتر بوده است و با افزایش سن (به جز گروه سنی ۷۵ سال و بالاتر) اختلاف شیوع در بین زنان و مردان افزایش پیدا می‌کند. مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان زنجان دارای کمترین شیوع استاندارد شده‌ی سنی فعالیت فیزیکی ناکافی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.

شیوع عامل خطر استعمال دخانیات در سال ۲۰۱۹ در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان زنجان نسبت به زنان غیر سالمند بیشتر و در مردان سالمند نسبت به غیر سالمند کمتر است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند کاهش یافته است. درصد استعمال دخانیات در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی کمتر بوده است و با افزایش سن اختلاف درصد در بین زنان و مردان کاهش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان زنجان دارای بیشترین و یا کمترین درصد استاندارد شده‌ی سنی استعمال دخانیات نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ نبوده‌اند.




شیوع (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۱	هر دو	۲۸/۲	۳۱/۲	۳۵/۵	۳۶/۷	۴۱/۲	۴۴/۱	۴۷/۶
	زنان	۳۳/۸	۳۷/۴	۴۱/۹	۴۴/۳	۴۹/۱	۵۱/۸	۵۵/۲
	مردان	۲۲/۵	۲۵/۰	۲۹/۱	۲۹/۱	۳۳/۲	۳۶/۳	۴۰/۱
کمتر از ۶۰ سال ^۲	هر دو	۲۳/۸	۲۷/۵	۳۱/۷	۳۳/۳	۳۷/۵	۴۰/۳	۴۴/۳
	زنان	۲۸/۵	۳۳/۰	۳۷/۳	۳۹/۵	۴۳/۷	۴۵/۹	۴۹/۵
	مردان	۱۹/۲	۲۲/۰	۲۶/۱	۲۷/۱	۳۱/۳	۳۴/۸	۳۹/۰
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۳۶/۸	۳۸/۶	۴۳/۱	۴۳/۵	۴۸/۴	۵۱/۶	۵۴/۳
	زنان	۴۴/۵	۴۶/۲	۵۱/۱	۵۳/۸	۵۹/۹	۶۳/۸	۶۶/۵
	مردان	۲۹/۲	۳۱/۰	۳۵/۲	۳۳/۲	۳۷/۰	۳۹/۵	۴۲/۱
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۲۹/۹	۳۱/۵	۳۵/۹	۳۵/۲	۳۸/۷	۴۱/۲	۴۴/۰
	زنان	۳۵/۶	۳۷/۱	۴۱/۶	۴۲/۷	۴۵/۹	۴۸/۳	۵۰/۹
	مردان	۲۴/۲	۲۵/۹	۳۰/۲	۲۷/۸	۳۱/۶	۳۴/۲	۳۷/۱
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۳۴/۴	۳۶/۰	۴۰/۲	۳۹/۵	۴۳/۲	۴۶/۱	۴۸/۸
	زنان	۴۱/۸	۴۳/۲	۴۷/۴	۴۸/۸	۵۲/۹	۵۶/۳	۵۸/۹
	مردان	۲۶/۹	۲۸/۸	۳۳/۰	۳۰/۲	۳۳/۵	۳۵/۹	۳۸/۷
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۳۸/۹	۴۰/۶	۴۴/۹	۴۵/۱	۴۹/۸	۵۳/۲	۵۵/۹
	زنان	۴۷/۸	۴۹/۷	۵۴/۸	۵۸/۴	۶۶/۶	۷۲/۰	۷۵/۱
	مردان	۲۹/۹	۳۱/۵	۳۴/۹	۳۱/۸	۳۳/۱	۳۴/۴	۳۶/۷
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۴۴/۳	۴۶/۴	۵۱/۶	۵۴/۳	۶۲/۰	۶۵/۹	۶۸/۵
	زنان	۵۲/۹	۵۴/۸	۶۰/۶	۶۵/۵	۷۴/۳	۷۸/۵	۸۱/۰
	مردان	۳۵/۷	۳۷/۹	۴۲/۶	۴۳/۱	۴۹/۷	۵۳/۳	۵۶/۱

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۴۳/۱	۴۹/۶	۵۷/۵	۶۳/۸	۶۶/۵
مردان	۲۸/۴	۳۴/۵	۳۶/۶	۴۱/۹	۴۴/۸

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹




^۱ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۲ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.




شیوع (%) عامل خطر استعمال دخانیات به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۳	هر دو	۱۵/۶	۱۵/۹	۱۴/۶	۱۳/۲	۱۲/۵	۱۱/۵	۱۰/۶
	زنان	۳/۷	۳/۱	۲/۴	۲/۵	۱/۹	۱/۵	۰/۷
	مردان	۲۷/۴	۲۸/۷	۲۶/۷	۲۴/۰	۲۳/۱	۲۱/۴	۲۰/۱
کمتر از ۶۰ سال ^۴	هر دو	۱۴/۶	۱۵/۲	۱۴/۴	۱۳/۵	۱۲/۷	۱۱/۶	۱۱/۰
	زنان	۱/۹	۱/۶	۱/۲	۱/۱	۰/۸	۰/۷	۰/۶
	مردان	۲۷/۳	۲۸/۹	۲۷/۶	۲۵/۸	۲۴/۷	۲۲/۵	۲۱/۳
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۷/۶	۱۷/۳	۱۵/۰	۱۲/۸	۱۲/۱	۱۱/۲	۹/۷
	زنان	۷/۵	۶/۱	۴/۹	۵/۲	۴/۲	۳/۲	۱/۸
	مردان	۲۷/۶	۲۸/۴	۲۵/۰	۲۰/۴	۲۰/۱	۱۹/۲	۱۷/۷
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۱۵/۵	۱۵/۵	۱۳/۴	۱۱/۴	۱۱/۴	۱۱/۷	۱۱/۵
	زنان	۴/۶	۳/۲	۱/۹	۱/۸	۰/۶	۰/۱	۰/۰
	مردان	۲۶/۵	۲۷/۸	۲۴/۹	۲۱/۰	۲۲/۳	۲۳/۴	۲۲/۹
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۱۷/۱	۱۶/۸	۱۴/۵	۱۲/۳	۱۱/۹	۱۱/۲	۹/۸
	زنان	۶/۹	۵/۳	۴/۰	۳/۹	۲/۶	۱/۵	۰/۰
	مردان	۲۷/۴	۲۸/۴	۲۵/۱	۲۰/۶	۲۱/۳	۲۰/۹	۱۹/۶
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۱۹/۶	۱۹/۲	۱۶/۹	۱۴/۹	۱۴/۶	۱۳/۴	۱۱/۵
	زنان	۱۰/۱	۸/۷	۷/۵	۷/۸	۷/۱	۶/۱	۴/۳
	مردان	۲۹/۱	۲۹/۸	۲۶/۳	۲۲/۱	۲۲/۰	۲۰/۷	۱۸/۷
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۱۷/۹	۱۷/۴	۱۴/۹	۱۲/۶	۱۰/۵	۸/۴	۶/۳
	زنان	۸/۴	۷/۳	۶/۳	۷/۳	۶/۵	۴/۹	۲/۹
	مردان	۲۷/۵	۲۷/۶	۲۳/۵	۱۷/۸	۱۴/۶	۱۱/۹	۹/۶

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۶/۹	۴/۴	۳/۵	۱/۴	۰/۶
مردان	۲۷/۴	۲۴/۹	۲۰/۲	۱۸/۳	۱۶/۶

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹



^۳ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۴ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.



سیمای سلامت سالمندان

استان سمنان

شیوع عوامل خطر رفتاری

سیمای سلامت سالمندان

استان سمنان

(شیوع عوامل خطر رفتاری)



در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با شیوع عوامل خطر رفتاری در کل جمعیت (افراد ۱۸ سال و بالاتر)، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (افراد ۱۸ تا ۶۰ سال) ساکن در استان سمنان و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس، نوع و گروه‌های سنی بیان شده است. به‌منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی جهت مقایسه با استان‌های مجاور استان سمنان شامل: استان‌های گلستان، اصفهان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، مازندران، قم و تهران نیز تدوین و ترسیم شده است.


آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر بیشتر بودن شیوع عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان سمنان نسبت به افراد غیر سالمند است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند افزایش یافته است. شیوع فعالیت فیزیکی ناکافی در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی بیشتر بوده است و با افزایش سن اختلاف شیوع در بین زنان و مردان افزایش پیدا می‌کند. مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان سمنان دارای بیشترین شیوع استاندارد شده‌ی سنی فعالیت فیزیکی ناکافی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.

شیوع عامل خطر استعمال دخانیات در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان سمنان نسبت به افراد غیر سالمند کمتر است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند کاهش یافته است. درصد استعمال دخانیات در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی کمتر بوده است و با افزایش سن اختلاف درصد در بین زنان و مردان کاهش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان سمنان دارای بیشترین و یا کمترین درصد استاندارد شده‌ی سنی استعمال دخانیات نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ نبوده‌اند.




شیوع (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۱	هر دو	۳۷/۹	۴۳/۰	۴۶/۳	۵۱/۷	۵۶/۵	۶۰/۹	۶۹/۴
	زنان	۴۴/۷	۵۰/۱	۵۳/۱	۶۰/۰	۶۴/۱	۶۷/۸	۷۵/۳
	مردان	۳۱/۲	۳۵/۹	۳۹/۴	۴۳/۴	۴۸/۹	۵۳/۹	۶۳/۵
کمتر از ۶۰ سال ^۲	هر دو	۳۳/۶	۳۹/۳	۴۲/۸	۴۸/۹	۵۳/۹	۵۸/۶	۶۳/۳
	زنان	۳۸/۹	۴۵/۱	۴۸/۸	۵۶/۴	۶۱/۱	۶۵/۳	۶۹/۶
	مردان	۲۸/۴	۳۳/۵	۳۶/۹	۴۱/۴	۴۶/۷	۵۲/۰	۵۷/۱
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۴۶/۵	۵۰/۴	۵۳/۱	۵۷/۳	۶۱/۸	۶۵/۴	۶۸/۹
	زنان	۵۶/۱	۶۰/۰	۶۱/۸	۶۷/۲	۷۰/۳	۷۲/۹	۷۵/۷
	مردان	۳۶/۸	۴۰/۷	۴۴/۴	۴۷/۴	۵۳/۳	۵۷/۸	۶۲/۲
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۴۰/۸	۴۵/۲	۴۸/۲	۵۲/۵	۵۵/۹	۵۷/۷	۶۱/۲
	زنان	۴۸/۵	۵۲/۹	۵۵/۱	۶۰/۸	۶۲/۶	۶۳/۰	۶۵/۴
	مردان	۳۳/۱	۳۷/۵	۴۱/۳	۴۴/۲	۴۹/۱	۵۲/۴	۵۷/۰
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۴۳/۶	۴۷/۵	۵۰/۱	۵۴/۱	۵۸/۳	۶۲/۳	۶۶/۲
	زنان	۵۳/۰	۵۶/۸	۵۸/۵	۶۴/۱	۶۷/۱	۷۰/۵	۷۳/۷
	مردان	۳۴/۲	۳۸/۲	۴۱/۶	۴۴/۱	۴۹/۴	۵۴/۱	۵۸/۷
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۴۷/۵	۵۱/۷	۵۴/۸	۵۹/۴	۶۴/۹	۶۹/۸	۷۳/۸
	زنان	۵۷/۸	۶۱/۹	۶۴/۲	۷۰/۰	۷۴/۲	۷۸/۲	۸۱/۴
	مردان	۳۷/۳	۴۱/۴	۴۵/۳	۴۸/۷	۵۵/۶	۶۱/۴	۶۶/۲
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۵۳/۹	۵۷/۱	۵۹/۳	۶۳/۱	۶۸/۲	۷۱/۶	۷۴/۶
	زنان	۶۵/۲	۶۸/۲	۶۹/۴	۷۳/۹	۷۷/۲	۸۰/۰	۸۲/۴
	مردان	۴۲/۶	۴۵/۹	۴۹/۲	۵۲/۴	۵۹/۱	۶۳/۳	۶۶/۸

رشد زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۵۵/۰	۶۰/۷	۶۹/۰	۷۴/۰	۷۶/۹
مردان	۳۶/۳	۴۳/۹	۵۲/۵	۶۱/۱	۶۵/۴

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹




^۱ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۲ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.




شیوع (%) عامل خطر استعمال دخانیات به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۳	هر دو	۱۲/۶	۱۲/۱	۱۲/۱	۱۲/۵	۱۱/۳	۱۰/۴	۹/۸
	زنان	۲/۲	۱/۳	۰/۹	۱/۱	۱/۱	۱/۲	۱/۴
	مردان	۲۳/۰	۲۲/۹	۲۳/۲	۲۳/۹	۲۱/۵	۱۹/۵	۱۷/۷
کمتر از ۶۰ سال ^۴	هر دو	۱۲/۹	۱۲/۸	۱۲/۷	۱۳/۲	۱۲/۴	۱۱/۷	۱۱/۰
	زنان	۱/۹	۱/۴	۱/۲	۱/۵	۱/۶	۱/۸	۲/۰
	مردان	۲۳/۸	۲۴/۲	۲۴/۱	۲۴/۹	۲۳/۲	۲۱/۶	۲۰/۶
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۲/۰	۱۰/۶	۱۰/۸	۱۱/۱	۹/۲	۷/۷	۶/۹
	زنان	۲/۸	۱/۲	۰/۴	۰/۴	۰/۲	۰/۱	۰/۰
	مردان	۲۱/۳	۲۰/۱	۲۱/۳	۲۱/۹	۱۸/۲	۱۵/۲	۱۳/۹
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۱۱/۳	۱۰/۶	۱۱/۶	۱۱/۸	۱۱/۴	۱۰/۸	۱۰/۶
	زنان	۰/۸	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
	مردان	۲۱/۹	۲۱/۱	۲۳/۲	۲۳/۶	۲۲/۷	۲۱/۶	۲۱/۱
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۱۱/۴	۱۰/۰	۱۰/۷	۱۱/۴	۹/۷	۷/۹	۷/۰
	زنان	۱/۷	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
	مردان	۲۱/۰	۲۰/۱	۲۱/۴	۲۲/۹	۱۹/۴	۱۵/۸	۱۴/۰
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۱۳/۳	۱۱/۹	۱۲/۰	۱۲/۶	۱۰/۱	۸/۲	۷/۴
	زنان	۴/۴	۲/۷	۱/۵	۱/۴	۰/۷	۰/۳	۰/۰
	مردان	۲۲/۲	۲۱/۱	۲۲/۵	۲۳/۷	۱۹/۵	۱۶/۱	۱۴/۸
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۱۲/۱	۱۰/۰	۹/۱	۸/۸	۵/۵	۳/۷	۲/۸
	زنان	۴/۲	۱/۹	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
	مردان	۲۰/۰	۱۸/۱	۱۸/۲	۱۷/۵	۱۱/۱	۷/۴	۵/۵

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۲/۴	۰/۲	۰/۱	۰/۰	۰/۰
مردان	۲۱/۳	۲۱/۵	۱۸/۷	۱۴/۷	۱۴/۱

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹



^۳ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۴ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.



سیمای سلامت سالمندان

استان سیستان و بلوچستان

شیوع عوامل خطر رفتاری



سیمای سلامت سالمندان

استان سیستان و بلوچستان

(شیوع عوامل خطر رفتاری)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با شیوع عوامل خطر رفتاری در کل جمعیت (افراد ۱۸ سال و بالاتر)، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (افراد ۱۸ تا ۶۰ سال) ساکن در استان سیستان و بلوچستان و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس، نوع و گروه‌های سنی بیان شده است. به‌منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی جهت مقایسه با استان‌های مجاور استان سیستان و بلوچستان شامل: استان‌های هرمزگان، کرمان و خراسان جنوبی نیز تدوین و ترسیم شده است.


آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر بیشتر بودن شیوع عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان سیستان و بلوچستان نسبت به افراد غیر سالمند است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند افزایش یافته است. شیوع فعالیت فیزیکی ناکافی در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی بیشتر بوده است و با افزایش سن (به جز گروه‌های سنی ۷۰ تا ۷۴ سال و ۷۵ سال و بالاتر) اختلاف شیوع در بین زنان و مردان افزایش پیدا می‌کند. مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان سیستان و بلوچستان دارای بیشترین شیوع استاندارد شده‌ی سنی فعالیت فیزیکی ناکافی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.

شیوع عامل خطر استعمال دخانیات در سال ۲۰۱۹ در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان سیستان و بلوچستان نسبت به زنان غیر سالمند بیشتر و در مردان سالمند نسبت به غیر سالمند کمتر است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند کاهش یافته است. درصد استعمال دخانیات در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی کمتر بوده است و با افزایش سن (به جز گروه سنی ۶۵ تا ۶۹ سال) اختلاف درصد در بین زنان و مردان کاهش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان سیستان و بلوچستان به ترتیب دارای بیشترین و کمترین درصد استاندارد شده‌ی سنی استعمال دخانیات نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.




شیوع (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۱	هر دو	۴۷/۸	۵۱/۴	۵۴/۵	۵۵/۹	۶۰/۲	۶۴/۱	۶۷/۷
	زنان	۵۵/۹	۵۹/۵	۶۲/۸	۶۵/۲	۶۸/۶	۷۱/۹	۷۵/۰
	مردان	۳۹/۸	۴۳/۴	۴۶/۳	۴۶/۵	۵۱/۷	۵۶/۴	۶۰/۴
کمتر از ۶۰ سال ^۲	هر دو	۴۱/۳	۴۵/۳	۴۸/۶	۵۰/۳	۵۵/۴	۶۰/۴	۶۴/۶
	زنان	۴۸/۶	۵۲/۴	۵۶/۴	۵۸/۸	۶۳/۳	۶۷/۵	۷۱/۲
	مردان	۳۴/۰	۳۸/۲	۴۰/۹	۴۱/۷	۴۷/۶	۵۳/۲	۵۷/۹
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۶۰/۹	۶۳/۷	۶۶/۳	۶۷/۰	۶۹/۶	۷۱/۷	۷۳/۹
	زنان	۷۰/۵	۷۳/۶	۷۵/۶	۷۷/۹	۷۹/۳	۸۰/۷	۸۲/۵
	مردان	۵۱/۳	۵۳/۸	۵۷/۰	۵۶/۲	۶۰/۰	۶۲/۷	۶۵/۳
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۵۴/۳	۵۷/۱	۵۹/۹	۶۰/۵	۶۳/۶	۶۵/۷	۶۸/۰
	زنان	۶۴/۳	۶۷/۱	۶۹/۱	۷۱/۵	۷۳/۵	۷۴/۹	۷۶/۸
	مردان	۴۴/۴	۴۷/۰	۵۰/۷	۴۹/۵	۵۳/۷	۵۶/۴	۵۹/۳
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۵۹/۱	۶۱/۹	۶۴/۴	۶۵/۱	۶۷/۸	۷۰/۰	۷۲/۱
	زنان	۶۹/۲	۷۲/۱	۷۳/۶	۷۶/۲	۷۸/۳	۸۰/۵	۸۲/۳
	مردان	۴۹/۰	۵۱/۸	۵۵/۲	۵۴/۰	۵۷/۲	۵۹/۵	۶۲/۰
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۶۳/۲	۶۶/۳	۶۸/۶	۶۹/۰	۷۰/۵	۷۲/۰	۷۴/۱
	زنان	۷۲/۵	۷۶/۲	۷۸/۰	۸۰/۲	۸۰/۶	۸۱/۴	۸۳/۱
	مردان	۵۳/۹	۵۶/۴	۵۹/۲	۵۷/۸	۶۰/۴	۶۲/۷	۶۵/۱
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۶۶/۹	۶۹/۵	۷۲/۲	۷۳/۵	۷۶/۷	۷۹/۱	۸۱/۳
	زنان	۷۵/۸	۷۹/۱	۸۱/۴	۸۳/۷	۸۴/۷	۸۵/۹	۸۷/۷
	مردان	۵۷/۹	۵۹/۸	۶۳/۱	۶۳/۴	۶۸/۷	۷۲/۲	۷۴/۹

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۶۹/۵	۷۴/۵	۷۸/۴	۸۱/۷	۸۳/۴
مردان	۵۰/۲	۵۶/۰	۵۹/۱	۶۴/۵	۶۷/۱

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹




^۱ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.

^۲ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.




شیوع (%) عامل خطر استعمال دخانیات به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۱۹	۲۰۱۷	۲۰۱۵	۲۰۱۳	۲۰۱۱	۲۰۰۹	۲۰۰۷
همه سنین ^۳	هر دو	۶/۷	۷/۴	۸/۵	۹/۶	۱۱/۲	۱۰/۹	۱۱/۵
	زنان	۱/۰	۱/۲	۱/۶	۱/۵	۱/۷	۱/۹	۳/۲
	مردان	۱۲/۳	۱۳/۶	۱۵/۳	۱۷/۸	۲۰/۷	۱۹/۸	۲۱/۵
کمتر از ۶۰ سال ^۴	هر دو	۶/۵	۷/۰	۷/۹	۸/۹	۱۰/۱	۱۰/۰	۱۰/۶
	زنان	۰/۰	۰/۱	۰/۳	۰/۱	۰/۳	۰/۶	۱/۶
	مردان	۱۲/۹	۱۴/۰	۱۵/۵	۱۷/۷	۱۹/۹	۱۹/۴	۲۱/۳
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۷/۱	۸/۲	۹/۶	۱۱/۱	۱۳/۴	۱۲/۶	۱۳/۳
	زنان	۳/۰	۳/۶	۴/۴	۴/۳	۴/۵	۴/۶	۶/۲
	مردان	۱۱/۲	۱۲/۹	۱۴/۹	۱۷/۹	۲۲/۳	۲۰/۶	۲۱/۸
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۵/۳	۶/۱	۷/۰	۸/۴	۱۰/۳	۱۰/۳	۱۱/۳
	زنان	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۵	۱/۵	۳/۷
	مردان	۱۰/۶	۱۲/۱	۱۴/۰	۱۶/۸	۲۰/۱	۱۹/۰	۱۸/۸
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۶/۱	۶/۹	۸/۸	۱۰/۷	۱۳/۴	۱۲/۳	۱۳/۱
	زنان	۰/۰	۰/۰	۱/۶	۲/۰	۲/۹	۳/۶	۵/۷
	مردان	۱۲/۲	۱۳/۹	۱۶/۰	۱۹/۴	۲۳/۸	۲۱/۰	۲۰/۵
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۱۰/۰	۱۱/۵	۱۳/۰	۱۴/۳	۱۶/۵	۱۵/۳	۱۵/۸
	زنان	۵/۳	۶/۶	۷/۵	۷/۴	۷/۵	۷/۴	۸/۷
	مردان	۱۴/۸	۱۶/۴	۱۸/۴	۲۱/۱	۲۵/۵	۲۳/۲	۲۲/۹
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۷/۰	۸/۴	۹/۸	۱۱/۰	۱۳/۳	۱۲/۷	۱۳/۲
	زنان	۶/۷	۷/۷	۸/۳	۸/۰	۶/۹	۶/۰	۶/۸
	مردان	۷/۳	۹/۲	۱۱/۲	۱۴/۱	۱۹/۷	۱۹/۳	۲۱/۳

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۹/۸	۴/۰	۳/۵	۲/۸	۲/۴
مردان	۲۱/۳	۲۰/۲	۱۷/۵	۱۲/۵	۱۰/۹

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹



^۳ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۴ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.



سیمای سلامت سالمندان

استان فارس

شیوع عوامل خطر رفتاری



سیمای سلامت سالمندان

استان فارس

(شیوع عوامل خطر رفتاری)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با شیوع عوامل خطر رفتاری در کل جمعیت (افراد ۱۸ سال و بالاتر)، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (افراد ۱۸ تا ۶۰ سال) ساکن در استان فارس و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس، نوع و گروه‌های سنی بیان شده است. به‌منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی جهت مقایسه با استان‌های مجاور استان فارس شامل: استان‌های بوشهر، هرمزگان، اصفهان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و یزد نیز تدوین و ترسیم شده است.


آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر بیشتر بودن شیوع عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان فارس نسبت به افراد غیر سالمند است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند افزایش یافته است. شیوع فعالیت فیزیکی ناکافی در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی بیشتر بوده است و با افزایش سن اختلاف شیوع در بین زنان و مردان افزایش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان فارس دارای بیشترین و یا کمترین شیوع استاندارد شده‌ی سنی فعالیت فیزیکی ناکافی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ نبوده‌اند.

شیوع عامل خطر استعمال دخانیات در سال ۲۰۱۹ در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان بوشهر نسبت به زنان غیر سالمند بیشتر و در مردان سالمند نسبت به غیر سالمند کمتر است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند کاهش یافته است. درصد استعمال دخانیات در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی کمتر بوده است و با افزایش سن (به جز گروه سنی ۶۵ تا ۶۹ سال) اختلاف درصد در بین زنان و مردان کاهش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان فارس دارای بیشترین و یا کمترین درصد استاندارد شده‌ی سنی استعمال دخانیات نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ نبوده‌اند.




شیوع (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۱	هر دو	۳۷/۹	۴۳/۰	۵۲/۲	۶۰/۳	۶۰/۹	۶۱/۳	۶۳/۹
	زنان	۴۲/۱	۴۷/۳	۵۹/۵	۶۶/۴	۶۷/۹	۶۸/۹	۷۱/۴
	مردان	۳۳/۸	۳۸/۶	۴۴/۹	۵۴/۲	۵۴/۰	۵۳/۸	۵۶/۵
کمتر از ۶۰ سال ^۲	هر دو	۳۳/۵	۳۸/۷	۴۸/۵	۵۷/۷	۵۸/۴	۵۸/۴	۶۱/۰
	زنان	۳۶/۷	۴۲/۴	۵۵/۵	۶۲/۹	۶۴/۱	۶۴/۴	۶۷/۰
	مردان	۳۰/۳	۳۵/۰	۴۱/۵	۵۲/۵	۵۲/۸	۵۲/۴	۵۵/۰
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۴۶/۸	۵۱/۵	۵۹/۷	۶۵/۵	۶۶/۰	۶۷/۲	۶۹/۸
	زنان	۵۲/۸	۵۷/۲	۶۷/۵	۷۳/۵	۷۵/۶	۷۷/۸	۸۰/۲
	مردان	۴۰/۸	۴۵/۸	۵۱/۸	۵۷/۶	۵۶/۴	۵۶/۵	۵۹/۳
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۴۰/۶	۴۵/۷	۵۴/۵	۶۱/۲	۶۰/۴	۵۸/۸	۶۰/۶
	زنان	۴۵/۳	۴۹/۸	۶۰/۵	۶۶/۲	۶۶/۱	۶۵/۹	۶۷/۷
	مردان	۳۵/۹	۴۱/۵	۴۸/۴	۵۶/۲	۵۴/۶	۵۱/۷	۵۳/۵
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۴۴/۵	۴۹/۳	۵۸/۰	۶۴/۲	۶۴/۳	۶۵/۵	۶۸/۷
	زنان	۵۰/۶	۵۴/۴	۶۴/۴	۶۹/۸	۷۱/۶	۷۴/۱	۷۶/۷
	مردان	۳۸/۴	۴۴/۲	۵۱/۶	۵۸/۵	۵۶/۹	۵۷/۰	۶۰/۸
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۴۹/۰	۵۳/۲	۶۰/۹	۶۶/۱	۶۶/۸	۶۹/۱	۷۱/۹
	زنان	۵۶/۴	۶۰/۶	۷۰/۶	۷۶/۶	۷۹/۳	۸۲/۵	۸۵/۰
	مردان	۴۱/۵	۴۵/۹	۵۱/۲	۵۵/۶	۵۴/۲	۵۵/۷	۵۸/۷
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۵۳/۳	۵۷/۷	۶۵/۴	۷۰/۶	۷۲/۶	۷۵/۲	۷۷/۸
	زنان	۵۹/۱	۶۳/۸	۷۴/۵	۸۱/۳	۸۵/۴	۸۸/۷	۹۱/۳
	مردان	۴۷/۵	۵۱/۶	۵۶/۲	۵۹/۹	۵۹/۸	۶۱/۷	۶۴/۳

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۵۱/۶	۶۶/۳	۷۴/۱	۷۸/۲	۸۰/۷
مردان	۴۰/۱	۵۱/۵	۵۶/۳	۵۸/۷	۶۲/۴

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹




^۱ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۲ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.




شیوع (%) عامل خطر استعمال دخانیات به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۳	هر دو	۱۴/۳	۱۳/۵	۱۳/۳	۱۲/۶	۱۲/۲	۱۱/۵	۱۰/۳
	زنان	۴/۶	۲/۹	۲/۳	۱/۹	۱/۸	۱/۷	۱/۳
	مردان	۲۳/۹	۲۴/۲	۲۴/۳	۲۳/۳	۲۲/۶	۲۱/۳	۲۰/۳
کمتر از ۶۰ سال ^۴	هر دو	۱۳/۹	۱۳/۷	۱۳/۶	۱۳/۷	۱۲/۸	۱۱/۷	۱۱/۰
	زنان	۳/۴	۲/۲	۱/۸	۱/۴	۱/۳	۱/۲	۱/۰
	مردان	۲۴/۴	۲۵/۱	۲۵/۴	۲۵/۹	۲۴/۲	۲۲/۲	۲۱/۰
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۴/۹	۱۳/۲	۱۲/۸	۱۰/۶	۱۱/۰	۱۱/۱	۱۰/۴
	زنان	۶/۹	۴/۲	۳/۵	۲/۹	۲/۷	۲/۷	۱/۸
	مردان	۲۲/۹	۲۲/۲	۲۲/۲	۱۸/۲	۱۹/۲	۱۹/۵	۱۹/۰
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۱۴/۰	۱۲/۶	۱۲/۸	۱۱/۵	۱۱/۷	۱۲/۶	۱۲/۵
	زنان	۴/۸	۲/۲	۱/۴	۰/۸	۰/۵	۱/۱	۰/۷
	مردان	۲۳/۱	۲۳/۰	۲۴/۲	۲۲/۲	۲۳/۰	۲۴/۲	۲۴/۴
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۱۴/۴	۱۲/۹	۱۲/۹	۱۰/۵	۱۱/۸	۱۳/۱	۱۳/۱
	زنان	۶/۳	۳/۳	۲/۳	۱/۴	۰/۹	۰/۹	۰/۰
	مردان	۲۲/۵	۲۲/۶	۲۳/۴	۱۹/۶	۲۲/۷	۲۵/۳	۲۶/۲
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۱۶/۷	۱۴/۸	۱۴/۱	۱۱/۳	۱۱/۴	۱۰/۸	۹/۶
	زنان	۹/۷	۷/۰	۶/۳	۵/۷	۵/۲	۴/۷	۳/۶
	مردان	۲۳/۷	۲۲/۶	۲۱/۹	۱۶/۸	۱۷/۶	۱۶/۹	۱۵/۷
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۱۴/۵	۱۲/۴	۱۱/۶	۸/۹	۸/۹	۷/۹	۶/۵
	زنان	۶/۷	۴/۳	۳/۹	۳/۷	۴/۳	۴/۰	۳/۱
	مردان	۲۲/۳	۲۰/۶	۱۹/۴	۱۴/۲	۱۳/۶	۱۱/۸	۹/۹

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۶/۴	۳/۰	۲/۲	۱/۵	۰/۸
مردان	۲۲/۹	۲۲/۵	۱۹/۹	۲۰/۱	۱۹/۲

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹



^۳ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۴ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.



سیمای سلامت سالمندان

استان قزوین

شیوع عوامل خطر رفتاری



سیمای سلامت سالمندان

استان قزوین

(شیوع عوامل خطر رفتاری)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با شیوع عوامل خطر رفتاری در کل جمعیت (افراد ۱۸ سال و بالاتر)، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (افراد ۱۸ تا ۶۰ سال) ساکن در استان قزوین و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس، نوع و گروه‌های سنی بیان شده است. به‌منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی جهت مقایسه با استان‌های مجاور استان قزوین شامل: استان‌های البرز، گیلان، همدان، مرکزی، مازندران و زنجان نیز تدوین و ترسیم شده است.


آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر کمتر بودن شیوع عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در سال ۲۰۱۹ در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان قزوین نسبت به زنان غیر سالمند است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند افزایش یافته است. شیوع فعالیت فیزیکی ناکافی در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی بیشتر بوده است و با افزایش سن اختلاف شیوع در بین زنان و مردان افزایش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان قزوین دارای بیشترین شیوع استاندارد شده‌ی سنی فعالیت فیزیکی ناکافی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ نبوده‌اند.

شیوع عامل خطر استعمال دخانیات در سال ۲۰۱۹ در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان قزوین نسبت به زنان غیر سالمند بیشتر و در مردان سالمند نسبت به غیر سالمند کمتر است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند کاهش یافته است. درصد استعمال دخانیات در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی کمتر بوده است و با افزایش سن (به جز گروه سنی ۷۰ تا ۷۴ سال) اختلاف درصد در بین زنان و مردان کاهش پیدا می‌کند. زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان قزوین دارای بیشترین درصد استاندارد شده‌ی سنی استعمال دخانیات نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.




شیوع (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۱	هر دو	۳۵/۱	۴۰/۰	۴۵/۷	۵۰/۵	۵۲/۰	۵۳/۸	۵۷/۲
	زنان	۴۰/۹	۴۵/۸	۵۲/۰	۵۶/۲	۶۰/۴	۶۵/۱	۶۹/۵
	مردان	۲۹/۴	۳۴/۱	۳۹/۳	۴۴/۷	۴۳/۷	۴۲/۵	۴۴/۹
کمتر از ۶۰ سال ^۲	هر دو	۳۱/۳	۳۶/۲	۴۲/۰	۴۷/۹	۵۱/۰	۵۳/۵	۵۷/۲
	زنان	۳۶/۲	۴۱/۳	۴۸/۰	۵۳/۷	۵۹/۱	۶۵/۱	۷۰/۲
	مردان	۲۶/۵	۳۱/۲	۳۶/۰	۴۲/۰	۴۲/۹	۴۱/۹	۴۴/۱
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۴۲/۸	۴۷/۴	۵۳/۰	۵۵/۸	۵۴/۲	۵۴/۵	۵۷/۳
	زنان	۵۰/۴	۵۴/۸	۶۰/۱	۶۱/۴	۶۳/۰	۶۵/۲	۶۸/۱
	مردان	۳۵/۱	۴۰/۰	۴۵/۹	۵۰/۱	۴۵/۳	۴۳/۹	۴۶/۴
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۳۶/۶	۴۱/۷	۴۸/۵	۵۳/۳	۵۵/۰	۵۵/۸	۵۸/۴
	زنان	۴۲/۷	۴۷/۹	۵۴/۵	۵۷/۱	۶۱/۱	۶۴/۱	۶۷/۴
	مردان	۳۰/۵	۳۵/۵	۴۲/۶	۴۹/۵	۴۸/۹	۴۷/۵	۴۹/۴
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۴۰/۴	۴۵/۱	۵۱/۲	۵۴/۷	۵۳/۲	۵۲/۷	۵۵/۱
	زنان	۴۷/۹	۵۲/۴	۵۷/۹	۵۹/۴	۶۰/۸	۶۲/۲	۶۵/۱
	مردان	۳۳/۰	۳۷/۹	۴۴/۵	۵۰/۰	۴۵/۶	۴۳/۱	۴۵/۱
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۴۴/۴	۴۸/۸	۵۳/۹	۵۵/۶	۵۱/۱	۵۰/۹	۵۳/۷
	زنان	۵۲/۵	۵۶/۶	۶۱/۳	۶۲/۱	۶۲/۳	۶۴/۱	۶۷/۰
	مردان	۳۶/۲	۴۱/۱	۴۶/۴	۴۹/۲	۳۹/۹	۳۷/۷	۴۰/۳
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۴۹/۶	۵۴/۰	۵۸/۴	۵۹/۵	۵۷/۳	۵۸/۸	۶۱/۹
	زنان	۵۸/۵	۶۲/۴	۶۶/۶	۶۷/۰	۶۷/۹	۷۰/۲	۷۲/۷
	مردان	۴۰/۸	۴۵/۶	۵۰/۲	۵۱/۹	۴۶/۷	۴۷/۵	۵۱/۱

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۴۹/۲	۵۹/۲	۶۲/۸	۶۸/۰	۷۰/۹
مردان	۳۴/۴	۴۵/۴	۴۶/۲	۴۷/۳	۵۱/۰

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹




^۱ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۲ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.




شیوع (%) عامل خطر استعمال دخانیات به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۱۹	۲۰۱۷	۲۰۱۵	۲۰۱۳	۲۰۱۱	۲۰۰۹	۲۰۰۷
همه سنین ^۳	هر دو	۱۲/۹	۱۳/۷	۱۴/۴	۱۴/۷	۱۵/۳	۱۴/۶	۱۵/۰
	زنان	۱/۷	۲/۳	۲/۷	۲/۶	۳/۱	۲/۳	۳/۰
	مردان	۲۴/۱	۲۵/۱	۲۶/۱	۲۶/۸	۲۷/۵	۲۶/۹	۲۷/۰
کمتر از ۶۰ سال ^۴	هر دو	۱۳/۳	۱۳/۸	۱۴/۵	۱۵/۴	۱۶/۸	۱۵/۵	۱۵/۵
	زنان	۱/۳	۱/۶	۱/۹	۲/۱	۲/۷	۲/۰	۲/۵
	مردان	۲۵/۳	۲۶/۰	۲۷/۱	۲۸/۷	۳۰/۸	۲۹/۰	۲۸/۴
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۲/۲	۱۳/۴	۱۴/۱	۱۳/۴	۱۲/۳	۱۲/۸	۱۴/۰
	زنان	۲/۵	۳/۶	۴/۳	۳/۸	۳/۸	۳/۰	۴/۰
	مردان	۲۱/۸	۲۳/۲	۲۳/۹	۲۳/۰	۲۰/۸	۲۲/۷	۲۴/۱
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۱۱/۸	۱۲/۸	۱۳/۲	۱۱/۷	۱۱/۰	۱۲/۱	۱۲/۹
	زنان	۰/۰	۰/۷	۱/۳	۱/۰	۱/۸	۱/۰	۲/۵
	مردان	۲۳/۷	۲۴/۹	۲۵/۰	۲۲/۵	۲۰/۲	۲۳/۱	۲۳/۹
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۱۰/۵	۱۱/۹	۱۲/۷	۱۲/۰	۱۱/۱	۱۱/۹	۱۳/۳
	زنان	۲/۴	۳/۶	۴/۳	۳/۶	۳/۲	۲/۲	۳/۴
	مردان	۱۸/۶	۲۰/۱	۲۱/۱	۲۰/۵	۱۹/۰	۲۱/۶	۲۳/۳
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۱۵/۹	۱۷/۰	۱۷/۸	۱۶/۸	۱۴/۶	۱۴/۴	۱۵/۶
	زنان	۵/۵	۶/۵	۷/۱	۶/۳	۵/۸	۴/۸	۵/۷
	مردان	۲۶/۳	۲۷/۶	۲۸/۵	۲۷/۳	۲۳/۳	۲۴/۰	۲۵/۶
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۱۰/۴	۱۱/۷	۱۲/۸	۱۳/۱	۱۲/۶	۱۲/۹	۱۴/۲
	زنان	۲/۰	۳/۴	۴/۴	۴/۴	۴/۵	۳/۸	۵/۰
	مردان	۱۸/۸	۲۰/۱	۲۱/۱	۲۱/۷	۲۰/۷	۲۱/۹	۲۳/۴

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۴/۴	۲/۶	۳/۳	۳/۰	۲/۰
مردان	۲۵/۵	۲۲/۶	۲۲/۵	۲۳/۰	۲۱/۷

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹



^۳ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۴ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.



سیمای سلامت سالمندان

استان قم

شیوع عوامل خطر رفتاری



سیمای سلامت سالمندان

استان قم

(شیوع عوامل خطر رفتاری)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با شیوع عوامل خطر رفتاری در کل جمعیت (افراد ۱۸ سال و بالاتر)، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (افراد ۱۸ تا ۶۰ سال) ساکن در استان قم و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس، نوع و گروه‌های سنی بیان شده است. به منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی جهت مقایسه با استان‌های مجاور استان قم شامل: استان‌های اصفهان، مرکزی، سمنان و تهران نیز تدوین و ترسیم شده است.


آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر بیشتر بودن شیوع عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در سال ۲۰۱۹ در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان قم نسبت به زنان غیر سالمند و کمتر بودن شیوع در مردان سالمند نسبت به غیر سالمند است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند افزایش یافته است. شیوع فعالیت فیزیکی ناکافی در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی بیشتر بوده است و با افزایش سن اختلاف شیوع در بین زنان و مردان افزایش پیدا می‌کند. زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان قم دارای بیشترین شیوع استاندارد شده‌ی سنی فعالیت فیزیکی ناکافی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.

شیوع عامل خطر استعمال دخانیات در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان قم نسبت به افراد غیر سالمند کمتر است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند کاهش یافته است. درصد استعمال دخانیات در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی کمتر بوده است و با افزایش سن اختلاف درصد در بین زنان و مردان کاهش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان قم دارای بیشترین و یا کمترین درصد استاندارد شده‌ی سنی استعمال دخانیات نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ نبوده‌اند.




شیوع (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۱	هر دو	۴۳/۲	۴۸/۹	۵۴/۵	۵۹/۲	۶۳/۴	۶۷/۲	۷۴/۷
	زنان	۵۱/۹	۵۷/۹	۶۴/۵	۷۱/۵	۷۴/۶	۷۷/۵	۸۳/۷
	مردان	۳۴/۵	۴۰/۰	۴۴/۵	۴۶/۸	۵۲/۲	۵۶/۹	۶۵/۷
کمتر از ۶۰ سال ^۲	هر دو	۳۶/۴	۴۲/۷	۴۸/۹	۵۴/۸	۶۰/۰	۶۵/۰	۶۹/۸
	زنان	۴۴/۰	۵۰/۸	۵۸/۵	۶۶/۵	۷۰/۷	۷۴/۵	۷۸/۳
	مردان	۲۸/۷	۳۴/۶	۳۹/۲	۴۳/۲	۴۹/۴	۵۵/۵	۶۱/۳
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۵۶/۹	۶۱/۴	۶۵/۷	۶۷/۹	۷۰/۱	۷۱/۴	۷۳/۴
	زنان	۶۷/۶	۷۱/۹	۷۶/۴	۸۱/۷	۸۲/۵	۸۳/۳	۸۴/۸
	مردان	۴۶/۲	۵۰/۸	۵۵/۱	۵۴/۰	۵۷/۶	۵۹/۵	۶۲/۰
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۵۰/۱	۵۵/۵	۶۰/۹	۶۴/۰	۶۷/۵	۶۹/۵	۷۱/۸
	زنان	۶۰/۲	۶۵/۰	۷۰/۱	۷۶/۰	۷۷/۴	۷۷/۸	۷۹/۱
	مردان	۴۰/۰	۴۵/۹	۵۱/۸	۵۲/۰	۵۷/۷	۶۱/۱	۶۴/۵
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۵۳/۴	۵۷/۸	۶۲/۲	۶۴/۴	۶۶/۰	۶۶/۳	۶۸/۱
	زنان	۶۳/۸	۶۸/۲	۷۲/۹	۷۸/۵	۷۹/۰	۷۹/۱	۸۰/۷
	مردان	۴۲/۹	۴۷/۳	۵۱/۵	۵۰/۲	۵۳/۰	۵۳/۵	۵۵/۶
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۵۹/۳	۶۳/۵	۶۷/۴	۶۹/۰	۷۰/۴	۷۱/۵	۷۳/۴
	زنان	۷۰/۳	۷۴/۲	۷۸/۵	۸۳/۴	۸۳/۹	۸۴/۶	۸۶/۴
	مردان	۴۸/۳	۵۲/۷	۵۶/۳	۵۴/۶	۵۶/۹	۵۸/۴	۶۰/۵
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۶۴/۸	۶۸/۸	۷۲/۵	۷۴/۱	۷۶/۴	۷۸/۴	۸۰/۲
	زنان	۷۶/۳	۸۰/۱	۸۴/۱	۸۸/۹	۹۰/۰	۹۱/۸	۹۳/۲
	مردان	۵۳/۴	۵۷/۴	۶۰/۸	۵۹/۲	۶۲/۸	۶۵/۰	۶۷/۳

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۶۶/۴	۷۵/۴	۸۱/۷	۸۳/۹	۸۵/۸
مردان	۴۵/۲	۵۴/۵	۵۷/۶	۶۲/۳	۶۵/۲

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹




^۱ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۲ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.




شیوع (%) عامل خطر استعمال دخانیات به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۳	هر دو	۱۴/۲	۱۳/۸	۱۳/۳	۱۳/۰	۱۲/۲	۱۱/۵	۱۰/۱
	زنان	۴/۱	۳/۰	۲/۷	۲/۸	۲/۳	۲/۳	۲/۱
	مردان	۲۴/۳	۲۴/۷	۲۳/۹	۲۳/۳	۲۲/۲	۲۰/۶	۱۹/۳
کمتر از ۶۰ سال ^۴	هر دو	۱۳/۲	۱۳/۴	۱۳/۲	۱۳/۲	۱۲/۶	۱۱/۸	۱۱/۳
	زنان	۲/۴	۱/۶	۱/۵	۱/۹	۱/۷	۲/۱	۲/۳
	مردان	۲۴/۰	۲۵/۱	۲۵/۰	۲۴/۴	۲۳/۵	۲۱/۶	۲۰/۳
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۶/۰	۱۴/۷	۱۳/۴	۱۲/۸	۱۱/۵	۱۰/۷	۹/۵
	زنان	۷/۳	۵/۶	۵/۱	۴/۵	۳/۳	۲/۸	۱/۶
	مردان	۲۴/۸	۲۳/۸	۲۱/۸	۲۱/۰	۱۹/۷	۱۸/۷	۱۷/۳
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۱۴/۵	۱۳/۵	۱۲/۷	۱۲/۸	۱۱/۹	۱۲/۲	۱۱/۹
	زنان	۴/۸	۳/۳	۲/۹	۲/۲	۱/۱	۱/۱	۰/۶
	مردان	۲۴/۱	۲۳/۸	۲۲/۵	۲۳/۳	۲۲/۸	۲۳/۳	۲۳/۲
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۱۵/۰	۱۳/۶	۱۲/۳	۱۱/۶	۱۰/۲	۹/۶	۸/۴
	زنان	۵/۸	۳/۹	۳/۵	۲/۹	۱/۶	۱/۰	۰/۰
	مردان	۲۴/۱	۲۳/۲	۲۱/۰	۲۰/۲	۱۸/۹	۱۸/۲	۱۶/۷
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۱۸/۱	۱۶/۷	۱۵/۲	۱۴/۳	۱۳/۱	۱۲/۱	۱۰/۵
	زنان	۹/۵	۷/۸	۷/۱	۶/۴	۵/۰	۴/۲	۲/۷
	مردان	۲۶/۷	۲۵/۵	۲۳/۳	۲۲/۲	۲۱/۱	۱۹/۹	۱۸/۳
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۱۶/۷	۱۵/۱	۱۳/۷	۱۲/۵	۱۰/۷	۹/۱	۷/۱
	زنان	۹/۱	۷/۴	۷/۰	۶/۵	۵/۶	۴/۸	۳/۱
	مردان	۲۴/۳	۲۲/۸	۲۰/۴	۱۸/۵	۱۵/۹	۱۳/۳	۱۱/۰

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۶/۸	۴/۶	۲/۹	۱/۴	۰/۵
مردان	۲۴/۵	۲۱/۷	۱۹/۹	۱۸/۰	۱۶/۵

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹



^۳ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۴ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.



سیمای سلامت سالمندان

استان کردستان

شیوع عوامل خطر رفتاری



سیمای سلامت سالمندان

استان کردستان

(شیوع عوامل خطر رفتاری)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با شیوع عوامل خطر رفتاری در کل جمعیت (افراد ۱۸ سال و بالاتر)، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (افراد ۱۸ تا ۶۰ سال) ساکن در استان کردستان و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس، نوع و گروه‌های سنی بیان شده است. به منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی جهت مقایسه با استان‌های مجاور استان کردستان شامل: استان‌های آذربایجان غربی، همدان، کرمانشاه و زنجان نیز تدوین و ترسیم شده است.


آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر بیشتر بودن شیوع عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان کردستان نسبت به افراد غیر سالمند است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند افزایش یافته است. شیوع فعالیت فیزیکی ناکافی در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی بیشتر بوده است. زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان کردستان دارای کمترین شیوع استاندارد شده‌ی سنی فعالیت فیزیکی ناکافی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.

شیوع عامل خطر استعمال دخانیات در سال ۲۰۱۹ در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان کردستان نسبت به زنان غیر سالمند بیشتر و در مردان سالمند نسبت به غیر سالمند کمتر است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند کاهش یافته است. درصد استعمال دخانیات در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی کمتر بوده است و با افزایش سن اختلاف درصد در بین زنان و مردان کاهش پیدا می‌کند. مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان کردستان دارای کمترین درصد استاندارد شده‌ی سنی استعمال دخانیات نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.




شیوع (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۱	هر دو	۳۰/۰	۳۵/۰	۳۳/۵	۳۶/۴	۴۱/۱	۴۵/۶	۵۰/۱
	زنان	۳۳/۶	۳۹/۴	۳۸/۷	۴۲/۸	۴۸/۰	۵۳/۶	۵۸/۵
	مردان	۲۶/۵	۳۰/۶	۲۸/۲	۲۹/۹	۳۴/۲	۳۷/۶	۴۱/۷
کمتر از ۶۰ سال ^۲	هر دو	۲۶/۵	۳۱/۸	۲۹/۹	۳۲/۹	۳۸/۵	۴۳/۶	۴۸/۶
	زنان	۲۸/۶	۳۴/۶	۳۳/۸	۳۸/۷	۴۴/۷	۵۱/۵	۵۷/۲
	مردان	۲۴/۴	۲۸/۹	۲۶/۱	۲۷/۲	۳۲/۲	۳۵/۷	۴۰/۰
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۳۷/۱	۴۱/۵	۴۰/۶	۴۳/۲	۴۶/۴	۴۹/۶	۵۳/۱
	زنان	۴۳/۶	۴۹/۰	۴۸/۷	۵۱/۲	۵۴/۵	۵۷/۷	۶۱/۰
	مردان	۳۰/۶	۳۴/۱	۳۲/۵	۳۵/۳	۳۸/۴	۴۱/۴	۴۵/۲
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۳۰/۷	۳۵/۳	۳۴/۴	۳۷/۶	۴۲/۴	۴۶/۸	۵۱/۰
	زنان	۳۵/۹	۴۱/۶	۴۱/۷	۴۵/۰	۵۰/۶	۵۶/۰	۶۰/۶
	مردان	۲۵/۵	۲۸/۹	۲۷/۱	۳۰/۲	۳۴/۲	۳۷/۷	۴۱/۵
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۳۵/۱	۳۹/۵	۳۸/۴	۴۰/۹	۴۴/۱	۴۶/۷	۵۰/۲
	زنان	۴۲/۰	۴۷/۱	۴۶/۶	۴۸/۷	۵۱/۷	۵۴/۲	۵۷/۱
	مردان	۲۸/۳	۳۱/۸	۳۰/۳	۳۳/۱	۳۶/۴	۳۹/۳	۴۳/۳
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۳۹/۴	۴۳/۹	۴۲/۷	۴۴/۷	۴۵/۸	۴۸/۰	۵۱/۳
	زنان	۴۶/۴	۵۱/۹	۵۱/۳	۵۳/۲	۵۴/۶	۵۶/۷	۵۹/۵
	مردان	۳۲/۴	۳۵/۹	۳۴/۲	۳۶/۲	۳۷/۰	۳۹/۳	۴۳/۰
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۴۳/۲	۴۷/۵	۴۶/۷	۴۹/۷	۵۳/۵	۵۶/۷	۵۹/۹
	زنان	۵۰/۰	۵۵/۳	۵۵/۱	۵۷/۸	۶۱/۰	۶۴/۰	۶۶/۹
	مردان	۳۶/۴	۳۹/۶	۳۸/۴	۴۱/۶	۴۶/۰	۴۹/۵	۵۲/۸

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۴۲/۴	۴۷/۶	۵۳/۹	۶۰/۹	۶۴/۰
مردان	۲۹/۸	۳۱/۶	۳۷/۹	۴۴/۸	۴۸/۸

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹




^۱ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۲ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.




شیوع (%) عامل خطر استعمال دخانیات به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۳	هر دو	۱۷/۲	۱۶/۴	۱۵/۳	۱۶/۰	۱۴/۶	۱۳/۶	۱۲/۷
	زنان	۶/۷	۵/۷	۴/۲	۴/۵	۳/۴	۲/۷	۱/۹
	مردان	۲۷/۷	۲۷/۰	۲۶/۵	۲۷/۶	۲۵/۷	۲۴/۵	۲۳/۶
کمتر از ۶۰ سال ^۴	هر دو	۱۶/۰	۱۵/۹	۱۵/۵	۱۶/۱	۱۵/۱	۱۴/۵	۱۳/۹
	زنان	۴/۳	۳/۹	۲/۷	۳/۴	۲/۳	۱/۶	۱/۱
	مردان	۲۷/۸	۲۷/۹	۲۸/۲	۲۸/۸	۲۷/۹	۲۷/۳	۲۶/۸
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۹/۷	۱۷/۳	۱۵/۰	۱۵/۸	۱۳/۴	۱۱/۸	۱۰/۴
	زنان	۱۱/۷	۹/۴	۷/۱	۶/۶	۵/۵	۴/۷	۳/۵
	مردان	۲۷/۶	۲۵/۲	۲۲/۹	۲۵/۱	۲۱/۴	۱۸/۸	۱۷/۳
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۱۷/۹	۱۵/۸	۱۴/۲	۱۴/۸	۱۳/۲	۱۲/۰	۱۰/۹
	زنان	۹/۲	۷/۰	۴/۷	۴/۳	۳/۲	۲/۵	۱/۵
	مردان	۲۶/۶	۲۴/۶	۲۳/۷	۲۵/۲	۲۳/۱	۲۱/۵	۲۰/۳
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۱۹/۱	۱۶/۷	۱۴/۲	۱۵/۳	۱۲/۱	۹/۷	۸/۰
	زنان	۱۱/۵	۹/۱	۶/۶	۵/۸	۴/۱	۲/۹	۱/۳
	مردان	۲۶/۶	۲۴/۳	۲۱/۸	۲۴/۹	۲۰/۱	۱۶/۵	۱۴/۷
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۲۲/۰	۱۹/۶	۱۷/۲	۱۸/۰	۱۵/۲	۱۳/۵	۱۲/۲
	زنان	۱۴/۳	۱۲/۰	۹/۹	۹/۲	۸/۲	۷/۵	۶/۲
	مردان	۲۹/۷	۲۷/۱	۲۴/۵	۲۶/۸	۲۲/۱	۱۹/۵	۱۸/۲
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۱۹/۶	۱۷/۱	۱۴/۵	۱۵/۲	۱۳/۳	۱۲/۰	۱۰/۵
	زنان	۱۱/۸	۹/۶	۷/۳	۷/۰	۶/۵	۶/۱	۴/۸
	مردان	۲۷/۵	۲۴/۷	۲۱/۷	۲۳/۵	۲۰/۱	۱۷/۹	۱۶/۱

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۱۱/۲	۶/۷	۵/۰	۳/۰	۱/۷
مردان	۲۷/۳	۲۲/۹	۲۱/۵	۱۷/۶	۱۶/۴

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹



^۳ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۴ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.



سیمای سلامت سالمندان

استان کرمان

شیوع عوامل خطر رفتاری

سیمای سلامت سالمندان

استان کرمان

(شیوع عوامل خطر رفتاری)



در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با شیوع عوامل خطر رفتاری در کل جمعیت (افراد ۱۸ سال و بالاتر)، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (افراد ۱۸ تا ۶۰ سال) ساکن در استان کرمان و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس، نوع و گروه‌های سنی بیان شده است. به‌منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی جهت مقایسه با استان‌های مجاور استان کرمان شامل: استان‌های فارس، هرمزگان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و یزد نیز تدوین و ترسیم شده است.


آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر بیشتر بودن شیوع عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان کرمان نسبت به افراد غیر سالمند است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند افزایش یافته است. شیوع فعالیت فیزیکی ناکافی در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی بیشتر بوده است و با افزایش سن (به جز گروه سنی ۷۵ سال و بالاتر) اختلاف شیوع در بین زنان و مردان افزایش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان کرمان دارای بیشترین و یا کمترین شیوع استاندارد شده‌ی سنی فعالیت فیزیکی ناکافی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ نبوده‌اند.

شیوع عامل خطر استعمال دخانیات در سال ۲۰۱۹ در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان کرمان نسبت به زنان غیر سالمند بیشتر و در مردان سالمند نسبت به غیر سالمند کمتر است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند کاهش یافته است. درصد استعمال دخانیات در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی کمتر بوده است و با افزایش سن اختلاف درصد در بین زنان و مردان کاهش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان کرمان دارای بیشترین و یا کمترین درصد استاندارد شده‌ی سنی استعمال دخانیات نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ نبوده‌اند.




شیوع (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۱	هر دو	۳۸/۸	۴۲/۶	۴۶/۲	۵۱/۶	۵۵/۳	۵۸/۸	۶۲/۷
	زنان	۴۸/۲	۵۳/۰	۵۵/۹	۶۱/۰	۶۴/۵	۶۷/۳	۷۰/۷
	مردان	۲۹/۴	۳۲/۲	۳۶/۴	۴۲/۲	۴۶/۲	۵۰/۳	۵۴/۷
کمتر از ۶۰ سال ^۲	هر دو	۳۳/۴	۳۷/۶	۴۲/۰	۴۸/۸	۵۲/۷	۵۶/۶	۶۰/۸
	زنان	۴۱/۸	۴۶/۷	۵۱/۰	۵۷/۹	۶۱/۹	۶۵/۲	۶۹/۱
	مردان	۲۵/۰	۲۸/۴	۳۳/۰	۳۹/۷	۴۳/۶	۴۷/۹	۵۲/۵
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۴۹/۷	۵۲/۶	۵۴/۴	۵۷/۴	۶۰/۵	۶۳/۳	۶۶/۵
	زنان	۶۱/۲	۶۵/۵	۶۵/۶	۶۷/۴	۶۹/۷	۷۱/۵	۷۳/۸
	مردان	۳۸/۲	۳۹/۷	۴۳/۳	۴۷/۴	۵۱/۳	۵۵/۲	۵۹/۱
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۴۲/۶	۴۵/۹	۴۸/۵	۵۲/۱	۵۵/۹	۵۸/۷	۶۲/۳
	زنان	۵۲/۵	۵۷/۲	۵۷/۹	۶۰/۱	۶۳/۰	۶۴/۳	۶۶/۶
	مردان	۳۲/۷	۳۴/۵	۳۹/۰	۴۴/۰	۴۸/۸	۵۳/۲	۵۸/۰
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۴۷/۰	۴۹/۸	۵۱/۵	۵۴/۲	۵۷/۲	۶۰/۰	۶۳/۱
	زنان	۵۸/۶	۶۲/۹	۶۳/۰	۶۴/۷	۶۷/۲	۶۹/۲	۷۱/۷
	مردان	۳۵/۳	۳۶/۷	۳۹/۹	۴۳/۷	۴۷/۲	۵۰/۹	۵۴/۶
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۵۱/۵	۵۴/۶	۵۶/۱	۵۸/۷	۶۱/۱	۶۳/۷	۶۶/۸
	زنان	۶۳/۶	۶۸/۳	۶۸/۱	۶۹/۶	۷۱/۲	۷۲/۸	۷۵/۴
	مردان	۳۹/۵	۴۰/۹	۴۴/۱	۴۷/۷	۵۰/۹	۵۴/۵	۵۸/۳
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۵۷/۶	۶۰/۲	۶۱/۶	۶۴/۵	۶۸/۰	۷۱/۰	۷۳/۶
	زنان	۷۰/۰	۷۳/۸	۷۳/۲	۷۴/۹	۷۷/۶	۷۹/۸	۸۱/۶
	مردان	۴۵/۲	۴۶/۶	۵۰/۰	۵۴/۱	۵۸/۵	۶۲/۳	۶۵/۶

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۵۹/۸	۶۴/۴	۶۸/۷	۷۲/۸	۷۵/۴
مردان	۳۷/۳	۴۲/۶	۵۱/۰	۵۹/۰	۶۳/۲

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹




^۱ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۲ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.




شیوع (%) عامل خطر استعمال دخانیات به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۳	هر دو	۱۵/۷	۱۵/۱	۱۴/۱	۱۲/۷	۱۱/۷	۱۰/۳	۹/۵
	زنان	۴/۳	۳/۴	۲/۳	۲/۲	۱/۹	۱/۶	۱/۲
	مردان	۲۷/۰	۲۶/۸	۲۵/۸	۲۳/۳	۲۱/۶	۱۹/۱	۱۷/۷
کمتر از ۶۰ سال ^۴	هر دو	۱۴/۹	۱۵/۱	۱۳/۹	۱۳/۰	۱۲/۲	۱۰/۹	۱۰/۱
	زنان	۲/۷	۲/۴	۱/۶	۱/۵	۱/۲	۱/۰	۰/۹
	مردان	۲۷/۰	۲۷/۹	۲۶/۲	۲۴/۵	۲۳/۲	۲۰/۷	۱۹/۳
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۷/۳	۱۵/۱	۱۴/۴	۱۲/۳	۱۰/۸	۹/۳	۸/۲
	زنان	۷/۵	۵/۵	۳/۸	۳/۸	۳/۳	۲/۶	۱/۷
	مردان	۲۷/۱	۲۴/۶	۲۵/۰	۲۰/۸	۱۸/۳	۱۵/۹	۱۴/۶
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۱۵/۷	۱۳/۷	۱۳/۷	۱۱/۹	۱۱/۳	۱۰/۴	۹/۸
	زنان	۴/۶	۲/۶	۰/۷	۰/۵	۰/۰	۰/۰	۰/۰
	مردان	۲۶/۸	۲۴/۸	۲۶/۶	۲۳/۳	۲۲/۵	۲۰/۸	۱۹/۷
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۱۶/۶	۱۴/۴	۱۳/۷	۱۱/۶	۱۰/۲	۸/۵	۷/۳
	زنان	۶/۷	۴/۷	۲/۸	۲/۵	۱/۶	۰/۸	۰/۰
	مردان	۲۶/۶	۲۴/۲	۲۴/۷	۲۰/۷	۱۸/۸	۱۶/۲	۱۴/۷
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۱۹/۰	۱۶/۹	۱۶/۲	۱۴/۲	۱۲/۸	۱۱/۴	۱۰/۳
	زنان	۹/۷	۷/۹	۶/۴	۶/۶	۶/۳	۵/۹	۵/۰
	مردان	۲۸/۴	۲۵/۹	۲۶/۰	۲۱/۹	۱۹/۳	۱۶/۹	۱۵/۷
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۱۷/۹	۱۵/۲	۱۳/۹	۱۱/۴	۹/۰	۶/۸	۵/۱
	زنان	۹/۰	۷/۰	۵/۲	۵/۵	۵/۲	۳/۸	۲/۰
	مردان	۲۶/۸	۲۳/۴	۲۲/۶	۱۷/۳	۱۲/۸	۹/۹	۸/۲

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۷/۰	۳/۲	۲/۶	۱/۳	۰/۶
مردان	۲۷/۰	۲۵/۱	۱۸/۸	۱۵/۱	۱۴/۰

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹



^۳ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۴ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.

سیمای سلامت سالمندان

استان کرمانشاه

شیوع عوامل خطر رفتاری



سیمای سلامت سالمندان

استان کرمانشاه

(شیوع عوامل خطر رفتاری)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با شیوع عوامل خطر رفتاری در کل جمعیت (افراد ۱۸ سال و بالاتر)، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (افراد ۱۸ تا ۶۰ سال) ساکن در استان کرمانشاه و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس، نوع و گروه‌های سنی بیان شده است. به‌منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی جهت مقایسه با استان‌های مجاور استان کرمانشاه شامل: استان‌های همدان، ایلام، کردستان و لرستان نیز تدوین و ترسیم شده است.


آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر بیشتر بودن شیوع عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان کرمانشاه نسبت به افراد غیر سالمند است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند افزایش یافته است. شیوع فعالیت فیزیکی ناکافی در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی بیشتر بوده است و با افزایش سن (به جز گروه‌های سنی ۷۰ تا ۷۴ سال و ۷۵ سال و بالاتر) اختلاف شیوع در بین زنان و مردان افزایش پیدا می‌کند. مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان کرمانشاه دارای بیشترین شیوع استاندارد شده‌ی سنی فعالیت فیزیکی ناکافی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.

شیوع عامل خطر استعمال دخانیات در سال ۲۰۱۹ در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان کرمانشاه نسبت به افراد غیر سالمند بیشتر و در مردان سالمند نسبت به غیر سالمند کمتر است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند کاهش یافته است. درصد استعمال دخانیات در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی کمتر بوده است و با افزایش سن اختلاف درصد در بین زنان و مردان کاهش پیدا می‌کند. زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان کرمانشاه دارای بیشترین درصد استاندارد شده‌ی سنی استعمال دخانیات نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.




شیوع (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۱	هر دو	۲۵/۴	۳۰/۹	۳۲/۹	۳۷/۲	۴۳/۸	۵۱/۶	۵۷/۳
	زنان	۲۹/۷	۳۶/۴	۳۸/۶	۴۲/۶	۵۰/۰	۵۸/۸	۶۴/۹
	مردان	۲۱/۲	۲۵/۴	۲۷/۲	۳۱/۸	۳۷/۶	۴۴/۴	۴۹/۸
کمتر از ۶۰ سال ^۲	هر دو	۲۱/۶	۲۷/۲	۲۸/۹	۳۳/۷	۴۰/۱	۴۸/۶	۵۵/۰
	زنان	۲۴/۷	۳۱/۹	۳۴/۴	۳۸/۵	۴۶/۱	۵۶/۱	۶۳/۲
	مردان	۱۸/۵	۲۲/۵	۲۳/۴	۲۹/۰	۳۴/۱	۴۱/۰	۴۶/۸
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۳۳/۱	۳۸/۳	۴۰/۹	۴۴/۲	۵۱/۳	۵۷/۶	۶۲/۰
	زنان	۳۹/۵	۴۵/۴	۴۷/۱	۵۱/۰	۵۷/۸	۶۴/۱	۶۸/۳
	مردان	۲۶/۶	۳۱/۲	۳۴/۸	۳۷/۴	۴۴/۸	۵۱/۲	۵۵/۷
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۲۷/۸	۳۲/۹	۳۵/۲	۳۷/۹	۴۴/۶	۵۲/۷	۵۸/۲
	زنان	۳۳/۱	۳۸/۷	۴۰/۱	۴۳/۸	۵۰/۵	۵۸/۹	۶۴/۴
	مردان	۲۲/۵	۲۷/۱	۳۰/۳	۳۲/۱	۳۸/۶	۴۶/۵	۵۲/۰
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۳۱/۰	۳۶/۱	۳۸/۵	۴۱/۵	۴۹/۰	۵۶/۰	۶۰/۴
	زنان	۳۷/۳	۴۳/۳	۴۵/۰	۴۹/۳	۵۷/۳	۶۴/۸	۶۹/۳
	مردان	۲۴/۶	۲۸/۹	۳۲/۱	۳۳/۷	۴۰/۷	۴۷/۲	۵۱/۵
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۳۵/۲	۴۰/۷	۴۳/۳	۴۶/۷	۵۳/۴	۵۸/۶	۶۲/۷
	زنان	۴۲/۷	۴۸/۹	۵۰/۹	۵۵/۰	۶۱/۵	۶۶/۵	۷۰/۳
	مردان	۲۷/۷	۳۲/۴	۳۵/۸	۳۸/۴	۴۵/۲	۵۰/۷	۵۵/۱
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۳۸/۳	۴۳/۶	۴۶/۶	۵۰/۶	۵۸/۲	۶۳/۲	۶۶/۷
	زنان	۴۵/۰	۵۰/۶	۵۲/۲	۵۵/۸	۶۱/۸	۶۶/۱	۶۹/۱
	مردان	۳۱/۶	۳۶/۵	۴۰/۹	۴۵/۴	۵۴/۶	۶۰/۳	۶۴/۳

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۳۸/۵	۴۵/۹	۵۶/۶	۶۷/۷	۷۱/۲
مردان	۲۶/۰	۳۴/۱	۴۳/۹	۵۵/۲	۵۹/۲

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹




^۱ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.

^۲ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.




شیوع (%) عامل خطر استعمال دخانیات به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۳	هر دو	۱۶/۸	۱۷/۲	۱۵/۶	۱۶/۷	۱۴/۶	۱۲/۹	۱۱/۸
	زنان	۶/۰	۵/۰	۳/۹	۴/۴	۴/۱	۳/۸	۳/۱
	مردان	۲۷/۶	۲۹/۴	۲۷/۳	۲۹/۰	۲۵/۲	۲۲/۰	۲۰/۴
کمتر از ۶۰ سال ^۴	هر دو	۱۵/۶	۱۵/۷	۱۴/۶	۱۴/۶	۱۳/۵	۱۲/۳	۱۱/۵
	زنان	۴/۴	۳/۷	۲/۷	۳/۱	۲/۴	۲/۱	۱/۶
	مردان	۲۶/۷	۲۷/۷	۲۶/۵	۲۶/۰	۲۴/۵	۲۲/۵	۲۱/۳
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۹/۳	۲۰/۲	۱۷/۶	۲۱/۰	۱۶/۹	۱۴/۲	۱۲/۴
	زنان	۹/۲	۷/۶	۶/۴	۷/۰	۷/۵	۷/۳	۶/۲
	مردان	۲۹/۵	۳۲/۸	۲۸/۸	۳۵/۰	۲۶/۴	۲۱/۰	۱۸/۷
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۱۷/۹	۱۸/۸	۱۵/۸	۱۶/۶	۱۴/۳	۱۲/۴	۱۰/۸
	زنان	۷/۳	۵/۴	۳/۹	۳/۴	۲/۵	۲/۳	۱/۲
	مردان	۲۸/۶	۳۲/۱	۲۷/۷	۲۹/۸	۲۶/۰	۲۲/۵	۲۰/۵
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۱۹/۱	۱۹/۹	۱۷/۵	۱۷/۰	۱۷/۰	۱۲/۹	۱۰/۷
	زنان	۸/۸	۷/۱	۵/۸	۶/۰	۵/۹	۵/۹	۵/۱
	مردان	۲۹/۴	۳۲/۸	۲۹/۲	۳۸/۱	۲۸/۱	۱۹/۸	۱۶/۳
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۲۱/۵	۲۲/۴	۲۰/۲	۲۴/۵	۱۹/۹	۱۷/۳	۱۵/۷
	زنان	۱۱/۷	۱۰/۳	۹/۳	۹/۸	۱۰/۸	۱۰/۸	۹/۷
	مردان	۳۱/۲	۳۴/۶	۳۱/۱	۳۹/۱	۲۹/۱	۲۳/۷	۲۱/۸
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۱۸/۸	۱۹/۶	۱۷/۱	۲۰/۸	۱۶/۵	۱۴/۲	۱۲/۳
	زنان	۸/۹	۷/۷	۶/۹	۸/۸	۱۰/۶	۱۰/۳	۸/۶
	مردان	۲۸/۷	۳۱/۵	۲۷/۴	۳۲/۸	۲۲/۵	۱۸/۱	۱۶/۱

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۸/۸	۵/۹	۶/۶	۵/۳	۳/۹
مردان	۲۹/۲	۲۸/۵	۲۶/۲	۱۸/۶	۱۷/۲

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹



^۳ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۴ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.



سیمای سلامت سالمندان

استان کهگیلویه و بویراحمد

شیوع عوامل خطر رفتاری



سیمای سلامت سالمندان

استان کهگیلویه و بویراحمد

(شیوع عوامل خطر رفتاری)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با شیوع عوامل خطر رفتاری در کل جمعیت (افراد ۱۸ سال و بالاتر)، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (افراد ۱۸ تا ۶۰ سال) ساکن در استان کهگیلویه و بویراحمد و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس، نوع و گروه‌های سنی بیان شده است. به‌منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی جهت مقایسه با استان‌های مجاور استان کهگیلویه و بویراحمد شامل: استان‌های بوشهر، چهارمحال و بختیاری، فارس، اصفهان و خوزستان نیز تدوین و ترسیم شده است.


آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر بیشتر بودن شیوع عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در سال ۲۰۱۹ در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به زنان غیر سالمند و کمتر بودن شیوع در مردان سالمند نسبت به غیر سالمند است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند افزایش یافته است. شیوع فعالیت فیزیکی ناکافی در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی بیشتر بوده است. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان کهگیلویه و بویراحمد دارای کمترین شیوع استاندارد شده‌ی سنی فعالیت فیزیکی ناکافی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.

شیوع عامل خطر استعمال دخانیات در سال ۲۰۱۹ در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به زنان غیر سالمند کمتر و در مردان سالمند نسبت به غیر سالمند بیشتر است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند کاهش یافته است. درصد استعمال دخانیات در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی کمتر بوده است و با افزایش سن (به جز گروه سنی ۷۵ سال و بالاتر) اختلاف درصد در بین زنان و مردان کاهش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان کهگیلویه و بویراحمد دارای بیشترین و یا کمترین درصد استاندارد شده‌ی سنی استعمال دخانیات نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ نبوده‌اند.




شیوع (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۱۹	۲۰۱۷	۲۰۱۵	۲۰۱۳	۲۰۱۱	۲۰۰۹	۲۰۰۷
همه سنین ^۱	هر دو	۴۷/۲	۴۳/۱	۳۹/۳	۳۶/۳	۳۳/۷	۲۷/۹	۲۴/۵
	زنان	۵۲/۶	۴۸/۴	۴۴/۷	۴۱/۵	۳۸/۶	۳۱/۷	۲۸/۵
	مردان	۴۱/۹	۳۷/۷	۳۴/۰	۳۱/۰	۲۸/۸	۲۴/۱	۲۰/۶
کمتر از ۶۰ سال ^۲	هر دو	۴۷/۱	۴۲/۵	۳۸/۳	۳۴/۹	۳۲/۷	۲۳/۶	۱۹/۹
	زنان	۵۰/۷	۴۵/۹	۴۱/۶	۳۸/۲	۳۵/۶	۲۶/۲	۲۲/۵
	مردان	۴۳/۶	۳۹/۱	۳۵/۰	۳۱/۶	۲۹/۷	۲۱/۱	۱۷/۴
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۴۷/۴	۴۴/۳	۴۱/۴	۳۹/۰	۳۵/۸	۳۶/۴	۳۳/۸
	زنان	۵۶/۴	۵۳/۶	۵۰/۹	۴۸/۱	۴۴/۷	۴۲/۶	۴۰/۵
	مردان	۳۸/۴	۳۵/۱	۳۲/۰	۲۹/۹	۲۶/۸	۳۰/۲	۲۷/۰
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۴۱/۲	۳۷/۷	۳۴/۸	۳۳/۱	۲۹/۸	۳۰/۶	۲۷/۷
	زنان	۴۷/۷	۴۴/۳	۴۱/۶	۳۹/۶	۳۶/۸	۳۴/۸	۳۲/۶
	مردان	۳۴/۸	۳۱/۰	۲۸/۰	۲۶/۶	۲۲/۷	۲۶/۳	۲۲/۹
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۴۷/۷	۴۴/۳	۴۱/۰	۳۸/۰	۳۴/۳	۳۵/۰	۳۲/۳
	زنان	۵۳/۲	۵۰/۴	۴۷/۷	۴۵/۲	۴۲/۳	۴۰/۶	۳۹/۰
	مردان	۴۲/۲	۳۸/۱	۳۴/۳	۳۰/۹	۲۶/۲	۲۹/۵	۲۵/۷
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۴۷/۹	۴۴/۸	۴۱/۶	۳۹/۳	۳۷/۰	۳۷/۹	۳۵/۱
	زنان	۶۶/۱	۶۲/۷	۵۹/۰	۵۴/۸	۵۰/۱	۴۷/۰	۴۳/۷
	مردان	۲۹/۸	۲۶/۹	۲۴/۳	۲۳/۸	۲۳/۹	۲۸/۸	۲۶/۶
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۵۲/۹	۵۰/۶	۴۸/۳	۴۵/۷	۴۲/۰	۴۲/۱	۳۹/۸
	زنان	۵۸/۸	۵۷/۰	۵۵/۳	۵۳/۰	۴۹/۷	۴۸/۰	۴۶/۸
	مردان	۴۷/۰	۴۴/۲	۴۱/۴	۳۸/۵	۳۴/۳	۳۶/۲	۳۲/۹

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۳۷/۲	۴۱/۳	۴۶/۶	۵۱/۸	۵۴/۷
مردان	۲۸/۲	۲۹/۸	۳۰/۰	۳۵/۲	۳۸/۷

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹




^۱ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۲ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.




شیوع (%) عامل خطر استعمال دخانیات به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۳	هر دو	۱۴/۹	۱۳/۸	۱۲/۹	۱۲/۳	۱۱/۷	۱۰/۸	۱۰/۱
	زنان	۵/۲	۲/۹	۱/۵	۰/۶	۰/۶	۰/۷	۰/۴
	مردان	۲۴/۷	۲۴/۷	۲۴/۴	۲۴/۰	۲۲/۹	۲۱/۰	۱۸/۷
کمتر از ۶۰ سال ^۴	هر دو	۱۳/۹	۱۳/۸	۱۳/۰	۱۲/۹	۱۱/۸	۱۰/۴	۹/۶
	زنان	۳/۲	۱/۷	۰/۶	۰/۳	۰/۳	۰/۵	۰/۵
	مردان	۲۴/۶	۲۵/۸	۲۵/۵	۲۵/۵	۲۳/۳	۲۰/۴	۱۸/۸
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۷/۰	۱۳/۸	۱۲/۷	۱۱/۰	۱۱/۵	۱۱/۶	۱۱/۰
	زنان	۹/۲	۵/۲	۳/۴	۱/۲	۱/۱	۱/۰	۰/۷
	مردان	۲۴/۷	۲۲/۴	۲۲/۱	۲۰/۹	۲۱/۹	۲۲/۳	۲۱/۰
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۱۴/۸	۱۱/۷	۱۰/۹	۹/۵	۹/۶	۹/۹	۹/۸
	زنان	۶/۳	۲/۴	۰/۸	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
	مردان	۲۳/۳	۲۰/۹	۲۱/۰	۱۹/۱	۱۹/۳	۱۹/۹	۱۸/۷
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۱۶/۸	۱۳/۵	۱۲/۵	۱۰/۴	۱۰/۳	۱۰/۵	۱۰/۳
	زنان	۹/۵	۵/۲	۳/۲	۰/۴	۰/۰	۰/۰	۰/۰
	مردان	۲۴/۲	۲۱/۹	۲۱/۸	۲۰/۴	۲۰/۷	۲۱/۱	۲۰/۷
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۱۸/۶	۱۵/۵	۱۴/۵	۱۲/۴	۱۲/۷	۱۲/۶	۱۱/۳
	زنان	۱۱/۴	۷/۹	۶/۶	۴/۲	۴/۲	۳/۹	۲/۸
	مردان	۲۵/۸	۲۳/۰	۲۲/۴	۲۰/۶	۲۱/۳	۲۱/۴	۱۹/۹
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۱۷/۷	۱۴/۵	۱۳/۱	۱۱/۸	۱۳/۳	۱۳/۴	۱۲/۶
	زنان	۹/۷	۵/۲	۲/۹	۰/۱	۰/۰	۰/۰	۰/۰
	مردان	۲۵/۷	۲۳/۷	۲۳/۳	۲۳/۴	۲۶/۵	۲۶/۷	۲۵/۲

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۸/۷	۲/۸	۰/۷	۰/۵	۰/۲
مردان	۲۴/۵	۲۲/۰	۲۱/۶	۲۱/۲	۲۰/۰

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹



^۳ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۴ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.



سیمای سلامت سالمندان

استان گلستان

شیوع عوامل خطر رفتاری



سیمای سلامت سالمندان

استان گلستان

(شیوع عوامل خطر رفتاری)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با شیوع عوامل خطر رفتاری در کل جمعیت (افراد ۱۸ سال و بالاتر)، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (افراد ۱۸ تا ۶۰ سال) ساکن در استان گلستان و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس، نوع و گروه‌های سنی بیان شده است. به‌منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی جهت مقایسه با استان‌های مجاور استان گلستان شامل: استان‌های خراسان شمالی، مازندران و سمنان نیز تدوین و ترسیم شده است.


آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر بیشتر بودن شیوع عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان گلستان نسبت به افراد غیر سالمند است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند افزایش یافته است. شیوع فعالیت فیزیکی ناکافی در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی بیشتر بوده است و با افزایش سن اختلاف شیوع در بین زنان و مردان افزایش پیدا می‌کند. زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان گلستان دارای بیشترین شیوع استاندارد شده‌ی سنی فعالیت فیزیکی ناکافی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.

شیوع عامل خطر استعمال دخانیات در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان گلستان نسبت به افراد غیر سالمند کمتر است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند کاهش یافته است. درصد استعمال دخانیات در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی کمتر بوده است. مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان گلستان دارای کمترین درصد استاندارد شده‌ی سنی استعمال دخانیات نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.




شیوع (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۱	هر دو	۳۹/۷	۴۴/۰	۴۸/۱	۵۱/۸	۵۵/۱	۵۸/۱	۶۱/۸
	زنان	۴۷/۸	۵۳/۱	۵۷/۱	۶۰/۹	۶۴/۴	۶۷/۲	۷۰/۵
	مردان	۳۱/۶	۳۵/۰	۳۹/۲	۴۲/۶	۴۵/۸	۴۹/۰	۵۳/۱
کمتر از ۶۰ سال ^۲	هر دو	۳۴/۲	۳۹/۲	۴۳/۴	۴۷/۸	۵۲/۲	۵۶/۰	۶۰/۲
	زنان	۴۱/۳	۴۷/۱	۵۱/۳	۵۵/۸	۶۰/۲	۶۳/۷	۶۷/۵
	مردان	۲۷/۱	۳۱/۳	۳۵/۵	۳۹/۸	۴۴/۲	۴۸/۳	۵۲/۸
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۵۰/۷	۵۳/۷	۵۷/۷	۵۹/۸	۶۱/۰	۶۲/۳	۶۵/۱
	زنان	۶۰/۶	۶۵/۱	۶۸/۹	۷۱/۳	۷۲/۸	۷۴/۱	۷۶/۳
	مردان	۴۰/۷	۴۲/۳	۴۶/۵	۴۸/۲	۴۹/۱	۵۰/۴	۵۳/۹
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۴۴/۸	۴۸/۲	۵۳/۰	۵۶/۱	۵۸/۸	۶۰/۰	۶۲/۸
	زنان	۵۳/۴	۵۸/۱	۶۲/۵	۶۵/۶	۶۷/۷	۶۸/۵	۷۰/۸
	مردان	۳۶/۱	۳۸/۳	۴۳/۵	۴۶/۶	۴۹/۹	۵۱/۴	۵۴/۹
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۴۸/۲	۵۱/۴	۵۵/۸	۵۸/۲	۵۸/۶	۵۸/۹	۶۱/۸
	زنان	۵۷/۵	۶۲/۳	۶۶/۴	۶۸/۹	۶۹/۳	۶۹/۵	۷۱/۸
	مردان	۳۸/۹	۴۰/۵	۴۵/۱	۴۷/۴	۴۷/۸	۴۸/۲	۵۱/۹
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۵۲/۹	۵۵/۹	۵۹/۷	۶۱/۲	۶۱/۷	۶۳/۱	۶۶/۰
	زنان	۶۳/۷	۶۸/۴	۷۲/۱	۷۴/۵	۷۶/۰	۷۷/۸	۸۰/۳
	مردان	۴۲/۱	۴۳/۵	۴۷/۳	۴۸/۰	۴۷/۴	۴۸/۵	۵۱/۸
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۵۶/۸	۵۹/۲	۶۲/۳	۶۳/۶	۶۴/۸	۶۷/۱	۶۹/۸
	زنان	۶۷/۹	۷۱/۵	۷۴/۳	۷۶/۳	۷۸/۴	۸۰/۷	۸۲/۵
	مردان	۴۵/۸	۴۶/۹	۵۰/۲	۵۰/۹	۵۱/۲	۵۳/۶	۵۷/۱

رشد زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۵۹/۵	۶۷/۸	۷۱/۹	۷۵/۳	۷۷/۹
مردان	۴۰/۰	۴۶/۰	۴۹/۳	۵۴/۲	۵۸/۲

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹




^۱ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۲ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.




شیوع (%) عامل خطر استعمال دخانیات به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۳	هر دو	۱۰/۱	۱۰/۷	۹/۳	۸/۵	۷/۹	۶/۹	۶/۳
	زنان	۱/۱	۰/۷	۰/۴	۰/۴	۰/۲	۰/۲	۰/۱
	مردان	۱۹/۱	۲۰/۶	۱۸/۱	۱۶/۶	۱۵/۵	۱۳/۶	۱۲/۴
کمتر از ۶۰ سال ^۴	هر دو	۱۰/۲	۱۱/۳	۹/۹	۹/۲	۸/۵	۷/۳	۶/۷
	زنان	۰/۴	۰/۲	۰/۱	۰/۲	۰/۱	۰/۱	۰/۱
	مردان	۱۹/۹	۲۲/۵	۱۹/۷	۱۸/۱	۱۶/۹	۱۴/۶	۱۳/۲
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۰/۱	۹/۴	۸/۰	۷/۲	۶/۶	۶/۱	۵/۵
	زنان	۲/۵	۱/۸	۱/۱	۰/۸	۰/۶	۰/۴	۰/۲
	مردان	۱۷/۶	۱۶/۹	۱۵/۰	۱۳/۵	۱۲/۷	۱۱/۷	۱۰/۸
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۸/۹	۸/۸	۸/۲	۸/۷	۸/۳	۸/۰	۷/۷
	زنان	۰/۳	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
	مردان	۱۷/۵	۱۷/۵	۱۶/۳	۱۷/۴	۱۶/۶	۱۵/۹	۱۵/۴
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۹/۶	۸/۹	۷/۵	۶/۵	۶/۲	۵/۶	۵/۲
	زنان	۱/۷	۱/۰	۰/۳	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
	مردان	۱۷/۵	۱۶/۷	۱۴/۸	۱۳/۰	۱۲/۳	۱۱/۲	۱۰/۴
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۱۲/۰	۱۱/۳	۹/۸	۸/۴	۷/۴	۶/۶	۵/۵
	زنان	۵/۱	۴/۵	۳/۷	۳/۳	۲/۲	۱/۷	۰/۶
	مردان	۱۹/۰	۱۸/۱	۱۵/۹	۱۳/۵	۱۲/۷	۱۱/۶	۱۰/۴
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۹/۸	۸/۵	۶/۶	۵/۱	۴/۶	۴/۱	۳/۴
	زنان	۳/۱	۱/۸	۰/۳	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
	مردان	۱۶/۴	۱۵/۳	۱۲/۹	۱۰/۲	۹/۳	۸/۱	۶/۸

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۲/۱	۰/۸	۰/۴	۰/۱	۰/۰
مردان	۱۷/۵	۱۵/۱	۱۳/۲	۱۱/۴	۱۰/۶

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹



^۳ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۴ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.



سیمای سلامت سالمندان

استان گیلان

شیوع عوامل خطر رفتاری



سیمای سلامت سالمندان

استان گیلان

(شیوع عوامل خطر رفتاری)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با شیوع عوامل خطر رفتاری در کل جمعیت (افراد ۱۸ سال و بالاتر)، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (افراد ۱۸ تا ۶۰ سال) ساکن در استان گیلان و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس، نوع و گروه‌های سنی بیان شده است. به‌منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی جهت مقایسه با استان‌های مجاور استان گیلان شامل: استان‌های اردبیل، مازندران، قزوین و زنجان نیز تدوین و ترسیم شده است.


آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر بیشتر بودن شیوع عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان گیلان نسبت به افراد غیر سالمند است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند افزایش یافته است. شیوع فعالیت فیزیکی ناکافی در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی بیشتر بوده است و با افزایش سن اختلاف شیوع در بین زنان و مردان افزایش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان گیلان دارای بیشترین و یا کمترین شیوع استاندارد شده‌ی سنی فعالیت فیزیکی ناکافی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ نبوده‌اند.

شیوع عامل خطر استعمال دخانیات در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان گیلان نسبت به افراد غیر سالمند کمتر است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند کاهش یافته است. درصد استعمال دخانیات در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی کمتر بوده است و با افزایش سن اختلاف درصد در بین زنان و مردان کاهش پیدا می‌کند. زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان گیلان دارای کمترین درصد استاندارد شده‌ی سنی استعمال دخانیات نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.




شیوع (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۱	هر دو	۲۹/۷	۳۳/۸	۳۹/۳	۴۴/۷	۴۷/۲	۴۸/۸	۵۲/۲
	زنان	۳۷/۲	۴۱/۸	۴۸/۸	۵۷/۲	۵۸/۴	۵۸/۹	۶۱/۷
	مردان	۲۲/۱	۲۵/۷	۲۹/۸	۳۲/۳	۳۶/۰	۳۸/۸	۴۲/۷
کمتر از ۶۰ سال ^۲	هر دو	۲۵/۴	۲۹/۹	۳۶/۳	۴۰/۶	۴۳/۶	۴۵/۱	۴۸/۵
	زنان	۳۱/۹	۳۷/۴	۴۴/۹	۵۲/۲	۵۴/۳	۵۴/۵	۵۷/۴
	مردان	۱۸/۹	۲۲/۴	۲۷/۸	۲۸/۹	۳۳/۰	۳۵/۷	۳۹/۶
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۳۸/۲	۴۱/۴	۴۵/۳	۵۳/۰	۵۴/۲	۵۶/۳	۵۹/۴
	زنان	۴۸/۰	۵۰/۵	۵۶/۶	۶۷/۱	۶۶/۵	۶۷/۶	۷۰/۲
	مردان	۲۸/۴	۳۲/۳	۳۳/۹	۳۸/۹	۴۲/۰	۴۵/۰	۴۸/۷
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۳۲/۸	۳۶/۴	۴۰/۶	۴۹/۳	۴۹/۸	۵۰/۳	۵۳/۵
	زنان	۴۱/۱	۴۳/۷	۴۹/۹	۶۱/۷	۵۹/۷	۵۸/۴	۶۰/۴
	مردان	۲۴/۶	۲۹/۰	۳۱/۲	۳۶/۹	۳۹/۸	۴۲/۳	۴۶/۶
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۳۵/۰	۳۸/۴	۴۲/۳	۵۰/۱	۴۹/۸	۵۱/۱	۵۴/۵
	زنان	۴۴/۰	۴۶/۷	۵۲/۷	۶۳/۷	۶۱/۷	۶۲/۳	۶۵/۲
	مردان	۲۶/۱	۳۰/۱	۳۱/۹	۳۶/۶	۳۷/۸	۳۹/۹	۴۳/۷
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۳۹/۸	۴۲/۹	۴۶/۵	۵۴/۰	۵۵/۸	۵۹/۱	۶۲/۴
	زنان	۵۰/۳	۵۲/۷	۵۸/۴	۶۸/۳	۶۷/۸	۷۰/۲	۷۲/۹
	مردان	۲۹/۳	۳۳/۱	۳۴/۶	۳۹/۶	۴۳/۸	۴۸/۰	۵۱/۸
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۴۵/۱	۴۷/۹	۵۱/۷	۵۸/۶	۶۱/۶	۶۴/۷	۶۷/۴
	زنان	۵۶/۵	۵۸/۸	۶۵/۲	۷۴/۶	۷۶/۵	۷۹/۵	۸۲/۱
	مردان	۳۳/۷	۳۷/۱	۳۸/۲	۴۲/۷	۴۶/۶	۴۹/۹	۵۲/۸

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۴۶/۸	۵۵/۵	۶۵/۴	۶۸/۶	۷۱/۸
مردان	۲۷/۸	۳۳/۵	۴۱/۵	۴۸/۱	۵۲/۳

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹




^۱ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۲ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.




شیوع (%) عامل خطر استعمال دخانیات به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۳	هر دو	۱۶/۴	۱۵/۸	۱۴/۷	۱۵/۰	۱۴/۰	۱۳/۰	۱۲/۲
	زنان	۲/۹	۲/۳	۱/۵	۱/۷	۱/۴	۱/۲	۱/۲
	مردان	۲۹/۸	۲۹/۴	۲۷/۹	۲۸/۳	۲۶/۶	۲۴/۹	۲۳/۲
کمتر از ۶۰ سال ^۴	هر دو	۱۶/۲	۱۵/۷	۱۵/۵	۱۴/۶	۱۴/۳	۱۳/۷	۱۳/۰
	زنان	۲/۳	۱/۸	۱/۵	۱/۷	۱/۶	۱/۷	۱/۸
	مردان	۳۰/۲	۲۹/۶	۲۹/۵	۲۷/۴	۲۷/۰	۲۵/۷	۲۴/۳
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۶/۷	۱۶/۱	۱۳/۲	۱۵/۹	۱۳/۳	۱۱/۷	۱۰/۴
	زنان	۴/۳	۳/۲	۱/۶	۱/۷	۰/۸	۰/۲	۰/۰
	مردان	۲۹/۱	۲۹/۰	۲۴/۸	۳۰/۱	۲۵/۷	۲۳/۲	۲۱/۹
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۱۶/۲	۱۶/۳	۱۴/۴	۱۵/۷	۱۵/۰	۱۵/۰	۱۴/۷
	زنان	۲/۷	۱/۷	۰/۳	۰/۴	۰/۰	۰/۰	۰/۰
	مردان	۲۹/۷	۳۰/۹	۲۸/۴	۳۱/۱	۳۰/۱	۳۰/۰	۲۹/۵
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۱۵/۸	۱۵/۳	۱۲/۵	۱۶/۴	۱۴/۱	۱۲/۷	۱۲/۰
	زنان	۳/۰	۱/۹	۰/۶	۰/۸	۰/۰	۰/۰	۰/۰
	مردان	۲۸/۶	۲۸/۷	۲۴/۴	۳۲/۰	۲۸/۲	۲۵/۴	۲۴/۱
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۱۸/۳	۱۷/۴	۱۴/۲	۱۷/۴	۱۴/۳	۱۲/۱	۱۰/۱
	زنان	۶/۳	۵/۱	۳/۳	۳/۳	۲/۲	۰/۹	۰/۰
	مردان	۳۰/۳	۲۹/۸	۲۵/۱	۳۱/۶	۲۶/۴	۲۳/۲	۲۱/۵
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۱۶/۶	۱۵/۳	۱۱/۸	۱۴/۰	۹/۶	۷/۲	۶/۱
	زنان	۵/۱	۳/۹	۲/۳	۲/۲	۱/۰	۰/۰	۰/۰
	مردان	۲۸/۱	۲۶/۷	۲۱/۳	۲۵/۸	۱۸/۲	۱۴/۳	۱۲/۱

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۳/۹	۱/۳	۰/۶	۰/۰	۰/۰
مردان	۲۹/۱	۲۵/۲	۲۶/۳	۲۳/۰	۲۲/۱

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹



^۳ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۴ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.



سیمای سلامت سالمندان

استان لرستان

شیوع عوامل خطر رفتاری

سیمای سلامت سالمندان

استان لرستان

(شیوع عوامل خطر رفتاری)



در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با شیوع عوامل خطر رفتاری در کل جمعیت (افراد ۱۸ سال و بالاتر)، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (افراد ۱۸ تا ۶۰ سال) ساکن در استان لرستان و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس، نوع و گروه‌های سنی بیان شده است. به‌منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی جهت مقایسه با استان‌های مجاور استان لرستان شامل: استان‌های چهارمحال و بختیاری، همدان، ایلام، اصفهان، کرمانشاه، خوزستان و مرکزی نیز تدوین و ترسیم شده است.


آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر بیشتر بودن شیوع عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان لرستان نسبت به افراد غیر سالمند است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند افزایش یافته است. شیوع فعالیت فیزیکی ناکافی در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی بیشتر بوده است و با افزایش سن اختلاف شیوع در بین زنان و مردان افزایش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان لرستان دارای بیشترین و یا کمترین شیوع استاندارد شده‌ی سنی فعالیت فیزیکی ناکافی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ نبوده‌اند.

شیوع عامل خطر استعمال دخانیات در سال ۲۰۱۹ در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان لرستان نسبت به زنان غیر سالمند بیشتر و در مردان سالمند نسبت به غیر سالمند کمتر است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند کاهش یافته است. درصد استعمال دخانیات در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی کمتر بوده است و با افزایش سن اختلاف درصد در بین زنان و مردان کاهش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان لرستان دارای بیشترین و یا کمترین درصد استاندارد شده‌ی سنی استعمال دخانیات نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ نبوده‌اند.




شیوع (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۱	هر دو	۲۰/۵	۲۲/۴	۲۶/۲	۲۴/۵	۳۳/۶	۴۲/۵	۴۸/۳
	زنان	۲۵/۱	۲۷/۳	۳۳/۴	۳۰/۰	۴۱/۱	۵۱/۷	۵۸/۵
	مردان	۱۵/۹	۱۷/۵	۱۹/۱	۱۹/۱	۲۶/۱	۳۳/۲	۳۸/۱
کمتر از ۶۰ سال ^۲	هر دو	۱۶/۴	۱۸/۳	۲۱/۹	۲۰/۱	۲۸/۱	۳۷/۴	۴۴/۰
	زنان	۱۹/۶	۲۲/۱	۲۷/۷	۲۳/۳	۳۳/۴	۴۴/۸	۵۲/۵
	مردان	۱۳/۲	۱۴/۵	۱۶/۰	۱۶/۸	۲۲/۸	۳۰/۱	۳۵/۵
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۲۸/۶	۳۰/۶	۳۵/۰	۳۳/۵	۴۴/۶	۵۲/۵	۵۷/۰
	زنان	۳۶/۰	۳۷/۷	۴۴/۸	۴۳/۴	۵۶/۶	۶۵/۷	۷۰/۶
	مردان	۲۱/۲	۲۳/۴	۲۵/۲	۲۳/۷	۳۲/۶	۳۹/۴	۴۳/۴
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۲۲/۴	۲۳/۹	۲۷/۷	۲۳/۵	۳۱/۹	۴۰/۵	۴۵/۹
	زنان	۲۸/۱	۲۹/۲	۳۵/۲	۳۰/۰	۳۸/۷	۴۷/۳	۵۲/۸
	مردان	۱۶/۷	۱۸/۶	۲۰/۲	۱۷/۰	۲۵/۰	۳۳/۷	۳۹/۰
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۲۵/۹	۲۷/۸	۳۱/۹	۲۹/۵	۴۱/۳	۵۱/۰	۵۶/۰
	زنان	۳۲/۶	۳۴/۰	۴۰/۶	۳۷/۶	۵۰/۴	۶۰/۹	۶۶/۳
	مردان	۱۹/۲	۲۱/۵	۲۳/۳	۲۱/۴	۳۲/۳	۴۱/۱	۴۵/۶
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۳۱/۱	۳۳/۳	۳۷/۹	۳۷/۲	۴۹/۷	۵۷/۳	۶۱/۵
	زنان	۳۹/۸	۴۱/۸	۴۹/۰	۴۸/۶	۶۴/۴	۷۳/۷	۷۸/۴
	مردان	۲۲/۴	۲۴/۸	۲۶/۸	۲۵/۹	۳۵/۱	۴۰/۹	۴۴/۶
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۳۴/۹	۳۷/۳	۴۲/۵	۴۳/۸	۵۵/۶	۶۱/۳	۶۴/۶
	زنان	۴۳/۳	۴۵/۹	۵۴/۴	۵۷/۳	۷۳/۱	۸۰/۸	۸۴/۹
	مردان	۲۶/۶	۲۸/۷	۳۰/۶	۳۰/۳	۳۸/۲	۴۱/۷	۴۴/۲

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۳۴/۶	۴۳/۲	۵۳/۷	۶۷/۸	۷۱/۵
مردان	۲۰/۵	۲۴/۴	۳۱/۴	۴۲/۷	۴۵/۸

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹




^۱ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.

^۲ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.




شیوع (%) عامل خطر استعمال دخانیات به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۳	هر دو	۱۵/۷	۱۵/۶	۱۳/۶	۱۳/۴	۱۲/۳	۱۱/۳	۱۰/۵
	زنان	۵/۹	۳/۶	۲/۸	۲/۰	۱/۸	۱/۶	۱/۲
	مردان	۲۵/۵	۲۷/۶	۲۴/۵	۲۴/۷	۲۲/۸	۲۱/۱	۱۹/۷
کمتر از ۶۰ سال ^۴	هر دو	۱۴/۸	۱۵/۴	۱۳/۶	۱۳/۲	۱۲/۲	۱۱/۲	۱۰/۰
	زنان	۳/۹	۲/۲	۱/۷	۱/۳	۱/۰	۰/۹	۰/۸
	مردان	۲۵/۷	۲۸/۵	۲۵/۶	۲۵/۱	۲۳/۵	۲۱/۴	۲۰/۱
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۷/۶	۱۶/۰	۱۳/۶	۱۳/۸	۱۲/۴	۱۱/۷	۱۰/۴
	زنان	۱۰/۰	۶/۳	۵/۰	۳/۶	۳/۳	۲/۹	۲/۰
	مردان	۲۵/۳	۲۵/۸	۲۲/۲	۲۴/۰	۲۱/۴	۲۰/۴	۱۸/۹
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۱۵/۶	۱۴/۱	۱۱/۸	۱۲/۷	۱۱/۸	۱۲/۱	۱۱/۷
	زنان	۷/۴	۳/۷	۲/۴	۱/۴	۰/۶	۰/۲	۰/۰
	مردان	۲۳/۸	۲۴/۶	۲۱/۱	۲۳/۹	۲۳/۱	۲۴/۱	۲۳/۴
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۱۶/۹	۱۵/۵	۱۳/۲	۱۳/۹	۱۳/۰	۱۲/۵	۱۱/۳
	زنان	۹/۰	۵/۴	۴/۱	۲/۳	۱/۸	۱/۴	۰/۴
	مردان	۲۴/۸	۲۵/۶	۲۲/۴	۲۵/۵	۲۴/۲	۲۳/۶	۲۲/۲
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۲۰/۱	۱۸/۵	۱۶/۱	۱۶/۱	۱۴/۱	۱۳/۰	۱۱/۷
	زنان	۱۳/۰	۹/۱	۷/۸	۶/۱	۵/۷	۵/۳	۴/۱
	مردان	۲۷/۲	۲۷/۸	۲۴/۳	۲۶/۱	۲۲/۵	۲۰/۷	۱۹/۲
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۱۷/۹	۱۶/۱	۱۳/۴	۱۲/۵	۱۰/۶	۹/۰	۷/۱
	زنان	۱۰/۴	۷/۰	۵/۸	۴/۶	۵/۳	۴/۸	۳/۶
	مردان	۲۵/۴	۲۵/۱	۲۱/۰	۲۰/۴	۱۵/۹	۱۳/۲	۱۰/۷

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۹/۴	۴/۵	۲/۸	۱/۶	۰/۹
مردان	۲۴/۹	۲۱/۹	۲۱/۶	۱۹/۵	۱۷/۹

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹



^۳ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۴ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.



سیمای سلامت سالمندان

استان مازندران

شیوع عوامل خطر رفتاری



سیمای سلامت سالمندان

استان مازندران

(شیوع عوامل خطر رفتاری)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با شیوع عوامل خطر رفتاری در کل جمعیت (افراد ۱۸ سال و بالاتر)، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (افراد ۱۸ تا ۶۰ سال) ساکن در استان مازندران و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس، نوع و گروه‌های سنی بیان شده است. به‌منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی جهت مقایسه با استان‌های مجاور استان مازندران شامل: استان‌های البرز، گیلان، گلستان، قزوین، سمنان و تهران نیز تدوین و ترسیم شده است.


آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر بیشتر بودن شیوع عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان مازندران نسبت به افراد غیر سالمند است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند افزایش یافته است. شیوع فعالیت فیزیکی ناکافی در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی بیشتر بوده است و با افزایش سن اختلاف شیوع در بین زنان و مردان افزایش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان مازندران دارای کمترین شیوع استاندارد شده‌ی سنی فعالیت فیزیکی ناکافی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.

شیوع عامل خطر استعمال دخانیات در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان مازندران نسبت به افراد غیر سالمند کمتر است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند کاهش یافته است. درصد استعمال دخانیات در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی کمتر بوده است و با افزایش سن اختلاف درصد در بین زنان و مردان کاهش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان مازندران دارای بیشترین و یا کمترین درصد استاندارد شده‌ی سنی استعمال دخانیات نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ نبوده‌اند.




شیوع (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۱	هر دو	۲۳/۳	۲۶/۶	۳۱/۴	۴۱/۱	۴۳/۶	۴۷/۸	۵۲/۶
	زنان	۲۷/۹	۳۱/۴	۳۶/۱	۵۰/۵	۵۲/۷	۵۷/۵	۶۲/۴
	مردان	۱۸/۷	۲۱/۷	۲۶/۶	۳۱/۸	۳۴/۵	۳۸/۲	۴۲/۷
کمتر از ۶۰ سال ^۲	هر دو	۱۹/۲	۲۲/۷	۲۷/۵	۳۸/۲	۴۱/۲	۴۶/۱	۵۱/۳
	زنان	۲۲/۷	۲۶/۶	۳۲/۰	۴۷/۴	۵۰/۰	۵۵/۴	۶۰/۹
	مردان	۱۵/۶	۱۸/۸	۲۲/۹	۲۹/۰	۳۲/۴	۳۶/۸	۴۱/۷
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۳۱/۶	۳۴/۴	۳۹/۲	۴۷/۰	۴۸/۴	۵۱/۳	۵۵/۲
	زنان	۳۸/۲	۴۱/۱	۴۴/۳	۵۶/۶	۵۸/۲	۶۱/۷	۶۵/۵
	مردان	۲۴/۹	۲۷/۶	۳۴/۱	۳۷/۳	۳۸/۶	۴۰/۹	۴۴/۹
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۲۶/۸	۲۹/۶	۳۴/۵	۴۳/۳	۴۵/۳	۴۸/۲	۵۲/۲
	زنان	۳۱/۷	۳۴/۳	۳۷/۱	۵۰/۵	۵۱/۷	۵۴/۹	۵۹/۰
	مردان	۲۲/۰	۲۴/۸	۳۱/۹	۳۶/۲	۳۸/۸	۴۱/۵	۴۵/۴
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۲۹/۲	۳۲/۰	۳۷/۱	۴۵/۱	۴۶/۲	۴۸/۷	۵۲/۹
	زنان	۳۵/۳	۳۷/۸	۴۰/۸	۵۳/۳	۵۴/۲	۵۷/۵	۶۱/۲
	مردان	۲۳/۱	۲۶/۲	۳۳/۳	۳۷/۰	۳۸/۲	۳۹/۹	۴۴/۵
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۳۳/۰	۳۵/۷	۴۰/۳	۴۷/۳	۴۷/۷	۵۰/۱	۵۳/۸
	زنان	۴۰/۶	۴۳/۷	۴۶/۸	۵۸/۶	۵۹/۸	۶۳/۱	۶۶/۷
	مردان	۲۵/۳	۲۷/۸	۳۳/۸	۳۶/۰	۳۵/۵	۳۷/۲	۴۰/۸
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۳۷/۲	۴۰/۱	۴۵/۰	۵۲/۲	۵۴/۶	۵۸/۱	۶۱/۹
	زنان	۴۵/۳	۴۸/۵	۵۲/۶	۶۴/۱	۶۷/۲	۷۱/۱	۷۴/۹
	مردان	۲۹/۱	۳۱/۷	۳۷/۴	۴۰/۲	۴۲/۰	۴۵/۰	۴۸/۹

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۳۷/۲	۴۳/۲	۵۷/۲	۶۴/۵	۶۸/۴
مردان	۲۴/۵	۳۳/۸	۳۸/۹	۴۵/۳	۵۰/۰

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹




^۱ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۲ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.




شیوع (%) عامل خطر استعمال دخانیات به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۳	هر دو	۱۳/۴	۱۳/۶	۱۲/۸	۱۲/۳	۱۱/۸	۱۱/۱	۱۰/۱
	زنان	۲/۹	۲/۴	۱/۵	۱/۵	۱/۷	۱/۸	۱/۶
	مردان	۲۳/۹	۲۴/۸	۲۴/۱	۲۳/۲	۲۱/۹	۲۰/۴	۱۹/۴
کمتر از ۶۰ سال ^۴	هر دو	۱۳/۷	۱۴/۶	۱۳/۴	۱۲/۴	۱۲/۲	۱۱/۷	۱۱/۳
	زنان	۲/۲	۲/۱	۱/۴	۱/۵	۱/۶	۱/۸	۱/۹
	مردان	۲۵/۲	۲۷/۱	۲۵/۵	۲۳/۲	۲۲/۸	۲۱/۷	۲۰/۸
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۲/۶	۱۱/۷	۱۱/۵	۱۲/۲	۱۰/۹	۹/۸	۸/۹
	زنان	۴/۱	۳/۱	۱/۷	۱/۳	۱/۸	۱/۷	۱/۱
	مردان	۲۱/۱	۲۰/۳	۲۱/۲	۲۳/۱	۲۰/۰	۱۷/۹	۱۶/۶
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۱۱/۹	۱۱/۱	۱۱/۱	۱۲/۲	۱۱/۲	۱۰/۵	۱۰/۱
	زنان	۲/۲	۱/۳	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
	مردان	۲۱/۵	۲۰/۹	۲۲/۲	۲۴/۴	۲۲/۴	۲۱/۰	۲۰/۲
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۱۲/۲	۱۱/۵	۱۱/۴	۱۲/۵	۱۱/۲	۱۰/۱	۹/۶
	زنان	۳/۴	۲/۲	۰/۶	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
	مردان	۲۱/۰	۲۰/۷	۲۲/۲	۲۵/۰	۲۲/۳	۲۰/۱	۱۹/۳
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۱۴/۲	۱۳/۱	۱۲/۶	۱۳/۰	۱۰/۹	۹/۲	۷/۸
	زنان	۶/۴	۵/۲	۳/۶	۲/۹	۳/۱	۲/۷	۱/۵
	مردان	۲۲/۰	۲۱/۰	۲۱/۶	۲۳/۲	۱۸/۸	۱۵/۶	۱۴/۰
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۱۲/۲	۱۱/۱	۱۰/۸	۱۱/۲	۱۰/۳	۹/۳	۸/۰
	زنان	۴/۶	۳/۷	۲/۷	۲/۳	۴/۰	۳/۹	۲/۹
	مردان	۱۹/۹	۱۸/۶	۱۸/۹	۲۰/۱	۱۶/۷	۱۴/۷	۱۳/۰

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۳/۸	۱/۴	۱/۴	۰/۹	۰/۴
مردان	۲۱/۱	۲۱/۴	۲۰/۵	۱۷/۳	۱۶/۶

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹



^۳ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۴ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.



سیمای سلامت سالمندان

استان مرکزی

شیوع عوامل خطر رفتاری



سیمای سلامت سالمندان

استان مرکزی

(شیوع عوامل خطر رفتاری)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با شیوع عوامل خطر رفتاری در کل جمعیت (افراد ۱۸ سال و بالاتر)، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (افراد ۱۸ تا ۶۰ سال) ساکن در استان مرکزی و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس، نوع و گروه‌های سنی بیان شده است. به‌منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی جهت مقایسه با استان‌های مجاور استان مرکزی شامل: استان‌های البرز، همدان، اصفهان، لرستان، قزوین، قم و تهران نیز تدوین و ترسیم شده است.


آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر بیشتر بودن شیوع عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در سال ۲۰۱۹ در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان مرکزی نسبت به زنان غیر سالمند و کمتر بودن شیوع در مردان سالمند نسبت به غیر سالمند است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند افزایش یافته است. شیوع فعالیت فیزیکی ناکافی در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی بیشتر بوده است و با افزایش سن اختلاف شیوع در بین زنان و مردان افزایش پیدا می‌کند. مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان مرکزی دارای کمترین شیوع استاندارد شده‌ی سنی فعالیت فیزیکی ناکافی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.

شیوع عامل خطر استعمال دخانیات در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان مرکزی نسبت به افراد غیر سالمند کمتر است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند کاهش یافته است. درصد استعمال دخانیات در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی کمتر بوده است و با افزایش سن اختلاف درصد در بین زنان و مردان کاهش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان مرکزی دارای بیشترین و یا کمترین درصد استاندارد شده‌ی سنی استعمال دخانیات نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ نبوده‌اند.




شیوع (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۱	هر دو	۲۹/۷	۳۴/۹	۳۷/۲	۴۴/۲	۴۶/۵	۴۹/۷	۵۷/۹
	زنان	۳۸/۴	۴۵/۲	۴۷/۱	۵۴/۶	۵۷/۸	۶۱/۶	۶۹/۷
	مردان	۲۱/۱	۲۴/۶	۲۷/۳	۳۳/۷	۳۵/۲	۳۷/۹	۴۶/۱
کمتر از ۶۰ سال ^۲	هر دو	۲۵/۰	۳۰/۸	۳۳/۶	۴۱/۲	۴۴/۷	۴۸/۷	۵۳/۳
	زنان	۳۲/۱	۳۹/۵	۴۲/۳	۴۹/۶	۵۳/۷	۵۸/۰	۶۲/۶
	مردان	۱۷/۹	۲۲/۰	۲۴/۹	۳۲/۹	۳۵/۷	۳۹/۵	۴۳/۹
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۳۹/۲	۴۳/۲	۴۴/۳	۵۰/۱	۵۰/۲	۵۱/۷	۵۴/۴
	زنان	۵۱/۰	۵۶/۶	۵۶/۵	۶۴/۷	۶۶/۲	۶۸/۷	۷۱/۴
	مردان	۲۷/۵	۲۹/۸	۳۲/۰	۳۵/۴	۳۴/۱	۳۴/۷	۳۷/۴
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۳۲/۳	۳۶/۵	۳۸/۱	۴۵/۴	۴۷/۰	۴۸/۹	۵۱/۹
	زنان	۴۲/۰	۴۷/۸	۴۸/۰	۵۷/۵	۵۸/۹	۶۱/۵	۶۴/۷
	مردان	۲۲/۷	۲۵/۲	۲۸/۲	۳۳/۳	۳۵/۰	۳۶/۲	۳۹/۱
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۳۶/۹	۴۰/۹	۴۲/۱	۴۸/۵	۴۹/۲	۵۰/۸	۵۳/۵
	زنان	۴۸/۱	۵۳/۷	۵۳/۵	۶۲/۰	۶۳/۹	۶۷/۰	۶۹/۹
	مردان	۲۵/۷	۲۸/۰	۳۰/۸	۳۵/۰	۳۴/۶	۳۴/۶	۳۷/۱
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۴۰/۷	۴۴/۵	۴۵/۴	۵۰/۴	۴۹/۰	۵۰/۱	۵۲/۷
	زنان	۵۳/۳	۵۸/۶	۵۸/۰	۶۵/۱	۶۵/۲	۶۶/۹	۶۹/۳
	مردان	۲۸/۰	۳۰/۴	۳۲/۷	۳۵/۷	۳۲/۸	۳۳/۲	۳۶/۱
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۴۷/۱	۵۰/۹	۵۱/۵	۵۵/۹	۵۵/۴	۵۷/۰	۵۹/۵
	زنان	۶۰/۶	۶۶/۳	۶۶/۶	۷۴/۳	۷۶/۶	۷۹/۴	۸۱/۹
	مردان	۳۳/۵	۳۵/۴	۳۶/۵	۳۷/۴	۳۴/۱	۳۴/۶	۳۷/۱

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۴۹/۶	۵۵/۳	۶۵/۲	۷۰/۷	۷۳/۶
مردان	۲۶/۸	۳۱/۵	۳۴/۴	۳۷/۷	۴۱/۱

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹




^۱ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۲ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.




شیوع (%) عامل خطر استعمال دخانیات به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۳	هر دو	۱۷/۴	۱۷/۳	۱۵/۵	۱۵/۰	۱۴/۳	۱۳/۷	۱۲/۹
	زنان	۴/۹	۳/۷	۲/۸	۲/۹	۲/۲	۱/۹	۱/۴
	مردان	۲۹/۸	۳۰/۹	۲۸/۲	۲۷/۲	۲۶/۴	۲۵/۵	۲۴/۵
کمتر از ۶۰ سال ^۴	هر دو	۱۶/۹	۱۶/۹	۱۵/۹	۱۵/۸	۱۵/۳	۱۴/۸	۱۴/۳
	زنان	۳/۵	۲/۷	۲/۲	۲/۷	۲/۲	۲/۲	۲/۰
	مردان	۳۰/۳	۳۱/۱	۲۹/۶	۲۹/۰	۲۸/۳	۲۷/۴	۲۶/۶
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۸/۳	۱۸/۰	۱۴/۶	۱۳/۴	۱۲/۴	۱۱/۴	۱۰/۱
	زنان	۷/۸	۵/۷	۳/۹	۳/۴	۲/۲	۱/۲	۰/۰
	مردان	۲۸/۸	۳۰/۴	۲۵/۴	۲۳/۵	۲۲/۶	۲۱/۵	۲۰/۲
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۱۶/۶	۱۶/۹	۱۴/۵	۱۳/۱	۱۲/۸	۱۲/۷	۱۲/۱
	زنان	۴/۸	۲/۹	۱/۴	۱/۰	۰/۵	۰/۴	۰/۰
	مردان	۲۸/۳	۳۱/۰	۲۷/۶	۲۵/۳	۲۵/۱	۲۵/۰	۲۴/۳
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۱۷/۸	۱۷/۳	۱۳/۸	۱۲/۸	۱۲/۱	۱۱/۲	۱۰/۳
	زنان	۶/۹	۴/۸	۳/۰	۲/۶	۱/۶	۰/۷	۰/۰
	مردان	۲۸/۶	۲۹/۹	۲۴/۶	۲۲/۹	۲۲/۵	۲۱/۸	۲۰/۵
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۱۹/۸	۱۹/۳	۱۵/۵	۱۴/۴	۱۲/۸	۱۱/۳	۹/۶
	زنان	۱۰/۰	۷/۷	۵/۵	۵/۰	۳/۴	۲/۰	۰/۱
	مردان	۲۹/۶	۳۱/۰	۲۵/۶	۲۳/۸	۲۲/۲	۲۰/۶	۱۹/۱
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۱۹/۱	۱۸/۵	۱۴/۷	۱۳/۴	۱۱/۹	۱۰/۲	۸/۴
	زنان	۹/۴	۷/۳	۵/۵	۵/۰	۳/۴	۱/۸	۰/۰
	مردان	۲۸/۸	۲۹/۶	۲۳/۸	۲۱/۹	۲۰/۵	۱۸/۶	۱۶/۸

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۷/۳	۳/۴	۱/۹	۰/۰	۰/۰
مردان	۲۸/۷	۲۵/۶	۲۳/۰	۲۰/۸	۱۹/۲

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹



^۳ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۴ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.



سیمای سلامت سالمندان

استان هرمزگان

شیوع عوامل خطر رفتاری



سیمای سلامت سالمندان

استان هرمزگان

(شیوع عوامل خطر رفتاری)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با شیوع عوامل خطر رفتاری در کل جمعیت (افراد ۱۸ سال و بالاتر)، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (افراد ۱۸ تا ۶۰ سال) ساکن در استان هرمزگان و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس، نوع و گروه‌های سنی بیان شده است. به‌منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی جهت مقایسه با استان‌های مجاور استان هرمزگان شامل: استان‌های بوشهر، فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان نیز تدوین و ترسیم شده است.


آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر بیشتر بودن شیوع عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در سال ۲۰۱۹ در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان هرمزگان نسبت به زنان غیر سالمند و کمتر بودن در مردان سالمند نسبت به غیر سالمند است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند افزایش یافته است. شیوع فعالیت فیزیکی ناکافی در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی بیشتر بوده است و با افزایش سن (به جز گروه سنی ۷۵ سال و بالاتر) اختلاف شیوع در بین زنان و مردان افزایش پیدا می‌کند. زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان هرمزگان دارای بیشترین شیوع استاندارد شده‌ی سنی فعالیت فیزیکی ناکافی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.

شیوع عامل خطر استعمال دخانیات در سال ۲۰۱۹ در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان هرمزگان نسبت به زنان غیر سالمند کمتر و در مردان سالمند نسبت به غیر سالمند بیشتر است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند کاهش یافته است. درصد استعمال دخانیات در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی کمتر بوده است و با افزایش سن اختلاف درصد در بین زنان و مردان کاهش پیدا می‌کند. مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان هرمزگان دارای بیشترین درصد استاندارد شده‌ی سنی استعمال دخانیات نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.




شیوع (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۱	هر دو	۴۱/۴	۴۸/۷	۵۵/۱	۵۹/۶	۶۳/۰	۶۴/۶	۶۸/۲
	زنان	۴۷/۶	۵۵/۴	۶۳/۷	۶۸/۸	۷۲/۳	۷۳/۶	۷۶/۳
	مردان	۳۵/۲	۴۱/۹	۴۶/۶	۵۰/۳	۵۳/۶	۵۵/۶	۶۰/۰
کمتر از ۶۰ سال ^۲	هر دو	۳۵/۹	۴۳/۷	۵۰/۵	۵۵/۳	۶۰/۶	۶۳/۱	۶۷/۱
	زنان	۴۱/۷	۵۰/۱	۵۸/۶	۶۳/۲	۶۷/۹	۶۹/۳	۷۲/۳
	مردان	۳۰/۱	۳۷/۲	۴۲/۴	۴۷/۳	۵۳/۲	۵۶/۹	۶۱/۸
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۵۲/۴	۵۸/۷	۶۴/۴	۶۸/۲	۶۷/۸	۶۷/۶	۷۰/۴
	زنان	۵۹/۳	۶۵/۹	۷۳/۸	۸۰/۰	۸۱/۰	۸۲/۱	۸۴/۴
	مردان	۴۵/۵	۵۱/۴	۵۵/۰	۵۶/۵	۵۴/۵	۵۳/۲	۵۶/۵
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۴۶/۹	۵۳/۵	۶۰/۰	۶۵/۰	۶۵/۹	۶۳/۵	۶۵/۲
	زنان	۵۲/۷	۵۹/۶	۶۸/۰	۷۴/۹	۷۵/۵	۷۴/۰	۷۵/۶
	مردان	۴۱/۱	۴۷/۴	۵۱/۹	۵۵/۱	۵۶/۴	۵۳/۰	۵۴/۸
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۵۰/۹	۵۷/۶	۶۳/۷	۶۷/۹	۶۶/۶	۶۵/۰	۶۷/۷
	زنان	۵۷/۷	۶۴/۶	۷۲/۵	۷۹/۱	۸۰/۲	۸۱/۴	۸۴/۰
	مردان	۴۴/۲	۵۰/۵	۵۴/۸	۵۶/۸	۵۳/۰	۴۸/۷	۵۱/۵
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۵۴/۲	۶۰/۴	۶۵/۸	۶۸/۸	۶۶/۶	۶۷/۲	۷۰/۵
	زنان	۶۱/۳	۶۷/۷	۷۵/۳	۸۱/۲	۸۱/۹	۸۳/۷	۸۶/۴
	مردان	۴۷/۰	۵۳/۲	۵۶/۳	۵۶/۵	۵۱/۳	۵۰/۶	۵۴/۶
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۵۷/۵	۶۳/۲	۶۸/۰	۷۱/۲	۷۲/۰	۷۴/۸	۷۸/۳
	زنان	۶۵/۴	۷۱/۹	۷۹/۴	۸۵/۰	۸۶/۴	۸۹/۱	۹۱/۴
	مردان	۴۹/۶	۵۴/۵	۵۶/۷	۵۷/۴	۵۷/۵	۶۰/۵	۶۵/۱

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۵۸/۳	۷۲/۹	۸۰/۳	۸۳/۱	۸۶/۰
مردان	۴۴/۸	۵۴/۵	۵۵/۰	۵۶/۴	۶۰/۸

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹




^۱ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۲ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.




شیوع (%) عامل خطر استعمال دخانیات به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۳	هر دو	۱۱/۵	۱۱/۴	۱۰/۸	۱۱/۰	۱۱/۱	۱۰/۸	۱۰/۸
	زنان	۳/۶	۱/۸	۱/۱	۲/۱	۲/۱	۲/۰	۲/۳
	مردان	۱۹/۳	۲۰/۹	۲۰/۵	۱۹/۸	۲۰/۱	۱۹/۵	۱۹/۳
کمتر از ۶۰ سال ^۴	هر دو	۱۱/۳	۱۲/۱	۱۱/۷	۱۱/۹	۱۱/۷	۱۰/۷	۱۰/۷
	زنان	۲/۷	۱/۴	۰/۸	۲/۳	۲/۲	۱/۹	۲/۳
	مردان	۱۹/۹	۲۲/۸	۲۲/۵	۲۱/۴	۲۱/۳	۱۹/۵	۱۹/۱
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۱/۸	۹/۹	۹/۱	۹/۲	۹/۹	۱۰/۸	۱۱/۰
	زنان	۵/۴	۲/۶	۱/۷	۱/۸	۱/۹	۲/۲	۲/۱
	مردان	۱۸/۱	۱۷/۳	۱۶/۵	۱۶/۵	۱۷/۹	۱۹/۴	۱۹/۹
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۱۰/۹	۹/۲	۸/۳	۸/۶	۹/۰	۹/۹	۱۰/۳
	زنان	۳/۷	۱/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۱	۰/۲
	مردان	۱۸/۱	۱۷/۴	۱۶/۶	۱۷/۱	۱۸/۰	۱۹/۷	۲۰/۴
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۱۱/۷	۱۰/۱	۹/۵	۹/۸	۱۱/۰	۱۲/۴	۱۳/۰
	زنان	۵/۳	۲/۴	۱/۶	۲/۰	۱/۹	۲/۶	۲/۶
	مردان	۱۸/۲	۱۷/۷	۱۷/۳	۱۷/۶	۲۰/۰	۲۲/۳	۲۳/۴
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۱۳/۵	۱۱/۷	۱۰/۹	۱۱/۱	۱۱/۹	۱۲/۹	۱۳/۳
	زنان	۷/۳	۴/۳	۳/۴	۳/۵	۳/۶	۴/۰	۴/۱
	مردان	۱۹/۸	۱۹/۱	۱۸/۴	۱۸/۶	۲۰/۲	۲۱/۸	۲۲/۴
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۱۰/۹	۸/۷	۷/۶	۷/۳	۷/۶	۷/۸	۷/۵
	زنان	۵/۴	۲/۵	۱/۶	۱/۸	۱/۹	۱/۹	۱/۷
	مردان	۱۶/۵	۱۴/۹	۱۳/۵	۱۲/۹	۱۳/۴	۱۳/۷	۱۳/۳

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۵/۱	۱/۳	۱/۵	۱/۸	۱/۸
مردان	۱۸/۰	۱۶/۳	۱۷/۷	۱۹/۸	۱۹/۸

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹



^۳ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۴ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.



سیمای سلامت سالمندان

استان همدان

شیوع عوامل خطر رفتاری



سیمای سلامت سالمندان

استان همدان

(شیوع عوامل خطر رفتاری)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با شیوع عوامل خطر رفتاری در کل جمعیت (افراد ۱۸ سال و بالاتر)، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (افراد ۱۸ تا ۶۰ سال) ساکن در استان همدان و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس، نوع و گروه‌های سنی بیان شده است. به‌منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی جهت مقایسه با استان‌های مجاور استان همدان شامل: استان‌های کرمانشاه، کردستان، لرستان، مرکزی، قزوین و زنجان نیز تدوین و ترسیم شده است.


آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر بیشتر بودن شیوع عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان همدان نسبت به افراد غیر سالمند است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند افزایش یافته است. شیوع فعالیت فیزیکی ناکافی در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی بیشتر بوده است و با افزایش سن (به جز گروه سنی ۷۵ سال و بالاتر) اختلاف شیوع در بین زنان و مردان افزایش پیدا می‌کند. زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان همدان دارای بیشترین شیوع استاندارد شده‌ی سنی فعالیت فیزیکی ناکافی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.

شیوع عامل خطر استعمال دخانیات در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان همدان نسبت به افراد غیر سالمند کمتر است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند کاهش یافته است. درصد استعمال دخانیات در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی کمتر بوده است و با افزایش سن اختلاف درصد در بین زنان و مردان کاهش پیدا می‌کند. زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان همدان دارای بیشترین و یا کمترین درصد استاندارد شده‌ی سنی استعمال دخانیات نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ نبوده‌اند.




شیوع (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۱	هر دو	۳۱/۲	۳۳/۴	۳۷/۹	۴۱/۷	۴۶/۵	۵۰/۸	۵۵/۱
	زنان	۴۰/۳	۴۲/۶	۴۷/۴	۵۱/۸	۵۶/۹	۶۱/۵	۶۵/۸
	مردان	۲۲/۲	۲۴/۲	۲۸/۴	۳۱/۶	۳۶/۰	۴۰/۲	۴۴/۵
کمتر از ۶۰ سال ^۲	هر دو	۲۶/۸	۲۹/۲	۳۳/۴	۳۸/۳	۴۲/۸	۴۷/۳	۵۲/۰
	زنان	۳۴/۹	۳۷/۷	۴۲/۱	۴۸/۳	۵۲/۸	۵۷/۳	۶۲/۱
	مردان	۱۸/۷	۲۰/۸	۲۴/۸	۲۸/۲	۳۲/۷	۳۷/۲	۴۲/۰
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۴۰/۲	۴۱/۷	۴۶/۹	۴۸/۵	۵۳/۸	۵۷/۹	۶۱/۳
	زنان	۵۱/۰	۵۲/۵	۵۸/۱	۵۸/۶	۶۴/۹	۶۹/۷	۷۳/۲
	مردان	۲۹/۳	۳۰/۹	۳۵/۸	۳۸/۵	۴۲/۸	۴۶/۱	۴۹/۴
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۳۳/۲	۳۴/۸	۴۰/۰	۴۱/۰	۴۵/۳	۴۹/۴	۵۳/۲
	زنان	۴۲/۵	۴۴/۰	۴۹/۶	۴۹/۳	۵۵/۱	۶۰/۹	۶۵/۲
	مردان	۲۳/۹	۲۵/۷	۳۰/۴	۳۲/۷	۳۵/۵	۳۷/۹	۴۱/۳
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۳۷/۵	۳۹/۲	۴۴/۴	۴۵/۵	۵۰/۰	۵۴/۳	۵۸/۰
	زنان	۴۸/۰	۴۹/۷	۵۵/۱	۵۵/۳	۶۱/۲	۶۶/۴	۷۰/۲
	مردان	۲۷/۱	۲۸/۷	۳۳/۶	۳۵/۷	۳۸/۹	۴۲/۱	۴۵/۸
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۴۲/۲	۴۳/۵	۴۸/۱	۴۹/۲	۵۴/۰	۵۷/۵	۶۰/۶
	زنان	۵۴/۴	۵۵/۵	۶۰/۵	۶۰/۵	۶۶/۰	۶۹/۸	۷۲/۸
	مردان	۳۰/۱	۳۱/۵	۳۵/۷	۳۷/۹	۴۱/۹	۴۵/۳	۴۸/۵
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۴۷/۶	۴۹/۵	۵۵/۱	۵۸/۴	۶۶/۱	۷۰/۴	۷۳/۳
	زنان	۵۹/۰	۶۰/۹	۶۶/۹	۶۹/۲	۷۷/۴	۸۱/۷	۸۴/۴
	مردان	۳۶/۳	۳۸/۰	۴۳/۳	۴۷/۶	۵۴/۷	۵۹/۰	۶۲/۲

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۴۹/۶	۵۶/۸	۶۳/۵	۷۲/۱	۷۵/۰
مردان	۲۸/۵	۳۵/۰	۴۱/۸	۴۸/۴	۵۲/۰

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹




^۱ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۲ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.




شیوع (%) عامل خطر استعمال دخانیات به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۳	هر دو	۱۷/۷	۱۹/۰	۱۶/۹	۱۵/۲	۱۴/۸	۱۳/۷	۱۲/۱
	زنان	۳/۳	۳/۶	۲/۴	۲/۱	۱/۹	۱/۸	۱/۴
	مردان	۳۲/۰	۳۴/۵	۳۱/۴	۲۸/۳	۲۷/۷	۲۵/۷	۲۳/۳
کمتر از ۶۰ سال ^۴	هر دو	۱۶/۹	۱۸/۸	۱۷/۲	۱۶/۵	۱۵/۶	۱۴/۳	۱۳/۵
	زنان	۲/۰	۲/۶	۱/۷	۱/۶	۱/۴	۱/۳	۱/۲
	مردان	۳۱/۷	۳۵/۱	۳۲/۷	۳۱/۴	۲۹/۹	۲۷/۲	۲۵/۸
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۹/۳	۱۹/۳	۱۶/۳	۱۲/۷	۱۳/۱	۱۲/۷	۱۱/۵
	زنان	۵/۹	۵/۵	۳/۷	۳/۲	۲/۹	۲/۷	۱/۷
	مردان	۳۲/۶	۳۳/۲	۲۸/۹	۲۲/۲	۲۳/۴	۲۲/۷	۲۱/۳
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۱۷/۶	۱۸/۱	۱۵/۳	۱۱/۶	۱۱/۶	۱۰/۹	۱۰/۲
	زنان	۳/۳	۲/۹	۱/۱	۰/۲	۰/۰	۰/۰	۰/۰
	مردان	۳۱/۸	۳۳/۳	۲۹/۶	۲۳/۱	۲۳/۳	۲۱/۷	۲۰/۴
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۱۸/۷	۱۸/۹	۱۵/۸	۱۲/۱	۱۲/۱	۱۱/۸	۱۰/۸
	زنان	۵/۲	۴/۸	۳/۰	۲/۶	۱/۹	۱/۸	۰/۷
	مردان	۳۲/۲	۳۲/۹	۲۸/۷	۲۱/۶	۲۲/۲	۲۱/۹	۲۰/۹
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۲۱/۲	۲۱/۰	۱۷/۶	۱۳/۸	۱۴/۳	۱۴/۰	۱۲/۵
	زنان	۸/۵	۷/۹	۵/۹	۵/۱	۴/۴	۳/۹	۲/۴
	مردان	۳۳/۹	۳۴/۱	۲۹/۳	۲۲/۵	۲۴/۳	۲۴/۱	۲۲/۶
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۱۹/۶	۱۹/۵	۱۶/۴	۱۳/۲	۱۴/۵	۱۴/۰	۱۲/۵
	زنان	۶/۷	۶/۴	۴/۷	۴/۸	۵/۱	۵/۰	۳/۶
	مردان	۳۲/۵	۳۲/۵	۲۸/۰	۲۱/۷	۲۳/۹	۲۳/۱	۲۱/۵

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۵/۴	۳/۲	۲/۴	۱/۴	۰/۵
مردان	۳۲/۴	۲۸/۹	۲۳/۳	۲۱/۱	۱۹/۶

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹



^۳ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۴ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.



سیمای سلامت سالمندان

استان یزد

شیوع عوامل خطر رفتاری



سیمای سلامت سالمندان

استان یزد

(شیوع عوامل خطر رفتاری)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با شیوع عوامل خطر رفتاری در کل جمعیت (افراد ۱۸ سال و بالاتر)، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (افراد ۱۸ تا ۶۰ سال) ساکن در استان یزد و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس، نوع و گروه‌های سنی بیان شده است. به‌منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی جهت مقایسه با استان‌های مجاور استان یزد شامل: استان‌های فارس، اصفهان، کرمان و خراسان جنوبی نیز تدوین و ترسیم شده است.


آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر کمتر بودن شیوع عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در سال ۲۰۱۹ در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان یزد نسبت به زنان غیر سالمند و بیشتر بودن شیوع در مردان سالمند نسبت به غیر سالمند است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند افزایش یافته است. شیوع فعالیت فیزیکی ناکافی در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی بیشتر بوده است و با افزایش سن اختلاف شیوع در بین زنان و مردان افزایش پیدا می‌کند. مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان یزد دارای بیشترین شیوع استاندارد شده‌ی سنی فعالیت فیزیکی ناکافی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.

شیوع عامل خطر استعمال دخانیات در سال ۲۰۱۹ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن استان یزد نسبت به افراد غیر سالمند کمتر است. همچنین شیوع این عامل خطر در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۰۵ در زنان و مردان سالمند کاهش یافته است. درصد استعمال دخانیات در زنان در مقایسه با مردان در تمامی گروه‌های سنی کمتر بوده است و با افزایش سن اختلاف درصد در بین زنان و مردان کاهش پیدا می‌کند. مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر ساکن در استان یزد دارای کمترین درصد استاندارد شده‌ی سنی استعمال دخانیات نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.




شیوع (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۰۵	۲۰۰۷	۲۰۰۹	۲۰۱۱	۲۰۱۳	۲۰۱۵	۲۰۱۷
همه سنین ^۱	هر دو	۴۴/۲	۴۹/۵	۵۲/۳	۵۴/۷	۶۰/۳	۶۴/۵	۶۸/۷
	زنان	۵۲/۲	۵۸/۰	۵۹/۹	۶۳/۹	۶۷/۸	۷۰/۸	۷۴/۲
	مردان	۳۶/۲	۴۱/۰	۴۴/۸	۴۵/۴	۵۲/۸	۵۸/۲	۶۳/۲
کمتر از ۶۰ سال ^۲	هر دو	۳۹/۲	۴۵/۱	۴۸/۴	۵۲/۲	۵۸/۱	۶۲/۷	۶۷/۴
	زنان	۴۵/۹	۵۲/۳	۵۵/۵	۶۰/۸	۶۶/۰	۷۰/۱	۷۴/۲
	مردان	۳۲/۴	۳۷/۹	۴۱/۴	۴۳/۶	۵۰/۱	۵۵/۴	۶۰/۶
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۵۴/۳	۵۸/۲	۶۰/۲	۵۹/۶	۶۴/۷	۶۸/۱	۷۱/۳
	زنان	۶۴/۷	۶۹/۲	۶۸/۷	۷۰/۱	۷۱/۳	۷۲/۲	۷۴/۳
	مردان	۴۳/۹	۴۷/۲	۵۱/۷	۴۹/۱	۵۸/۰	۶۳/۹	۶۸/۳
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۴۶/۶	۵۱/۲	۵۴/۰	۵۳/۷	۵۹/۳	۶۲/۷	۶۶/۴
	زنان	۵۵/۹	۶۱/۰	۶۱/۲	۶۳/۶	۶۶/۳	۶۶/۷	۶۸/۹
	مردان	۳۷/۴	۴۱/۴	۴۶/۹	۴۳/۷	۵۲/۴	۵۸/۶	۶۴/۰
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۵۱/۲	۵۵/۴	۵۷/۸	۵۷/۳	۶۳/۱	۶۷/۴	۷۱/۱
	زنان	۶۰/۸	۶۵/۷	۶۵/۳	۶۷/۳	۶۹/۳	۷۰/۷	۷۳/۲
	مردان	۴۱/۷	۴۵/۲	۵۰/۲	۴۷/۳	۵۶/۹	۶۴/۰	۶۹/۰
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۵۶/۵	۵۹/۸	۶۱/۳	۶۰/۲	۶۴/۴	۶۷/۴	۷۰/۲
	زنان	۶۷/۹	۷۲/۰	۷۱/۰	۷۱/۴	۷۰/۶	۷۱/۰	۷۲/۷
	مردان	۴۵/۱	۴۷/۷	۵۱/۶	۴۸/۹	۵۸/۲	۶۳/۸	۶۷/۷
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۶۲/۸	۶۶/۳	۶۷/۶	۶۷/۲	۷۱/۸	۷۴/۸	۷۷/۴
	زنان	۷۴/۱	۷۸/۲	۷۷/۲	۷۸/۰	۷۹/۰	۸۰/۵	۸۲/۲
	مردان	۵۱/۴	۵۴/۳	۵۸/۰	۵۶/۴	۶۴/۷	۶۹/۱	۷۲/۶

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۶۳/۲	۶۷/۵	۷۰/۶	۷۳/۶	۷۵/۹
مردان	۴۲/۹	۵۱/۰	۵۷/۳	۶۷/۸	۷۱/۹

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹




^۱ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۲ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.




شیوع (%) عامل خطر استعمال دخانیات به تفکیک گروه سنی و جنسیت در استان								
گروه سنی	جنسیت	سال						
		۲۰۱۹	۲۰۱۷	۲۰۱۵	۲۰۱۳	۲۰۱۱	۲۰۰۹	۲۰۰۷
همه سنین ^۳	هر دو	۸/۰	۸/۲	۸/۷	۹/۷	۱۰/۷	۱۰/۶	۱۰/۵
	زنان	۰/۷	۰/۷	۰/۸	۰/۹	۱/۱	۰/۸	۱/۲
	مردان	۱۵/۲	۱۵/۷	۱۶/۶	۱۸/۵	۲۰/۳	۲۰/۴	۱۹/۷
کمتر از ۶۰ سال ^۴	هر دو	۹/۶	۹/۶	۱۰/۰	۱۰/۷	۱۱/۴	۱۱/۰	۱۰/۴
	زنان	۱/۱	۰/۹	۰/۸	۰/۷	۰/۷	۰/۳	۰/۳
	مردان	۱۸/۱	۱۸/۳	۱۹/۲	۲۰/۸	۲۲/۱	۲۱/۸	۲۰/۴
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۴/۸	۵/۳	۶/۲	۷/۶	۹/۱	۹/۸	۱۰/۲
	زنان	۰/۰	۰/۲	۰/۸	۱/۴	۱/۸	۱/۸	۲/۳
	مردان	۹/۵	۱۰/۳	۱۱/۵	۱۳/۸	۱۶/۵	۱۷/۸	۱۸/۲
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۸/۰	۸/۰	۸/۳	۹/۳	۹/۸	۱۰/۲	۹/۴
	زنان	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰
	مردان	۱۵/۹	۱۶/۰	۱۶/۷	۱۸/۶	۱۹/۶	۲۰/۴	۱۸/۸
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۶/۳	۶/۴	۶/۸	۷/۹	۸/۹	۹/۰	۹/۳
	زنان	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۱/۴
	مردان	۱۲/۶	۱۲/۹	۱۳/۷	۱۵/۹	۱۷/۸	۱۸/۱	۱۸/۳
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۳/۳	۴/۱	۵/۶	۷/۴	۹/۵	۱۰/۵	۱۱/۶
	زنان	۰/۰	۰/۳	۱/۶	۲/۵	۳/۳	۳/۶	۴/۶
	مردان	۶/۵	۷/۸	۹/۶	۱۲/۲	۱۵/۷	۱۷/۳	۱۸/۶
۷۵ سال و بالاتر	هر دو	۱/۶	۲/۶	۳/۹	۵/۸	۸/۳	۹/۶	۱۰/۶
	زنان	۰/۰	۰/۷	۱/۸	۳/۰	۳/۷	۳/۷	۴/۳
	مردان	۳/۱	۴/۵	۶/۰	۸/۷	۱۳/۰	۱۵/۴	۱۶/۹

روند زمانی شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان



جنسیت	۲۰۰۵	۲۰۰۹	۲۰۱۳	۲۰۱۷	۲۰۱۹
زنان	۲/۵	۱/۴	۱/۱	۰/۲	۰/۰
مردان	۱۸/۱	۱۸/۲	۱۴/۶	۱۱/۳	۱۰/۷

مقایسه شیوع استاندارد شده سنی (%) عامل خطر استعمال دخانیات در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان با استان‌های همسایه در سال ۲۰۱۹



^۳ همه سنین در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ سال و بالاتر اشاره دارد.
^۴ کمتر از ۶۰ سال در این گزارش برگ به گروه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال اشاره دارد.





Ministry of Health & Medical Education
Population, Family & School Health Office
Elderly Health Department

Health Profile of Older Adults

Prevalence Of Behavioral Risk Factors

Farshad Farzadfar
Sahar Saeedi Moghaddam
Mohsen Shati
Seyede Salehe Mortazavi

Publisher: Andisheh Mandegar
First edition, 2022
ISBN: 978-600-6782-00-3
Printed in: Tehran, Iran

Health Profile of Older Adults

Prevalence of Behavioral Risk Factors



مرکز تحقیقات بیماری‌های غیر واگیر
پژوهشگاه علوم و فناوری‌های سلامت