



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت بهداشت
دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس
اداره سلامت سالمندان

سیمای سلامت سالمندان

(جلد ۶)

میزان مرگ و شیوع بیماری ها



الرشيد الرحيم
الرحمن الرحيم

عنوان و نام پدیدآور/ پدیدآورندگان: میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها/ نویسندگان محسن شتی... [و دیگران]. مشخصات نشر: قم: اندیشه ماندگار، ۱۴۰۱. مشخصات ظاهری: ۱۳۴ ص.؛ جدول، نمودار؛ ۲۲×۲۹ س.م. فروست: سیمای سلامت سالمندان؛ [ج. ۴]. شابک دوره: ۷-۴۴-۶۷۸۲-۶۰۰-۹۷۸؛ شابک: ۴-۵۴۴۷-۶۲۲-۹۷۸

وضعیت فهرست نویسی: فیبا

یادداشت: نویسندگان فرشاد فرزادفر، سحر سعیدی مقدم، محسن شتی، سیده صالحه مرتضوی.

موضوع: سالمندان -- سلامتی و بهداشت -- ایران -- آمار Older people -- Health and hygiene -- Iran -- Statistics

مرگ و میر -- ایران -- آمار Mortality -- Iran -- Statistics

شناسه افزوده: شتی، محسن، ۱۳۵۰-

شناسه افزوده: سیمای سلامت سالمندان؛ [ج. ۴].

رده بندی کنگره: RA۵۶۴/۸

رده بندی دیویی: ۶۱۳/۰۴۳۸

شماره کتابشناسی ملی: ۹۰۷۳۳۹۲

اطلاعات رکورد کتابشناسی: فیبا

سیمای سلامت سالمندان

میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها

نویسندگان: فرشاد فرزاد فر، سحر سعیدی مقدم، محسن شتی، سیده صالحه مرتضوی

ناشر: اندیشه ماندگار

تیراژ: ۱۰۰ نسخه

نوبت چاپ: اول - ۱۴۰۱

شابک: ۴-۵۴۴۷-۶۲۲-۹۷۸

شابک دوره: ۷-۴۴-۶۷۸۲-۶۰۰-۹۷۸

مجموعه سیمای سلامت سالمندان ایران، به سفارش اداره سلامت سالمندان، دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسط مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از پیمایش‌های انجام شده در سالیان گذشته تهیه شده و با حمایت صندوق جمعیت سازمان ملل متحد منتشر می‌گردد. ضمن تقدیر از صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بابت این حمایت، اعلام می‌دارد کلیه حقوق مادی و معنوی این مجموعه متعلق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بدیهی است استفاده از محتوا، بدون دخل و تصرف و تغییر در شاخص‌ها و به شرط ذکر منبع بلامانع است.

غیر قابل فروش



انتشارات اندیشه ماندگار

قم ■ خیابان صفائیه ■ انتهای کوی بیگدلی (شماره ۲۸)

نیش کوی شهید گلدوست ■ پلاک ۲۸۴

تلفن: ۰۲۵-۳۷۷۴۲۱۴۲-۳۷۷۴۲۱۴۲-۳۷۷۴۲۱۴۲ ■ همراه: ۰۹۱۲۲۵۲۶۲۱۲

۵	اسامی نویسندگان
۷	مقدمه
۹	راهنمای سیمای سلامت سالمندان در جمهوری اسلامی ایران
۱۳	کشور جمهوری اسلامی ایران
۲۱	آذربایجان شرقی
۲۹	آذربایجان غربی
۳۷	اردبیل
۴۵	اصفهان
۵۳	البرز
۶۱	ایلام
۶۹	بوشهر
۷۷	تهران
۸۵	چهارمحال و بختیاری
۹۳	خراسان جنوبی
۱۰۱	خراسان رضوی
۱۰۹	خراسان شمالی
۱۱۷	خوزستان
۱۲۵	زنجان
۱۳۳	سمنان
۱۴۱	سیستان و بلوچستان
۱۴۹	فارس
۱۵۷	قزوین
۱۶۵	قم
۱۷۳	کردستان

۱۸۱	کرمان
۱۸۹	کرمانشاه
۱۹۷	کهگیلویه و بویر احمد
۲۰۵	گلستان
۲۱۳	گیلان
۲۲۱	لرستان
۲۲۹	مازندران
۲۳۷	مرکزی
۲۴۵	هرمزگان
۲۵۳	همدان
۲۶۱	یزد

اسامی نویسندگان اصلی:

دکتر فرشاد فرزاد فر

سحر سعیدی مقدم

دکتر محسن شتی

دکتر سیده صالحه مرتضوی

زیر نظر:

دکتر سید حامد برکاتی - متخصص کودکان و نوزادان، دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
دکتر محمدرضا صائینی - پزشک عمومی، MPH مدیریت بیماری ها، دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

همکاران آمار به ترتیب حروف الفبا:

فروغ پژوهیان

مهتاب روحی فرد خلیل آباد

دکتر علی شیدایی

دکتر عرفان قاسمی

علی قنبری

دکتر کیمیا گوهری

مسعود مسینایی

دکتر پریناز مهدی پور

معین یوسفی

همکاران علمی به ترتیب حروف الفبا:

دکتر علیرضا احمدوند

دکتر سینا آزاد نجف آباد

زهرا اصفهانی

هانیه باقری

دکتر اشکان پورابهری

دکتر نیلوفر پیکری

دکتر شیرین جلالی نیا

دکتر شادی رحیم زاده

دکتر شهاب الدین رضایی

دکتر نازیلا رضایی

دکتر نگار رضایی

..... دکتر صدف سپانلو قاجاریه
 هانیه سهرابی
 یگانه شریف نژاد تهرانی
 دکتر زهرا شکری ورنیاب لنگرودی
 پرنیان شویری
 دکتر محسن عباسی کنگوری
 دکتر علی غلامی
 یوسف فرضی
 دکتر سید هادی قمری
 دکتر سوگل کولجی
 رزا حق شناس لاکانی
 زینب شیرزاد مقدم
 دکتر شراره نیاکان کلهری

اسامی مشاورین به ترتیب حروف الفبا:

..... دکتر آبتین حیدرزاده
 دکتر بهرام دلاور
 دکتر رضا فدای وطن
 دکتر احمد دلبری
 دکتر شیما رئیسی
 دکتر فرشاد شریفی

همکاران (به ترتیب حروف الفبا) :

..... عاطفه خوشنواز
 اعظم دخت رحیمی
 دکتر مریم صلبی
 طیبه صیفوری
 دکتر منیژه مقدم
 دکتر مهدیه یزدان پناه راوری

بسمه تعالی

جمعیت جهان در حال سالمند شدن است. افزایش جمعیت سالمندان حاصل بهبود وضعیت بهداشتی، کاهش مرگ و میر، توسعه تکنولوژی و افزایش امید به زندگی است و به عنوان یکی از موفقیت‌های جوامع محسوب می‌شود. پیش‌بینی‌ها بیانگر این است که بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۵۰، نسبت جمعیت بالای ۶۰ سال جهان تقریباً دو برابر خواهد شد و از ۱۲ درصد به ۲۲ درصد خواهد رسید و تا سال ۲۰۲۰، تعداد افراد ۶۰ ساله و مسن‌تر، از کودکان کمتر از ۵ سال بیشتر خواهد شد. در این بین، کشورهای رو به توسعه همچون ایران که تاکنون جمعیتی جوان داشته‌اند، به طور جدی‌تری نسبت به کشورهای توسعه یافته، با افزایش جمعیت سالمندان رو به رو خواهند بود و زمان کمتری برای برنامه‌ریزی جهت سالمندی جمعیت خود دارند. به گزارش سازمان جهانی بهداشت، در سال ۲۰۵۰ هشتاد درصد جمعیت سالمندان دنیا در کشورهای با درآمد پایین و متوسط زندگی خواهند کرد. پیش‌بینی‌های انجام شده بر اساس سرشماری‌های کشوری انجام شده در ایران نیز این مهم را مورد تأیید قرار داده است. باید این واقعیت را نیز مد نظر داشت که از سال ۱۴۲۰ شمسی، متولیدین دهه ۶۰ ایران به سنین سالمندی خواهند رسید و در واقع با انفجار جمعیت سالمند مواجه خواهیم شد. بنابراین در فرصت پیش روی بیست ساله، باید کشور را برای مواجهه با پدیده سالمندی آماده سازیم.

افزایش روز افزون جمعیت سالمندان با افزایش تعداد مبتلایان به بیماری‌های مزمن همراه است. براساس نتایج حاصل از مطالعات انجام شده، شیوع ابتلا به بیماری‌هایی نظیر فشارخون، دیابت، بیماری‌های قلبی-عروقی، سرطان‌ها، آرتریت و اختلالات روان‌پزشکی، با افزایش سن افزایش می‌یابد و آنچه شرایط سالمند را پیچیده‌تر می‌کند، ابتلای همزمان به این بیماری‌ها (هم ابتلایی) است که در جمعیت قابل ملاحظه‌ای از سالمندان دیده می‌شود. به علاوه سالخوردگی جمعیت، جوامع را با چالش‌هایی نظیر افزایش نسبت سرباری و کاهش نیروی کار، مسائل مرتبط با بیمه و بازنشستگی، مسائل مرتبط با مراقبت و مشکلات مربوط به آن مواجه می‌کند. بنابراین، رشد فزاینده جمعیت سالمند و پیامدهای آن باعث شده است که در اکثر جوامع، سالخوردگی جمعیت به عنوان مسئله‌ای مهم و اساسی مورد توجه قرار گیرد، چراکه، نبود برنامه‌ریزی مناسب برای پیشگیری از پیامدها و چالش‌های سالمندی، به ایجاد چالشی بزرگ در جامعه منجر خواهد شد.

بدیهی است که برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در حوزه سالمندی، مانند هر حوزه دیگری، نیازمند شواهد و مستندات علمی است. برنامه‌ریزی مبتنی بر شواهد با قرار دادن بهترین شواهد و مدارک موجود کمک می‌کند که تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد برنامه‌ها و پروژه‌ها اخذ شود و از آن در کنار تجارب، تخصص و قضاوت‌های فردی و جمعی، از شواهد و مستندات قابل اعتماد و اتکای حاصل از پژوهش‌های هدفمند، برای برنامه‌ریزی استفاده شود.

نظر به اینکه طی سال‌های اخیر، پژوهش ملی اختصاصی در حوزه سالمندی کشور انجام نشده است، برای آنکه بتوان با بهره‌گیری از مستندات علمی و شواهد متقن برای چالش‌ها و مشکلات این جمعیت روزافزون در کشور برنامه‌ریزی و سیاستگذاری نمود، اداره سلامت سالمندان دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس این معاونت، اقدام به طراحی و تدوین مجموعه‌ای متشکل از مهمترین شاخص‌های سلامت سالمندان، تحت عنوان سیمای سلامت سالمندان نموده است. در این مجموعه، که حاصل کار تیمی ارزشمند همکاران مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی تهران است، با رویکردی علمی، از داده‌های پژوهش‌های معتبر موجود مانند مطالعه بار بیماری‌ها، سوانح و حوادث و عوامل خطر در سطوح ملی و استانی (NASBOD^۱)، مطالعه جهانی بار بیماری‌ها (GBD^۲) و پیمایش ملی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر (STEPS^۳) استفاده شده و این داده‌ها برای جمعیت بالای ۶۰ سال، باز تحلیل شده است.

^۱ National and Subnational Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors

^۲ Global Burden of Diseases

^۳ STEPwise Approach to NCD Risk Factor Surveillance

این اطلس‌ها، شامل شاخص‌های ذیل (به تفکیک جنسیت و گروه سنی سالمندی در سطوح ملی و استانی) است:

روند زمانی مرگ و شیوع، به تفکیک بیماری‌ها و مشکلات سلامتی از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷، شیوع عوامل خطر بیماری‌های غیر واگیر در سال ۲۰۱۶، روند زمانی بروز سرطان‌ها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶، روند زمانی بستری‌پذیری و بستری‌دهی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۸، روند زمانی شیوع عوامل خطر تغذیه‌ای از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷، روند زمانی شیوع عوامل خطر متابولیک از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶، روند زمانی شیوع عامل خطر فعالیت فیزیکی ناکافی و مصرف دخانیات از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹.

هدف اصلی از طراحی و تدوین اطلس‌ها و الگوی بهره‌مندی از آنها، فراهم آوردن فرصتی برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مبتنی بر شواهد، به منظور ارتقاء کمی و کیفی زندگی سالمندان کشور و برقراری امکان مدیریت سلامت این گروه سنی در سطوح استانی و ملی است. پژوهشگران حوزه سلامت، اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان، سیاستگذاران ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، معاونین و زیرمجموعه ایشان و همچنین مدیران ارشد استانی، می‌توانند از اطلاعات موجود در اطلس‌ها استفاده نمایند. امید است علاوه بر ترویج مدیریت و تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد در سطوح ملی و منطقه‌ای، در نهایت سالمندان عزیز کشور نیز از برکات این اقدام ارزشمند بهره‌مند گردند.

دکتر حسین فرشیدی

معاون بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

جهت گزارش میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها از سری مجموعه گزاره برگ‌های سیمای سلامت سالمندان؛ از اطلاعات برآورد شده در مطالعه‌ی بار بیماری‌ها، سوانح و حوادث و عوامل خطر در سطوح ملی و استانی (¹NASBOD) و مطالعه جهانی بار بیماری‌ها (²GBD) استفاده شد. این پروژه دو بخش اصلی دارد که شامل سطح و روند میزان‌های مرگ و علت‌های مرگ است. در مرحله نخست، میزان‌های مرگ برای هر ترکیب جنس-سن از سیستم ثبت مرگ محاسبه و سپس با استفاده از مدل‌های آماری میزان ناکامل بودن سیستم ثبت مرگ محاسبه شد. به منظور برآورد میزان‌های مرگ، مدل‌های سن-فضا-زمان³ و رگرسیون فرآیند گوسین (⁴GPR) برای ترکیب تمامی منابع داده موجود مورد استفاده قرار گرفتند. به منظور برآورد میزان‌های مرگ از سه نوع متغیر کمکی شاخص ثروت، تعداد سال‌های تحصیل و میزان شهرنشینی برای ترکیب‌های مختلف سن، جنس، استان و سال استفاده شد. منابع داده مختلفی برای برآورد مرگ و میر به تفکیک سن و جنس وجود دارد که شامل ⁵DRS، تاریخچه خلاصه تولد و تاریخچه کامل تولد به دست آمده از سرشماری‌ها و پیمایش جمعیت و سلامت⁶ برای هر دو گروه سنی کودکان و نیز بزرگسالان وجود دارد. به منظور تولید برآورد روند زمانی واحد از میزان‌های مرگ در طی ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷، از GPR استفاده شد. GPR یک مدل بیزی است که از اطلاعات ورودی میزان‌های مرگ استفاده می‌کند و یک مدل انعطاف‌پذیر با پیشین‌های سلسله مراتبی برای پارامترهای مدل ارائه می‌دهد. فرآیند گوسین دارای تابع میانگین و تابع کوواریانس است که به ترتیب به عنوان مدل فضایی-زمانی و تابع ماترن⁷ تعریف می‌شوند. مدل فضایی-زمانی گرایش اصلی نتایج نهایی را تعیین می‌کند. همچنین مقادیر گمشده در دوره زمانی مد نظر را با استفاده از اطلاعات همبستگی سن، فضا و زمان و نیز سایر متغیرهای کمکی مربوطه جانهی می‌کند. از آنجا که این مدل اطلاعات مربوط به گروه‌های سنی نزدیک به هم، استان‌ها و زمان‌های نزدیک را در نظر می‌گیرد، می‌تواند برآورد مرگ را در مقایسه با سایر گزینه‌ها بهبود بخشد. در مطالعه پیش رو از سطوح و روند داده‌ها و مزیت مدل‌های AST و GPR استفاده شد. تعداد مرگ‌ها برگرفته از نتایج پروژه نِسباد و جمعیت از سرشماری‌ها استخراج شد. در انتها داده‌های مرگ و جمعیت به تفکیک ۳۱ استان، گروه‌های سنی ۵ ساله (کمتر از ۱ سال، ۱-۴، ۵-۹، ...، ۸۰ سال و بالاتر)، جنس و ۲۸ سال از ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ آماده شد.

امید زندگی با استفاده از روش جدول عمر برای میزان‌های مرگ هر گروه سنی محاسبه شد. در این مطالعه از روش جدول عمر مطرح شده توسط سازمان بهداشت جهانی برای ایران استفاده شد. این روش با روش جدول عمری که برای کشورهای صنعتی و پیشرفته عنوان شده است متفاوت است. کدهای جدول عمر به کار رفته در پکیج maple برای محاسبه امید زندگی در ایران اصلاح و نتایج بر اساس محاسبات امید زندگی برای کشورهای در حال توسعه با دو گروه سنی نخست ۰ تا یک سال و ۱-۴ سال و آخرین گروه سنی ۸۰ سال و بالاتر انجام شد. به منظور محاسبه برآورد ملی ابتدا میزان‌های مرگ هر استان به طور جداگانه محاسبه شد. سپس برای محاسبه برآورد ملی، برآوردهای فروملی را در وزن احتمالی هر کدام که بر اساس جمعیت هر استان محاسبه شده است ضرب و از جمع آن‌ها برآورد ملی محاسبه شد. برای محاسبه امید زندگی در سطح ملی و فروملی مدل‌ها به طور جداگانه برازش داده شد.

1 National and Subnational Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors

2 Global Burden of Diseases

3 Age-Spatio-Temporal (AST)

4 Gaussian Process Regression

5 Death Registration System

6 Demographic and Health Surveys (DHS)

7 Matérn

نتایج در قالب تعداد موارد مرگ، میزان مرگ (خام یا استاندارد شده‌ی سنی)، امید زندگی و میزان شیوع (استاندارد شده‌ی سنی) گزارش شده‌اند. جهت محاسبه‌ی میزان خام مرگ؛ تعداد موارد مرگ هر استان در هر سال بر جمعیت همان استان در هر سال تقسیم و سپس در صد هزار ضرب شده است. جهت ایجاد امکان مقایسه بین استان‌های مختلف؛ اطلاعات میزان مرگ علاوه بر میزان خام به صورت میزان استاندارد شده‌ی سنی نیز در صد هزار نفر جمعیت گزارش شده است. در واقع برای مقایسه‌ی میزان مرگ در دو استان؛ میزان خام مرگ شاخص مناسبی نیست، زیرا میزان‌ها تنها هنگامی قابل مقایسه با یکدیگر هستند که جمعیت پایه‌ی آن‌ها قابل مقایسه باشند. با انجام تطبیق سنی یا استاندارد کردن سنی اثر مخدوش‌کننده اختلاف ساختارهای سنی از بین می‌رود و یک میزان ساده تطبیق‌شده یا استاندارد بدست می‌آید که می‌توان میزان‌های مرگ را مستقیماً بین استان‌های مختلف مقایسه کرد. در جداول میزان‌های استاندارد شده سنی شیوع نیز گزارش شده‌اند و می‌توان میزان‌های شیوع را مستقیماً بین استان‌های مختلف مقایسه کرد. در گزاره برگ‌های ملی و استانی تمامی میزان‌های مرگ (خام یا استاندارد شده‌ی سنی) و میزان‌های شیوع (استاندارد شده‌ی سنی) همراه با یک رقم اعشار گزارش شده‌اند.

در ادامه توضیحات مربوط به گزاره برگ‌های ملی و استانی به تفکیک هر صفحه ذکر شده است:

- در صفحه‌ی اول گزاره برگ‌های ملی و استانی توضیح کلی مختص هر گزاره برگ همراه با کلیاتی از تفسیر نتایج آورده شده است.
- در صفحه‌ی دوم گزاره برگ‌های ملی و استانی تعداد و میزان مرگ در صد هزار نفر جمعیت و به تفکیک گروه سنی و جنسیت برای هر استان یا ملی در قالب جدول گزارش شده است. در این جدول میزان‌ها به صورت خام گزارش شده‌اند و امکان مقایسه اطلاعات این جدول با جداول سایر استان‌ها و یا ملی وجود ندارد. براساس این جدول برای مثال عدد ۳۸۰۰۰۶ در سال ۲۰۱۷ (سال ۱۳۹۶) در گزاره برگ ملی نشان می‌دهد که ۳۸۰۰۰۶ تعداد مرگ برای تمام علل در سال ۲۰۱۷ (سال ۱۳۹۶) برای هر دو جنسیت در کل کشور برآورد شده که از این تعداد ۱۲۱۳۷۴ مورد مرگ مربوط به گروه سنی کمتر از ۶۰ سال و ۲۵۸۶۳۲ مورد مرگ مربوط به گروه سنی ۶۰ سال و بالاتر بوده است. در ادامه این جدول سهم هر گروه سنی سالمندی در ایجاد ۲۵۸۶۳۲ مورد مرگ نیز آورده شده است (برای مثال ۲۷۱۲۷ مورد مرگ در گروه سنی ۶۰ تا ۶۴ سال و ۱۳۱۱۵۱ مورد مرگ در گروه سنی ۸۰ سال و بالاتر). همچنین میزان مرگ ۴۶۲/۴ در گزاره برگ ملی نشان می‌دهد که از هر صد هزار نفر جمعیت در سال ۲۰۱۷ (سال ۱۳۹۶) در کشور؛ ۴۶۲/۴ مورد مرگ برای همه علل در سال ۲۰۱۷ برای هر دو جنسیت در کل کشور برآورد شده است (۱۶۳/۲ در گروه سنی کمتر از ۶۰ سال و ۳۳۱۱/۲ در گروه سنی ۶۰ سال و بالاتر). در ادامه نمودار روند زمانی تعداد موارد مرگ (برای هر استان و یا ملی) و میزان مرگ استاندارد شده‌ی سنی به تفکیک سه گروه بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای؛ بیماری‌های غیرواگیر و سوانح و حوادث در سطوح ملی و استانی ارائه شده است. با بررسی این نمودار می‌توان دریافت که روند زمانی تعداد موارد مرگ و میزان مرگ استاندارد شده‌ی سنی به تفکیک علت چگونه است. همچنین در گزاره برگ‌های استانی می‌توان بررسی کرد که میزان مرگ استاندارد شده‌ی سنی در هر استان از سطح ملی در سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ (سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۶) برای هر علت کمتر یا بیشتر بوده است. لازم به ذکر است با توجه به اینکه میزان مرگ‌ها در این نمودار براساس میزان استاندارد شده‌ی سنی گزارش شده است قابلیت مقایسه بین استان‌های مختلف و یا با سطح ملی وجود دارد.

- در صفحه‌ی سوم گزاره برگ ملی میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به تفکیک علل اصلی و میزان استاندارد شده سنی شیوع به تفکیک مشکلات سلامتی در صد هزار نفر جمعیت و به تفکیک سال و جنسیت در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر گزارش شده است. برای مثال میزان مرگ ۱۹۵۷/۷ در گزاره برگ ملی نشان می‌دهد که از هر صد هزار نفر جمعیت در سال ۲۰۱۷ (سال ۱۳۹۶) در کشور؛ ۱۹۵۷/۷ مورد مرگ برای بیماری‌های قلبی-عروقی در سال ۲۰۱۷ برای هر دو جنسیت در کل کشور برآورد شده است (۱۹۲۳/۶ در بین زنان و ۱۹۹۹/۳ در بین مردان). لازم به ذکر است با توجه به اینکه اعداد این جداول براساس میزان استاندارد شده‌ی سنی گزارش شده است قابلیت مقایسه این اعداد با اطلاعات سایر استان‌ها وجود دارد. در صفحه سوم گزاره برگ‌های استانی میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به تفکیک علل اصلی و میزان استاندارد شده سنی شیوع به تفکیک مشکلات سلامتی در صد هزار نفر جمعیت و به تفکیک سال و جنسیت در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در هر استان همراه با رتبه هر استان گزارش شده است. در این جدول استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان مرگ یا شیوع استاندارد شده‌ی سنی به تفکیک علت، جنسیت و سال از ۱ تا ۳۱ رتبه بندی شده‌اند. هر چه طیف رنگ رتبه برای هر علت، جنسیت و سال به سمت رنگ قرمز نزدیک باشد آن استان در آن علت، جنسیت و سال خاص در مقایسه با ۳۰ استان دیگر کشور دارای میزان مرگ یا شیوع استاندارد شده‌ی سنی بیشتری است. در مقابل هر چه طیف رنگ رتبه برای هر علت، جنسیت و سال به سمت رنگ سبز نزدیک باشد آن استان در آن علت، جنسیت و سال خاص در مقایسه با ۳۰ استان دیگر کشور دارای میزان مرگ یا شیوع استاندارد شده‌ی سنی کمتری است. در ادامه نمودار مقایسه میزان مرگ و شیوع استاندارد شده سنی برای هر کدام از هست علت یا مشکل سلامتی در سال ۲۰۱۷ و برای هر دو جنسیت آورده شده است تا بتوان بیشتر بودن یا کمتر بودن میزان استاندارد شده‌ی سنی را برای هر استان، جنسیت و علت در مقایسه با ملی (کشور) بررسی کرد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه اعداد این جداول و نمودار براساس میزان استاندارد شده‌ی سنی هستند قابلیت مقایسه بین استان‌های مختلف و با سطح ملی وجود دارد.

- در صفحه‌ی چهارم و ششم گزاره برگ‌های ملی و استانی روند زمانی میزان مرگ یا شیوع استاندارد شده‌ی سنی ۶ علت یا مشکل سلامتی در صد هزار نفر جمعیت در قالب نمودار روند زمانی به تفکیک جنسیت در سطوح ملی و استانی گزارش شده است. عدد دقیق میزان مرگ یا شیوع استاندارد شده‌ی سنی برای سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷ (سال‌های ۱۳۶۹، ۱۳۷۹، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۶) به تفکیک جنسیت برای همان علت یا مشکل سلامتی در قالب جدول پس از هر نمودار آورده شده است. با توجه به اینکه اعداد این جدول و نمودارها به صورت میزان استاندارد شده‌ی سنی هستند امکان مقایسه بین علل مرگ یا مشکل سلامتی مختلف در هر گزاره برگ ملی و استانی و با استان‌های دیگر و ملی وجود دارد. لازم به ذکر است که مقیاس محور عمودی برای هر گزاره برگ ملی و استانی و هر علت یا مشکل سلامتی برای هر گزاره برگ متفاوت و با توجه به اعداد در سطح ملی و یا استانی در نظر گرفته شده است؛ لذا پیشنهاد می‌شود برای مقایسه از اطلاعات جدول استفاده شود. برای مثال میزان مرگ ۱۱۴۹/۷ در گزاره برگ ملی (صفحه چهارم) برای بیماری ایسکمیک قلب نشان می‌دهد که از هر صد هزار نفر جمعیت در سال ۲۰۱۷ (سال ۱۳۹۶) در کشور؛ ۱۱۴۹/۷ مورد مرگ برای بیماری ایسکمیک قلب در سال ۲۰۱۷ (سال ۱۳۹۶) برای هر دو جنسیت در کل کشور برآورد شده است (۱۰۸۹/۰ در بین زنان و ۱۲۱۴/۷ در بین مردان). همچنین میزان شیوع ۱۰۶۷۵/۴ در گزاره برگ ملی (صفحه ششم) برای بیماری ایسکمیک قلب نشان می‌دهد که از هر صد هزار نفر جمعیت در سال ۲۰۱۷ (سال

۱۳۹۶) در کشور؛ ۱۰۶۷۵/۴ فرد مبتلا به بیماری ایسکمیک قلب در سال ۲۰۱۷ (سال ۱۳۹۶) برای هر دو جنسیت در کل کشور برآورد شده است (۱۰۴۲۳/۶ در بین زنان و ۱۰۹۳۲/۵ در بین مردان).

- در صفحه‌ی پنجم و هفتم گزاره برگ ملی؛ پراکندگی جغرافیایی میزان مرگ استاندارد شده‌ی سنی برای ۶ علت یا مشکل سلامتی در سطح استانی در سال ۲۰۱۷ (سال ۱۳۹۶) و در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در قالب نقشه همراه با کد HASC^A مختص هر استان و به تفکیک جنسیت گزارش شده است. با توجه به اینکه در این نقشه‌ها راهنمای طیف بندی برای زنان و مردان یکسان در نظر گرفته شده است؛ هر چه رنگ هر استان به سمت رنگ تیره‌تری نزدیک شود نشان می‌دهد که آن استان برای آن علت خاص دارای میزان مرگ استاندارد شده‌ی سنی بیشتری در مقایسه با سایر استان‌ها در همان علت خاص است. در واقع با استفاده از این نمودار به دنبال پیدا کردن الگوی جغرافیایی میزان مرگ استاندارد شده‌ی سنی در کشور هستیم. لازم به ذکر است با توجه به اینکه نمودار براساس میزان استاندارد شده‌ی سنی آماده شده است قابلیت مقایسه بین استان‌های مختلف وجود دارد. در صفحه‌ی پنجم و هفتم هر گزاره برگ استانی؛ مقایسه هر استان با استان‌های همسایه خود براساس میزان مرگ یا شیوع استاندارد شده‌ی سنی در سال ۲۰۱۷ (سال ۱۳۹۶) و به تفکیک جنسیت انجام شده است. در این نمودار؛ استان مختص هر گزاره برگ به عنوان استان اول در پایین نمودار در نظر گرفته شده است و سایر استان‌ها براساس حروف الفبای لاتین چیده شده‌اند. در این نمودار علاوه بر اینکه می‌توان میزان مرگ یا شیوع استاندارد شده‌ی سنی را به تفکیک جنسیت در استان‌های همسایه مقایسه کرد؛ با توجه به اینکه مقیاس در محور افقی برای زنان و مردان و برای هر علت یا مشکل سلامتی در هر گزاره برگ استانی یکسان در نظر گرفته شده است؛ با بررسی خطوط عمودی موجود در نمودار می‌توان میزان مرگ یا شیوع را در بین زنان و مردان و برای هر علت یا مشکل سلامتی و در هر گزاره برگ مقایسه کرد.

کد HASC مختص هر استان:

GI	گیلان	FA	فارس	CM	چهارمحال و بختیاری	AR	اردبیل
LO	لرستان	QZ	قزوین	KJ	خراسان جنوبی	ES	اصفهان
MN	مازندران	QM	قم	KV	خراسان رضوی	AL	البرز
MK	مرکزی	KD	کردستان	KS	خراسان شمالی	IL	ایلام
HG	هرمزگان	KE	کرمان	KZ	خوزستان	EA	آذربایجان شرقی
HD	همدان	BK	کرمانشاه	ZA	زنجان	WA	آذربایجان غربی
YA	یزد	KB	کهگیلویه و بویراحمد	SM	سمنان	BS	بوشهر
		GO	گلستان	SB	سیستان و بلوچستان	TE	تهران

سیمای سلامت سالمندان

کشور جمهوری اسلامی ایران

میزان مرگ و شیوع بیماری ها

سیمای سلامت سالمندان

کشور جمهوری اسلامی ایران

(میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها)



در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها در کل جمعیت، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (کمتر از ۶۰ سال) و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس و گروه‌های سنی بیان شده است. به منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات کل کشور و مقایسه‌ای بین استان‌های مختلف نیز تدوین و ترسیم شده است.

آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر این مطلب است که بیش از ۸۰ درصد از علل مرگ در سال ۲۰۱۷ (در کل جمعیت و هر دو جنس) به علت بیماری‌های غیرواگیر و دومین علل مرگ سوانح و حوادث و پس از آن بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای بوده است. تعداد مرگ به علت بیماری‌های غیرواگیر در سالمندان ۶۰ سال و بالاتر کشور سه برابر بیش از مرگ در جمعیت غیر سالمند بوده و میزان مرگ ناشی از این گروه از بیماری‌ها در سالمندان ۳۲ برابر بیش از گروه سنی غیر سالمند در سال ۲۰۱۷ بوده است. همچنین تعداد و میزان مرگ در گروه‌های سنی با بازه‌های پنج ساله با افزایش سن افزایش چشمگیری داشته است، به گونه‌ای که بیش از یک سوم از مرگ‌ها برای همه علل در سنین ۸۰ سال و بالاتر رخ داده است. این الگو برای هر سه دسته بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای، بیماری‌های غیرواگیر و سوانح و حوادث مشاهده می‌شود و افزایش میزان مرگ به علت سوانح و حوادث بر اساس گروه‌های سنی دارای کمترین شیب است. در طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ افزایش امید زندگی در تمام گروه‌های سنی در زنان و مردان قابل مشاهده است و این افزایش در زنان بارزتر از مردان بوده است. امید زندگی در دو گروه سنی ۷۵ تا ۷۹ و ۸۰ سال و بالاتر در طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ در زنان بیش از دو برابر شده است.

لازم به ذکر است تغییر ناگهانی که در نمودار روند زمانی تعداد و میزان مرگ به علت سوانح و حوادث طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ اتفاق افتاده به علت حوادث غیرمترقبه از جمله زمین لرزه‌های رخ داده طی ۲۸ سال در سراسر کشور است.

میزان استاندارد شده سنی مرگ به علت بیماری‌های قلبی-عروقی، بیماری‌های مزمن تنفسی، بیماری‌های گوارشی، سوانح حمل و نقل و سوانح غیر عمدی در سال ۲۰۱۷ در مقایسه با سال ۱۹۹۰ در سالمندان ۶۰ سال و بالاتر کاهش یافته است که بارزترین کاهش مربوط به سوانح غیر عمدی بوده است که میزان مرگ به علت آن نزدیک یک پنجم شده است. ولی میزان مرگ به علت سرطان‌ها، اختلالات عصبی و دیابت و بیماری‌های کلیوی در سال ۲۰۱۷ در مقایسه با سال ۱۹۹۰ در سالمندان ۶۰ سال و بالاتر افزایش یافته است. الگوهای کاهش و افزایش در میزان استاندارد شده سنی مرگ در زنان و مردان سالمند طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ مشابه هم بوده است.

میزان استاندارد شده سنی شیوع برای بیماری‌های قلبی-عروقی، بیماری‌های مزمن تنفسی و سوانح حمل و نقل در سال ۲۰۱۷ در مقایسه با سال ۱۹۹۰ در سالمندان ۶۰ سال و بالاتر کاهش یافته است که بارزترین کاهش مربوط به سوانح حمل و نقل بوده است که کاهشی بیش از ۱۵ درصد را تجربه کرده است. ولی میزان شیوع به علت سرطان‌ها، اختلالات عصبی، دیابت و بیماری‌های کلیوی، بیماری‌های گوارشی و سوانح غیر عمدی در سال ۲۰۱۷ در مقایسه با سال ۱۹۹۰ در سالمندان ۶۰ سال و بالاتر افزایش یافته است. الگوهای کاهش و افزایش در میزان استاندارد شده سنی مرگ در زنان و مردان سالمند طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ مشابه هم بوده است.

روند زمانی میزان استاندارد شده سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، سکته، عفونت‌های تنفسی تحتانی و افتادن کاهشی و برای دیابت نوع دو و بیماری آلزایمر افزایشی است.

روند زمانی میزان استاندارد شده سنی شیوع به علت مشکلات سلامتی در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، سکته و بیماری آلزایمر کاهشی و برای اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی، افتادن و بیماری مزمن انسدادی ریه افزایشی است.




تعداد و میزان^۱ مرگ به تفکیک گروه سنی در سال ۲۰۱۷ در سطح ملی

گروه سنی	جنسیت	همه علل		بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای		بیماری‌های غیرواگیر		سوانح و حوادث	
		تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان
همه سنین	هر دو	۳۸۰۰۰۶	۴۶۲/۴	۲۴۶۳۲	۳۰	۳۱۲۸۱۳	۳۸۰/۷	۴۲۵۶۲	۵۱/۸
	زنان	۱۶۱۲۶۸	۳۹۸/۲	۱۰۶۹۰	۲۶/۴	۱۳۹۵۸۶	۳۴۴/۶	۱۰۹۹۲	۲۷/۱
	مردان	۲۱۸۷۳۸	۵۲۴/۹	۱۳۹۴۲	۳۳/۵	۱۷۳۲۲۷	۴۱۵/۷	۳۱۵۶۹	۷۵/۸
کمتر از ۶۰ سال	هر دو	۱۲۱۳۷۴	۱۶۳/۲	۱۵۹۷۲	۲۱/۵	۷۱۱۶۳	۹۵/۷	۳۴۲۳۹	۴۶
	زنان	۴۲۰۲۲	۱۱۵	۶۸۶۷	۱۸/۸	۲۷۰۰۹	۷۳/۹	۸۱۴۶	۲۲/۳
	مردان	۷۹۳۵۲	۲۰۹/۸	۹۱۰۵	۲۴/۱	۴۴۱۵۴	۱۱۶/۷	۲۶۰۹۳	۶۹
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۲۵۸۶۳۲	۳۳۱/۲	۸۶۶۰	۱۱۰/۹	۲۴۱۶۵۰	۳۰۹۳/۸	۸۳۲۳	۱۰۶/۶
	زنان	۱۱۹۲۴۶	۳۰۰/۷	۳۸۲۲	۹۶/۴	۱۱۲۵۷۷	۲۸۳۹/۷	۲۸۴۷	۷۱/۸
	مردان	۱۳۹۳۸۶	۳۶۲۳/۸	۴۸۳۷	۱۲۵/۸	۱۲۹۰۷۳	۳۳۵۵/۷	۵۴۷۶	۱۴۲/۴
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۲۷۱۲۷	۹۹۶/۱	۸۲۷	۳۰/۴	۲۴۴۷۸	۸۹۸/۸	۱۸۲۲	۶۶/۹
	زنان	۱۰۶۵۸	۷۷۴/۷	۳۲۵	۲۳/۶	۹۸۱۸	۷۱۳/۶	۵۱۵	۳۷/۵
	مردان	۱۶۴۶۸	۱۲۲۲/۱	۵۰۲	۳۷/۲	۱۴۶۶۰	۱۰۸۷/۹	۱۳۰۷	۹۷
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۲۸۳۱۰	۱۵۴۶/۴	۸۲۴	۴۵	۲۶۰۷۹	۱۴۲۴/۶	۱۴۰۷	۷۶/۸
	زنان	۱۲۴۰۳	۱۲۸۹/۴	۳۵۷	۳۷/۲	۱۱۵۸۴	۱۲۰۴/۳	۴۶۲	۴۸
	مردان	۱۵۹۰۷	۱۸۳۱	۴۶۷	۵۳/۸	۱۴۴۹۵	۱۶۶۸/۵	۹۴۵	۱۰۸/۸
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۳۱۳۳۹	۲۵۳۵/۸	۹۵۳	۷۷/۱	۲۹۲۰۱	۲۳۶۲/۹	۱۱۸۴	۹۵/۸
	زنان	۱۴۲۶۳	۲۲۳۳/۸	۴۱۳	۶۴/۶	۱۳۴۴۶	۲۱۰۵/۸	۴۰۵	۶۳/۴
	مردان	۱۷۰۷۵	۲۸۵۸/۸	۵۴۱	۹۰/۵	۱۵۷۵۵	۲۶۳۷/۷	۷۸۰	۱۳۰/۵
۷۵ تا ۷۹ سال	هر دو	۴۰۷۰۷	۴۵۲۲/۸	۱۲۷۹	۱۴۲/۱	۳۸۲۳۱	۴۲۴۷/۷	۱۱۹۷	۱۳۳
	زنان	۱۸۷۰۸	۴۱۸۹/۷	۵۵۶	۱۲۴/۶	۱۷۷۳۸	۳۹۷۲/۴	۴۱۴	۹۲/۷
	مردان	۲۱۹۹۹	۴۸۵۰/۸	۷۲۲	۱۵۹/۲	۲۰۴۹۳	۴۵۱۸/۸	۷۸۳	۱۷۲/۷
۸۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۳۱۱۵۱	۱۱۷۰۰/۲	۴۷۷۷	۴۲۶/۱	۱۲۳۶۶۱	۱۱۰۳۲/۱	۲۷۱۳	۲۴۲
	زنان	۶۳۲۱۳	۱۱۶۷۰	۲۱۷۱	۴۰۰/۷	۵۹۹۹۱	۱۱۰۷۵/۲	۱۰۵۱	۱۹۴/۱
	مردان	۶۷۹۳۷	۱۱۷۲۸/۵	۲۶۰۶	۴۴۹/۹	۶۳۶۷۰	۱۰۹۹۱/۸	۱۶۶۱	۲۸۶/۸

امید زندگی (سال) در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ در سطح ملی

جنسیت	بدو تولد		۶۰ تا ۶۴ سال		۶۵ تا ۶۹ سال		۷۰ تا ۷۴ سال		۷۵ تا ۷۹ سال		۸۰ سال و بالاتر	
	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰
زنان	۶۶/۵	۸۰/۷	۱۵	۲۴/۲	۱۱/۵	۱۹/۹	۸/۵	۱۶	۶	۱۲/۴	۴/۶	۹/۵
مردان	۶۳/۲	۷۵/۳	۱۴/۶	۲۲	۱۱/۱	۱۸/۲	۸/۵	۱۴/۸	۶	۱۱/۶	۴/۹	۹/۱

روند زمانی تعداد در مقابل میزان استاندارد شده سنی مرگ در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سطح ملی



^۱ در این گزارش تمامی میزان‌ها در ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت گزارش شده‌اند.




میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سطح ملی

علت ^۲	هر دو				زنان				مردان			
	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰
بیماری‌های قلبی-عروقی	۲۸۰۸/۵	۲۳۲۳/۷	۲۰۳۵/۴	۱۹۵۷/۹	۲۷۲۹/۴	۲۲۷۱/۸	۲۰۲۵/۴	۱۹۲۳/۶	۲۸۶۳/۷	۲۳۵۱/۴	۲۰۴۳/۷	۱۹۹۹/۳
سرطان‌ها	۵۰۶	۴۱۴/۷	۵۱۵/۴	۵۵۳/۷	۳۸۲/۱	۳۲۱/۶	۴۰۸/۲	۴۲۷/۷	۶۳۷	۵۰۰/۱	۶۱۷/۷	۶۷۹/۶
اختلالات عصبی	۲۹۴/۲	۲۵۵/۵	۳۲۲/۵	۳۷۲/۷	۳۰۸/۹	۲۷۴	۳۶۱/۶	۳۹۷/۹	۲۷۴/۵	۲۳۲/۱	۲۸۳/۸	۳۴۸/۵
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۲۱۲/۳	۲۰۰/۵	۲۶۴/۷	۲۹۴/۷	۲۱۷/۴	۲۱۱/۱	۲۷۱/۴	۳۰۰/۵	۲۰۷/۶	۱۹۰/۴	۲۵۸/۲	۲۸۹/۲
بیماری‌های مزمن تنفسی	۲۳۵/۲	۲۰۰/۴	۱۹۳/۷	۱۸۰	۱۷۷/۵	۱۶۳/۱	۱۶۲/۸	۱۴۹/۴	۲۹۹/۱	۲۳۵/۹	۲۲۲/۸	۲۱۰/۶
بیماری‌های گوارشی	۱۲۲/۴	۸۸	۹۸/۹	۹۹/۴	۱۰۵/۷	۷۷/۵	۹۳/۳	۹۰/۴	۱۳۸	۹۶/۴	۱۰۴/۵	۱۰۸/۷
سوانح حمل و نقل	۹۶/۹	۸۵/۹	۶۸/۳	۵۶/۶	۴۸/۳	۴۳/۷	۴۰/۸	۳۴	۱۴۴/۱	۱۲۳/۸	۹۵/۴	۷۹/۷
سوانح غیر عمدی	۲۰۷/۲	۵۱/۲	۴۸/۳	۴۶/۶	۱۷۷/۵	۴۰/۵	۴۰/۶	۳۸/۶	۲۳۵/۴	۶۰/۸	۵۵/۸	۵۴/۹

میزان استاندارد شده سنی **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر


مشکل سلامتی	هر دو				زنان				مردان			
	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰
بیماری‌های قلبی-عروقی	۳۲۲۷۹/۷	۳۱۸۶۴/۷	۳۲۰۴۲/۳	۳۲۰۷۸	۳۲۳۴۲/۵	۳۲۳۳۲/۸	۳۲۷۴۴/۶	۳۱۶۵۷/۶	۳۱۷۵۱/۴	۳۱۴۲۲/۶	۳۱۴۰۱/۵	۳۱۴۰۱/۵
سرطان‌ها	۱۷۰۹/۸	۱۸۳۱/۱	۲۷۷۴/۳	۳۲۹۱/۴	۱۴۲۵/۹	۱۴۸۵/۲	۲۲۴۲/۸	۲۵۳۱/۶	۱۹۹۸/۸	۲۱۳۷	۳۲۸۷/۷	۴۰۷۵/۲
اختلالات عصبی	۵۴۴۵۷	۵۵۰۰۱/۸	۵۵۵۷۹/۶	۵۵۶۱۸/۳	۵۷۴۶۸/۹	۵۷۸۰۹/۸	۵۸۳۷۰	۵۸۳۹۷/۷	۵۱۷۵۴/۳	۵۲۵۲۰/۷	۵۲۷۱۰/۸	۵۲۷۳۷/۱
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۴۵۵۰۵/۸	۴۶۰۲۲	۴۸۴۴۴/۳	۵۴۰۷۷/۵	۴۹۷۱۳	۵۰۳۵۴/۳	۵۲۹۴۱/۸	۵۹۰۲۳/۴	۴۱۳۶۲/۵	۴۲۱۰۵/۸	۴۳۹۸۴	۴۸۹۹۶
بیماری‌های مزمن تنفسی	۱۵۰۵۶/۷	۱۴۲۴۵/۳	۱۴۵۶۰/۱	۱۴۲۸۹	۱۶۰۶۱/۹	۱۵۷۵۷/۳	۱۶۲۹۷	۱۵۵۰۵/۳	۱۴۱۲۹/۵	۱۲۹۰۶/۶	۱۲۸۵۱/۲	۱۳۰۴۰/۶
بیماری‌های گوارشی	۵۲۶۱۹/۵	۵۴۳۶۲/۶	۵۷۴۹۲/۵	۵۹۸۵۳/۳	۴۷۳۸۴/۴	۵۱۶۷۱/۳	۵۳۵۴۴/۱	۵۷۶۱۶/۲	۵۹۶۱۰	۶۳۲۸۵/۴	۶۶۳۵۲/۹	۶۶۳۵۲/۹
سوانح حمل و نقل	۹۱۵۳/۸	۸۸۲۵	۸۷۴۷/۳	۷۴۷۹	۷۰۴۶/۷	۶۵۹۰/۷	۶۸۴۰/۹	۵۹۱۰/۵	۱۱۲۰۸/۳	۱۰۸۴۱/۹	۱۰۶۳۴/۴	۹۰۸۳/۷
سوانح غیر عمدی	۲۸۴۱۹/۳	۲۵۸۶۱	۲۸۷۶۱/۳	۲۸۸۱۳/۵	۲۳۸۵۲/۷	۲۱۴۱۰/۲	۲۳۷۰۵	۲۴۹۵۱/۶	۳۲۸۰۶/۳	۲۹۸۴۴/۹	۳۳۷۹۷/۲	۳۲۷۸۲/۷

میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی و **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سال ۲۰۱۷ در سطح ملی




^۲ علل براساس میزان استاندارد شده سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ و هر دو جنسیت در سطح ملی مرتب شده‌اند.







جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۷۹۸/۱	۱۵۱۸/۸	۱۱۷۱/۱	۱۱۴۹/۷
زنان	۱۶۷۷	۱۴۳۰/۸	۱۱۱۶	۱۰۸۹
مردان	۱۹۰۹/۱	۱۵۸۸/۹	۱۲۲۳/۱	۱۲۱۴/۷




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۷۴۹/۷	۵۹۳	۴۹۱/۴	۴۵۲/۵
زنان	۷۶۷/۲	۶۰۹/۶	۵۰۵/۷	۴۵۹/۲
مردان	۷۲۵/۶	۵۷۳/۵	۴۷۷/۳	۴۴۷/۱




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۵۹/۸	۲۲۳/۷	۲۸۳	۳۳۰/۴
زنان	۲۸۱/۷	۲۴۸/۹	۳۲۹/۷	۳۶۵/۱
مردان	۲۳۱/۵	۱۹۳/۸	۲۳۷/۲	۲۹۶/۹



جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۷۴/۲	۷۹/۶	۱۱۶	۱۳۹/۳
زنان	۸۱/۸	۹۱/۱	۱۲۶/۵	۱۵۱/۵
مردان	۶۶	۶۸/۵	۱۰۶/۱	۱۲۷/۴




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۰۰/۱	۸۳/۹	۹۳/۴	۹۳/۶
زنان	۹۱/۹	۷۷/۶	۸۷	۸۴/۹
مردان	۱۰۹/۱	۸۹/۹	۹۹/۲	۱۰۲/۲




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۱/۵	۱۹/۷	۲۰/۲	۱۸/۸
زنان	۱۶	۱۵	۱۷/۲	۱۵/۷
مردان	۲۶/۹	۲۳/۸	۲۳/۱	۲۲




Ischemic heart disease




Stroke




Alzheimer's disease and other dementias




Diabetes mellitus type 2




Lower respiratory infections




Falls







اختلالات افسردگی				اختلالات اضطرابی				جنسیت
۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	
۶۴۷۶/۱	۶۳۷۷/۶	۶۲۴۲/۴	۶۲۹۰/۶	۶۴۸۹/۵	۶۶۲۶/۶	۶۳۸۳/۷	۶۴۵۱/۴	هر دو
۷۶۱۴/۲	۷۵۱۸/۷	۷۴۱۱	۷۴۰۰/۸	۸۲۰۴/۷	۸۳۹۳/۷	۸۲۵۲/۸	۸۲۷۱/۴	زنان
۵۲۹۵/۳	۵۲۱۸	۵۲۰۵/۷	۵۲۶۸/۵	۴۷۱۷/۷	۴۸۴۴	۴۷۲۳	۴۷۵۲/۷	مردان




۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۱۰۶۷۵/۴	۱۱۴۶۲/۷	۱۱۴۵۷/۵	۱۱۲۶۲/۱	هر دو
۱۰۴۲۳/۶	۱۱۱۲۴/۱	۱۱۰۶۸/۹	۱۰۸۹۸/۲	زنان
۱۰۹۳۲/۵	۱۱۷۹۵/۳	۱۱۸۰۷/۹	۱۱۶۱۷/۵	مردان




۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۹۶۹۷/۴	۹۷۰۰/۹	۸۳۰۵/۲	۹۱۴۰/۵	هر دو
۸۴۹۰/۶	۷۸۹۲/۹	۶۸۷۶/۴	۷۵۰۵/۷	زنان
۱۰۹۴۱/۸	۱۱۵۰۵/۲	۹۵۷۷/۱	۱۰۶۸۸/۹	مردان



۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۲۸۳/۱	۸۱۷۹/۴	۷۵۳۵/۸	۷۵۴۹/۷	هر دو
۹۰۱۰/۸	۹۳۲۶/۱	۸۵۱۷/۷	۸۲۴۴/۴	زنان
۷۵۳۸/۵	۷۰۶۳/۶	۶۶۶۹/۵	۶۸۸۷/۵	مردان




۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۷۲۴۴/۶	۶۷۷۵/۴	۶۶۳۶	۷۴۱۳/۸	هر دو
۷۹۱۶/۵	۷۲۱۲	۷۲۲۸/۹	۸۳۱۱/۴	زنان
۶۵۶۶/۷	۶۳۴۴/۶	۶۰۹۰/۸	۶۵۰۵/۹	مردان




۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۵۳۰۵/۶	۵۳۶۰/۱	۵۵۱۵/۱	۵۵۹۵/۵	هر دو
۵۵۶۷	۵۶۲۷/۵	۵۷۶۹/۶	۵۸۱۱/۱	زنان
۵۰۴۶/۷	۵۱۰۷/۹	۵۲۷۲/۷	۵۳۵۵	مردان




Mental disorders




Ischemic heart disease




Falls




Chronic obstructive pulmonary disease



Stroke



Alzheimer's disease and other dementias



سیمای سلامت سالمندان

استان آذربایجان شرقی

میزان مرگ و شیوع بیماری ها



سیمای سلامت سالمندان

استان آذربایجان شرقی

(میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها در کل جمعیت، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (کمتر از ۶۰ سال) ساکن در استان آذربایجان شرقی و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس و گروه‌های سنی بیان شده است. به منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی حاوی: اطلاعات مقایسه‌ای با شاخص کل کشور و مقایسه با استان‌های مجاور استان آذربایجان شرقی شامل: استان‌های اردبیل، آذربایجان غربی و زنجان نیز تدوین و ترسیم شده است.

آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر این مطلب است که شایع‌ترین علل مرگ در سالمندان ساکن استان آذربایجان شرقی (هر دو جنس) براساس میزان در سال ۲۰۱۷، به ترتیب بیماری‌های غیرواگیر، سوانح و حوادث و بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای است. این شاخص در افراد غیر سالمند ساکن استان آذربایجان شرقی دارای الگویی مشابه سالمندان است.

روند زمانی تعداد مرگ به علت هر سه دسته اصلی بیماری‌ها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ در حال افزایش است. سالمندان ساکن در استان آذربایجان شرقی و در سال ۲۰۱۷ از لحاظ میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری‌های غیرواگیر از میانگین کشوری بالاتر و به علت بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای و سوانح و حوادث از میانگین کشوری پایین‌تر هستند.

سالمندان ساکن استان آذربایجان شرقی از بین علل مختلف مرگ در بیماری‌های قلبی-عروقی (زنان و مردان در سال ۲۰۱۷)، سرطان‌ها (زنان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷ و مردان در سال‌های ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، اختلالات عصبی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، دیابت و بیماری‌های کلیوی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، بیماری‌های مزمن تنفسی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، بیماری‌های گوارشی (زنان در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷ و مردان در سال ۲۰۱۰) و سوانح غیرعمدی (زنان در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷ و مردان در سال ۲۰۱۷) واجد رتبه‌ی ده و کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

از نظر شیوع مشکلات سلامتی در سالمندان ساکن استان آذربایجان شرقی، این گروه جمعیتی در بیماری‌های قلبی-عروقی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، اختلالات عصبی (زنان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۷) و دیابت و بیماری‌های کلیوی (زنان در سال ۲۰۱۰)، بیماری‌های مزمن تنفسی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) و سوانح غیرعمدی (زنان در سال ۱۹۹۰)، واجد رتبه‌ی ده و کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، سکته، عفونت‌های تنفسی تحتانی و افتادن کاهشی و برای بیماری آلزایمر و دیابت نوع دو افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری ایسکمیک قلب در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان آذربایجان شرقی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر و به علت بیماری آلزایمر، دیابت نوع دو و عفونت‌های تنفسی تحتانی بیشتر بوده است. میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری ایسکمیک قلب و سکته در مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان آذربایجان شرقی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر و به علت دیابت نوع دو و عفونت‌های تنفسی تحتانی بیشتر بوده است.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع به علت مشکلات سلامتی در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، افتادن، سکته و آلزایمر کاهشی و برای اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی و بیماری مزمن انسدادی ریه افزایشی است. میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع برای مشکلات سلامتی اختلالات روانی، سکته و بیماری آلزایمر در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان آذربایجان شرقی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر و برای بیماری ایسکمیک قلب و بیماری مزمن انسدادی ریه بیشتر بوده است.




تعداد و میزان^۱ مرگ به تفکیک گروه سنی در سال ۲۰۱۷ در استان

گروه سنی	جنسیت	همه علل		بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای		بیماری‌های غیرواگیر		سوانح و حوادث	
		تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان
همه سنین	هر دو	۲۱۲۳۳	۵۲۶/۸	۱۰۶۹	۲۶/۵	۱۸۰۸۶	۴۴۸/۷	۲۰۷۹	۵۱/۶
	زنان	۹۱۲۰	۴۶۰/۸	۴۶۸	۲۳/۷	۸۱۴۵	۴۱۱/۶	۵۰۶	۲۵/۶
	مردان	۱۲۱۱۴	۵۹۰/۴	۶۰۰	۲۹/۳	۹۹۴۱	۴۸۴/۵	۱۵۷۲	۷۶/۶
کمتر از ۶۰ سال	هر دو	۵۷۹۸	۱۶۱/۲	۶۲۹	۱۷/۵	۳۵۷۴	۹۹/۴	۱۵۹۵	۴۴/۴
	زنان	۱۹۷۱	۱۱۲/۱	۲۶۹	۱۵/۳	۱۳۵۵	۷۷	۳۴۷	۱۹/۷
	مردان	۳۸۲۷	۲۰۸/۳	۳۶۱	۱۹/۶	۲۲۱۸	۱۲۰/۷	۱۲۴۸	۶۷/۹
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۵۴۳۵	۳۵۵۳/۴	۴۳۹	۱۰/۱	۱۴۵۱۳	۳۳۴۱/۱	۴۸۳	۱۱۱/۲
	زنان	۷۱۴۹	۳۲۴۶/۵	۱۹۹	۹۰/۶	۶۷۹۰	۳۰۸۳/۷	۱۵۹	۷۲/۲
	مردان	۸۲۸۶	۳۸۶۹/۱	۲۴۰	۱۱۱/۹	۷۷۲۲	۳۶۰۵/۸	۳۲۴	۱۵۱/۴
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۱۴۴۲	۹۴۸/۵	۳۷	۲۴/۲	۱۳۰۱	۸۵۶	۱۰۴	۶۸/۴
	زنان	۵۶۴	۷۴۰/۱	۱۵	۲۰/۱	۵۲۱	۶۸۴	۲۷	۳۶/۱
	مردان	۸۷۸	۱۱۵۸/۱	۲۱	۲۸/۳	۷۸۰	۱۰۲۹	۷۶	۱۰۰/۹
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۱۵۰۳	۱۵۷۴/۶	۳۸	۳۹/۸	۱۳۸۹	۱۴۵۵/۴	۷۶	۷۹/۴
	زنان	۶۵۰	۱۲۹۲	۱۷	۳۳/۶	۶۱۰	۱۲۱۲	۲۳	۴۶/۵
	مردان	۸۵۳	۱۸۸۹/۳	۲۱	۴۶/۷	۷۸۰	۱۷۲۶/۵	۵۲	۱۱۶/۱
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۱۹۳۷	۲۷۴۷/۹	۵۰	۷۰/۶	۱۸۱۵	۲۵۷۳/۷	۷۳	۱۰۳/۵
	زنان	۸۸۱	۲۴۲۲/۲	۲۳	۶۲/۳	۸۳۵	۲۲۹۴/۲	۲۴	۶۵/۷
	مردان	۱۰۵۶	۳۰۹۵/۳	۲۷	۷۹/۵	۹۸۰	۲۸۷۱/۹	۴۹	۱۴۳/۸
۷۵ تا ۷۹ سال	هر دو	۲۷۱۶	۴۸۲۲/۸	۷۲	۱۲۷/۳	۲۵۷۰	۴۵۶۲/۷	۷۵	۱۳۲/۸
	زنان	۱۲۶۷	۴۵۶۶	۳۲	۱۱۳/۵	۱۲۱۰	۴۳۵۹/۴	۲۶	۹۳/۱
	مردان	۱۴۴۹	۵۰۷۲/۲	۴۰	۱۴۰/۷	۱۳۶۰	۴۷۶۰/۲	۴۹	۱۷۱/۳
۸۰ سال و بالاتر	هر دو	۷۸۳۶	۱۳۰۵۱/۴	۲۴۳	۴۰۴/۶	۷۴۳۷	۱۲۳۸۷/۶	۱۵۶	۲۵۹/۲
	زنان	۳۷۸۶	۱۲۸۱۹/۸	۱۱۳	۳۸۲/۹	۳۶۱۵	۱۲۲۳۹/۵	۵۸	۱۹۷/۳
	مردان	۴۰۵۰	۱۳۲۷۵/۷	۱۳۰	۴۲۵/۶	۳۸۲۳	۱۲۵۳۱	۹۷	۳۱۹/۱

امید زندگی (سال) در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ در استان

جنسیت	بدو تولد		۶۰ تا ۶۴ سال		۶۵ تا ۶۹ سال		۷۰ تا ۷۴ سال		۷۵ تا ۷۹ سال		۸۰ سال و بالاتر	
	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰
زنان	۶۶/۷	۸۱/۲	۱۴/۷	۲۴/۸	۱۱/۱	۲۰/۶	۷/۹	۱۶/۸	۵/۲	۱۳/۵	۳/۹	۱۰/۸
مردان	۶۳/۹	۷۵/۲	۱۴/۲	۲۱/۲	۱۰/۸	۱۷/۵	۷/۸	۱۴/۵	۵/۳	۱۱/۳	۴/۲	۹

روند زمانی تعداد در مقابل میزان استاندارد شده سنی مرگ در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سطح ملی و استان



^۱ در این گزارش تمامی میزان‌ها در ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت گزارش شده‌اند.




میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

علت ^۲	مردان								زنان							
	۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰		۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰	
	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه ^۳	میزان
بیماری‌های قلبی-عروقی	۱۰	۲۲۱۵	۱۴	۲۱۷۶/۹	۱۲	۲۶۰۲	۱۵	۳۰۲۸/۷	۷	۲۱۷۲/۴	۱۲	۲۲۳۶/۸	۱۱	۲۵۵۳/۲	۱۲	۳۰۱۱/۹
سرطان‌ها	۵	۸۰۷/۲	۴	۷۳۴/۵	۱۰	۵۶۴/۸	۱۱	۷۱۵/۴	۷	۴۸۹/۹	۳	۴۵۸/۹	۷	۳۶۴/۵	۸	۴۴۷/۶
اختلالات عصبی	۳	۴۳۲/۳	۴	۳۳۵/۶	۹	۲۶۲/۹	۱۰	۳۰۰	۳	۴۶۷/۷	۲	۴۲۳/۸	۷	۳۲۳/۶	۷	۳۵۷/۷
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۸	۲۸۸/۲	۸	۲۶۱/۶	۷	۲۰۴	۸	۲۱۳/۵	۷	۳۱۴/۷	۷	۲۸۷/۷	۸	۲۲۵/۶	۸	۲۲۴/۲
بیماری‌های مزمن تنفسی	۳	۳۱۰/۹	۴	۳۱۹/۲	۴	۳۵۶/۲	۸	۴۱۹/۷	۴	۲۴۲/۵	۳	۲۵۸/۱	۳	۲۹۹/۸	۵	۳۰۵/۸
بیماری‌های گوارشی	۱۴	۱۱۲/۹	۱۰	۱۱۵	۱۷	۹۵/۲	۱۸	۱۲۷/۶	۹	۱۰۱/۳	۷	۱۰۷/۹	۱۳	۸۲	۱۳	۱۰۸/۷
سوانح حمل و نقل	۱۶	۹۰/۱	۲۱	۱۰۲/۸	۱۹	۱۱۵/۲	۲۳	۱۲۶/۱	۲۱	۳۴/۹	۱۹	۴۲	۲۳	۳۹/۶	۲۵	۴۱/۴
سوانح غیرعمدی	۱۰	۵۷/۸	۱۳	۵۸/۶	۱۷	۶۳/۱	۲۱	۷۶/۴	۹	۴۱/۶	۹	۴۳/۵	۱۶	۴۲	۱۴	۵۳/۲

میزان استاندارد شده سنی **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

مشکل سلامتی	مردان								زنان							
	۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰		۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰	
	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه ^۴	میزان
بیماری‌های قلبی-عروقی	۸	۳۱۶۴۲/۴	۹	۳۲۲۸۰/۱	۶	۳۲۲۵۲/۱	۵	۳۲۶۴۲/۱	۸	۳۳۱۷۸/۷	۷	۳۲۸۲۱/۶	۶	۳۳۱۷۶/۸	۳	۳۴۲۰۷/۷
سرطان‌ها	۱۶	۳۵۶۵/۲	۱۵	۲۹۷۶	۲۰	۱۹۰۸/۲	۱۶	۱۸۵۹/۹	۲۲	۲۱۳۳/۷	۲۰	۱۸۸۱/۱	۲۰	۱۲۵۹/۲	۱۴	۱۲۹۲/۱
اختلالات عصبی	۱۰	۵۲۱۴۷	۱۴	۵۲۱۴۷/۸	۹	۵۲۰۰۸/۱	۹	۵۱۲۹۷/۳	۸	۵۸۲۲۷/۹	۱۴	۵۸۲۱۳/۷	۱۲	۵۷۶۰۴/۳	۸	۵۷۲۶۴/۸
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۱۲	۴۷۶۷۶/۳	۱۱	۴۳۱۴۲/۷	۱۱	۴۱۲۴۲/۸	۱۳	۴۰۲۶۲	۱۳	۵۸۳۷۴/۴	۸	۵۲۵۹۳/۴	۱۱	۴۹۸۲۹/۹	۱۳	۴۹۱۰۱/۴
بیماری‌های مزمن تنفسی	۵	۱۴۲۶۱/۹	۵	۱۴۳۶۴	۴	۱۵۰۸۳/۷	۳	۱۷۱۲۶/۵	۵	۱۷۲۹۶/۸	۴	۱۸۶۰۳/۷	۲	۱۹۰۳۰/۳	۲	۲۰۲۷۷/۲
بیماری‌های گوارشی	۱۵	۶۶۵۷۵/۴	۱۵	۶۳۳۳۶/۶	۲۸	۵۹۱۸۰/۹	۲۹	۵۶۹۹۱/۴	۲۶	۵۲۸۶۳/۷	۲۵	۵۰۸۹۶	۳۰	۴۶۷۰۷	۳۰	۴۵۵۶۶/۴
سوانح حمل و نقل	۲۰	۹۲۳۵/۷	۲۴	۱۰۷۵۹/۶	۲۰	۱۱۱۱۰/۸	۱۸	۱۱۸۹۱/۲	۲۳	۵۹۴۲/۳	۲۲	۶۹۵۸/۸	۲۴	۶۵۷۰/۶	۲۱	۷۱۶۴/۱
سوانح غیرعمدی	۲۲	۲۹۱۳۱/۶	۲۴	۳۰۳۰۳/۹	۱۹	۲۸۴۰۹/۲	۱۳	۳۳۲۹۷/۴	۲۴	۲۱۶۴۸/۶	۲۰	۲۰۸۸۹/۷	۱۴	۲۰۰۰۹/۶	۱۰	۲۳۹۱۹/۵

میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی و **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سال ۲۰۱۷ در سطح ملی و استان




^۲ علل براساس میزان استاندارد شده سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ و هر دو جنسیت در سطح ملی مرتب شده‌اند.


^۳ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی مرگ به تفکیک علت، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.

^۴ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی شیوع به تفکیک مشکل سلامتی، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.







جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۸۸۲/۳	۱۶۲۳	۱۰۹۲/۱	۱۱۱۷/۲
زنان	۱۷۶۴	۱۵۲۰/۳	۱۰۳۲/۳	۱۰۴۳/۷
مردان	۱۹۷۸/۵	۱۷۱۰/۶	۱۱۵۱/۹	۱۱۹۴/۷




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۸۹۵/۷	۷۳۸/۴	۵۴۵/۳	۴۸۵/۴
زنان	۹۵۳/۶	۷۸۰/۴	۵۷۶	۵۰۴/۶
مردان	۸۲۹/۶	۶۹۶	۵۱۷/۴	۴۶۷/۲




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۹۲/۷	۲۶۰/۵	۳۳۴/۶	۴۰۱/۷
زنان	۳۲۷/۴	۲۹۶	۳۸۷/۹	۴۳۰/۴
مردان	۲۵۳/۴	۲۲۰/۷	۲۸۳/۶	۳۷۳/۵



جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۸۲/۵	۹۶/۵	۱۲۹/۳	۱۲۸/۲
زنان	۹۱/۷	۱۱۱/۱	۱۴۴/۶	۱۴۵/۴
مردان	۷۳/۸	۸۴/۱	۱۱۴/۹	۱۱۰/۹




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۰۲	۸۸/۳	۹۸/۸	۹۶/۶
زنان	۹۷/۳	۸۳/۸	۹۴/۴	۹۰/۱
مردان	۱۰۶/۶	۹۲/۲	۱۰۲/۹	۱۰۳/۱




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۲/۹	۲۰/۳	۲۲/۲	۲۱/۳
زنان	۱۵/۶	۱۳/۹	۱۸/۶	۱۷/۷
مردان	۲۹/۵	۲۶	۲۵/۶	۲۴/۹




Ischemic heart disease
Female Male




Stroke
Female Male




Alzheimer's disease and other dementias
Female Male




Diabetes mellitus type 2
Female Male




Lower respiratory infections
Female Male




Falls
Female Male







اختلالات افسردگی				اختلالات اضطرابی				جنسیت
۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	
۵۸۶۰	۵۷۴۳/۳	۵۵۱۸/۸	۵۶۲۳/۲	۶۴۸۸/۵	۶۶۱۹/۶	۶۳۷۳/۴	۶۳۷۷/۱	هر دو
۶۸۵۹/۴	۶۷۴۹	۶۵۱۷/۳	۶۶۴۱/۲	۸۲۰۴/۷	۸۳۹۳/۷	۸۲۵۲/۸	۸۲۷۱/۴	زنان
۴۸۲۵/۸	۴۷۲۹/۷	۴۶۴۰/۱	۴۷۶۱/۱	۴۷۱۷/۷	۴۸۴۴	۴۷۲۳	۴۷۵۲/۷	مردان




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۱۸۱۱/۷	۱۱۸۴۷/۴	۱۱۷۴۵/۲	۱۰۹۷۱
زنان	۱۱۲۳۳/۳	۱۱۳۷۲/۲	۱۱۳۷۴/۸	۱۰۶۹۰/۱
مردان	۱۲۲۴۹/۸	۱۲۲۶۰	۱۲۱۰۴/۹	۱۱۲۵۷/۸




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۹۴۳۶/۱	۷۹۳۹/۳	۸۸۶۰/۲	۸۵۱۳/۲
زنان	۷۳۷۳/۷	۶۲۴۶/۸	۷۰۰۵/۲	۷۳۳۸/۱
مردان	۱۱۲۲۸/۷	۹۴۲۳/۳	۱۰۶۹۷/۴	۹۷۲۳/۵



جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۸۸۷۱/۷	۸۴۴۴/۴	۸۹۵۲/۱	۹۳۰۴/۶
زنان	۱۰۰۴۳/۶	۹۹۰۳/۴	۱۰۳۹۳/۹	۱۰۱۵۸/۱
مردان	۷۸۵۱/۵	۷۲۰۴/۶	۷۵۵۴/۶	۸۴۲۹/۷




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۸۱۳۷/۴	۷۱۹۸/۸	۷۰۲۰/۳	۷۱۵۹/۲
زنان	۹۲۷۴	۷۷۶۹/۶	۷۳۴۷/۵	۷۹۰۴/۴
مردان	۷۰۹۳/۹	۶۶۹۴	۶۶۹۶	۶۴۰۱/۶




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۵۵۸۵	۵۵۰۹/۷	۵۳۴۳/۸	۵۳۰۹/۳
زنان	۵۸۱۴/۲	۵۷۶۹/۵	۵۶۰۳/۶	۵۵۶۴/۸
مردان	۵۳۵۹/۹	۵۲۸۳/۸	۵۱۰۱	۵۰۵۴/۲




Mental disorders
Female Male




Ischemic heart disease
Female Male




Falls
Female Male




Chronic obstructive pulmonary disease
Female Male



Stroke
Female Male



Alzheimer's disease and other dementias
Female Male



سیمای سلامت سالمندان

استان آذربایجان غربی

میزان مرگ و شیوع بیماری ها



سیمای سلامت سالمندان

استان آذربایجان غربی

(میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها در کل جمعیت، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (کمتر از ۶۰ سال) ساکن در استان آذربایجان غربی و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس و گروه‌های سنی بیان شده است. به منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی حاوی: اطلاعات مقایسه‌ای با شاخص کل کشور و مقایسه با استان‌های مجاور استان آذربایجان غربی شامل: استان‌های آذربایجان شرقی، کردستان و زنجان نیز تدوین و ترسیم شده است.

آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر این مطلب است که شایع‌ترین علل مرگ در سالمندان ساکن استان آذربایجان غربی (هر دو جنس) براساس میزان در سال ۲۰۱۷، به ترتیب بیماری‌های غیرواگیر، سوانح و حوادث و بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای است. این شاخص در افراد غیر سالمند ساکن استان آذربایجان غربی دارای الگویی مشابه با سالمندان است.

روند زمانی تعداد مرگ به علت هر سه دسته اصلی بیماری‌ها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ در حال افزایش است. سالمندان ساکن در استان آذربایجان غربی و در سال ۲۰۱۷ از لحاظ میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای از میانگین کشوری پایین‌تر و به علت بیماری‌های غیرواگیر بالاتر و به علت سوانح و حوادث تقریباً معادل میانگین کشوری بوده‌اند.

سالمندان ساکن استان آذربایجان غربی، از بین علل مختلف مرگ در بیماری‌های قلبی-عروقی (زنان در سال ۲۰۰۰ و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، اختلالات عصبی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، سرطان‌ها (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، اختلالات عصبی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، بیماری‌های مزمن تنفسی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، بیماری‌های گوارشی (مردان در سال ۲۰۱۰) و سوانح غیر عمدی (مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰) واجد رتبه‌ی ده و یا کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

از نظر شیوع مشکلات سلامتی در سالمندان ساکن استان آذربایجان غربی، این گروه جمعیتی در بیماری‌های قلبی-عروقی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، اختلالات عصبی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ و مردان در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، بیماری‌های مزمن تنفسی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، بیماری‌های گوارشی (مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) و سوانح غیر عمدی (مردان در سال ۱۹۹۰) یکی از ده استان دارای بالاترین شیوع در کل کشور بوده‌اند. روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، سکته، عفونت‌های تنفسی تحتانی و افتادن کاهشی و برای بیماری آلزایمر و دیابت نوع دو افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت افتادن در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان آذربایجان غربی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر و به علت بیماری آلزایمر در مردان بیشتر بوده است.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع به علت مشکلات سلامتی در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، افتادن، بیماری مزمن انسدادی ریه، سکته و بیماری آلزایمر کاهشی و برای اختلالات اضطرابی و اختلالات افسردگی افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع برای اختلالات روانی در زنان و مردان و برای سکته و بیماری آلزایمر در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان آذربایجان غربی در سال ۲۰۱۷ نسبت به تمام استان‌های مجاور بیشتر و برای افتادن در زنان و مردان کمتر بوده است.




تعداد و میزان^۱ مرگ به تفکیک گروه سنی در سال ۲۰۱۷ در استان

گروه سنی	جنسیت	همه علل		بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای		بیماری‌های غیرواگیر		سوانح و حوادث	
		تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان
همه سنین	هر دو	۱۴۸۶۴	۴۳۹/۴	۱۰۶۶	۳۱/۵	۱۲۰۸۲	۳۵۷/۲	۱۷۱۶	۵۰/۷
	زنان	۶۳۵۲	۳۸۱/۶	۴۶۹	۲۸/۲	۵۴۱۱	۳۲۵	۴۷۲	۲۸/۴
	مردان	۸۵۱۱	۴۹۵/۵	۵۹۶	۳۴/۷	۶۶۷۱	۳۸۸/۳	۱۲۴۴	۷۲/۴
کمتر از ۶۰ سال	هر دو	۵۰۹۹	۱۶۴/۹	۸۰۵	۲۶	۲۸۸۲	۹۳/۲	۱۴۱۱	۴۵/۶
	زنان	۱۸۸۱	۱۲۴/۳	۳۵۶	۲۳/۶	۱۱۵۰	۷۶	۳۷۵	۲۴/۸
	مردان	۳۲۱۸	۲۰۳/۸	۴۴۹	۲۸/۴	۱۷۳۳	۱۰۹/۷	۱۰۳۷	۶۵/۷
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۹۷۶۵	۳۳۵/۷	۲۶۱	۸۹/۷	۹۲۰۰	۳۱۶۲/۶	۳۰۵	۱۰۴/۸
	زنان	۴۴۷۲	۲۹۴۳/۳	۱۱۳	۷۴/۴	۴۲۶۱	۲۸۰۴/۷	۹۸	۶۴/۲
	مردان	۵۲۹۳	۳۸۰۹/۴	۱۴۸	۱۰۶/۴	۴۹۳۸	۳۵۵۳/۹	۲۰۷	۱۴۹/۱
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۱۰۵۶	۹۸۶/۸	۲۴	۲۲/۲	۹۶۲	۸۹۸/۳	۷۱	۶۶/۴
	زنان	۳۹۶	۷۲۴/۷	۹	۱۶/۵	۳۶۹	۶۷۴/۷	۱۸	۳۳/۶
	مردان	۶۶۰	۱۲۶۰/۴	۱۵	۲۸/۱	۵۹۳	۱۱۳۱/۷	۵۳	۱۰۰/۶
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۱۱۷۴	۱۷۷۵/۷	۲۷	۴۰/۱	۱۰۹۲	۱۶۵۱/۲	۵۶	۸۴/۴
	زنان	۴۹۸	۱۴۰۷/۱	۱۱	۳۱/۳	۴۷۰	۱۳۲۶/۸	۱۷	۴۹
	مردان	۶۷۶	۲۲۰۰/۱	۱۵	۵۰/۳	۶۲۲	۲۰۲۴/۶	۳۸	۱۲۵/۲
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۱۱۸۲	۲۶۶۰/۵	۲۹	۶۵/۱	۱۱۱۱	۲۵۰۰/۷	۴۲	۹۴/۷
	زنان	۵۵۹	۲۳۴۰/۶	۱۳	۵۵/۲	۵۳۲	۲۲۲۵/۱	۱۴	۶۰/۳
	مردان	۶۲۲	۳۰۳۳/۱	۱۶	۷۶/۷	۵۷۹	۲۸۲۱/۷	۲۸	۱۳۴/۷
۷۵ تا ۷۹ سال	هر دو	۱۶۱۲	۴۸۰۱/۵	۴۰	۱۱۸/۴	۱۵۲۸	۴۵۵۰/۲	۴۵	۱۳۲/۹
	زنان	۷۳۳	۴۲۸۵/۳	۱۷	۱۰۰/۱	۷۰۲	۴۱۰۲/۷	۱۴	۸۲/۵
	مردان	۸۷۹	۵۳۳۸/۲	۲۳	۱۳۷/۴	۸۲۶	۵۰۱۵/۴	۳۱	۱۸۵/۴
۸۰ سال و بالاتر	هر دو	۴۷۴۱	۱۱۹۳۳	۱۴۲	۳۵۷/۲	۴۵۰۸	۱۱۳۴۶/۲	۹۱	۲۲۹/۶
	زنان	۲۲۸۵	۱۰۹۵۳/۹	۶۳	۳۰۰/۲	۲۱۸۹	۱۰۴۹۳/۸	۳۳	۱۵۹/۹
	مردان	۲۴۵۶	۱۳۰۱۵/۵	۷۹	۴۲۰/۳	۲۳۱۹	۱۲۲۸۸/۶	۵۸	۳۰۶/۶

امید زندگی (سال) در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ در استان

جنسیت	بدو تولد		۶۰ تا ۶۴ سال		۶۵ تا ۶۹ سال		۷۰ تا ۷۴ سال		۷۵ تا ۷۹ سال		۸۰ سال و بالاتر	
	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰
زنان	۶۴/۹	۸۴/۲	۱۳/۴	۲۸	۹/۸	۲۳/۸	۶/۷	۲۰	۳/۶	۱۶/۸	۲/۵	۱۴/۱
مردان	۶۲/۲	۷۶/۳	۱۳/۳	۲۲/۴	۹/۸	۱۸/۷	۷	۱۵/۵	۴/۲	۱۲/۶	۳/۴	۱۰/۲

روند زمانی تعداد در مقابل میزان استاندارد شده سنی مرگ در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سطح ملی و استان



^۱ در این گزارش تمامی میزان‌ها در ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت گزارش شده‌اند.




میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

علت ^۲	زنان								مردان							
	۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷		۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷	
	میزان	رتبه ^۳	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه
بیماری‌های قلبی-عروقی	۲۹۹۰/۸	۱۴	۲۵۷۲/۴	۱۰	۲۰۲۸/۲	۱۷	۱۹۷۷/۶	۱۷	۳۳۷۱	۸	۲۹۸۹/۵	۶	۲۴۵۳/۷	۳	۲۳۵۶/۶	۴
سرطان‌ها	۴۸۶/۳	۴	۴۱۷/۶	۵	۴۵۳/۹	۵	۴۷۳/۵	۹	۹۴۵/۹	۱	۷۹۶/۹	۱	۸۸۳/۲	۱	۹۱۲/۹	۱
اختلالات عصبی	۳۸۰/۹	۵	۳۴۵/۲	۵	۴۲۲/۸	۳	۴۱۱	۱۰	۳۹۹/۸	۱	۳۷۷/۲	۱	۴۱۰/۴	۱	۴۴۵/۱	۲
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۱۶۹/۶	۱۸	۱۶۷/۹	۱۵	۱۷۸/۳	۲۲	۲۱۶/۴	۲۲	۱۸۲/۶	۱۷	۱۷۹/۷	۱۱	۱۹۶/۶	۱۷	۲۲۳/۵	۱۸
بیماری‌های مزمن تنفسی	۲۶۴/۵	۶	۲۶۱/۹	۶	۱۹۶/۲	۸	۱۶۵/۹	۹	۴۶۴/۴	۴	۴۰۹/۷	۳	۳۱۰/۷	۶	۲۷۱/۴	۶
بیماری‌های گوارشی	۱۰۰/۶	۱۹	۷۶/۹	۱۷	۸۷/۵	۱۶	۸۰/۲	۱۶	۱۴۱/۳	۱۵	۱۱۲/۷	۱۱	۱۱۶	۸	۱۱۰/۴	۱۵
سوانح حمل و نقل	۴۰/۲	۲۶	۳۷/۲	۲۴	۳۳/۶	۲۷	۳۰	۲۶	۱۲۸/۵	۲۱	۱۱۵	۲۰	۱۰۰/۱	۲۲	۹۰/۱	۱۷
سوانح غیرعمدی	۵۲/۳	۱۶	۴۰/۴	۱۸	۳۵/۵	۲۵	۳۱/۸	۲۸	۸۶/۴	۱۰	۷۱/۷	۶	۶۰/۳	۸	۵۵/۶	۱۱

میزان استاندارد شده سنی **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

مشکل سلامتی	زنان								مردان							
	۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷		۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷	
	میزان	رتبه ^۴	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه
بیماری‌های قلبی-عروقی	۳۳۸۷۶/۲	۶	۳۲۸۶۳	۸	۳۲۶۶۹/۶	۸	۳۳۰۴۷/۸	۹	۳۲۰۴۵/۷	۱۰	۳۱۶۵۱/۴	۱۰	۳۲۰۶۷/۷	۱۰	۳۱۳۵۸/۹	۱۰
سرطان‌ها	۱۲۹۲/۶	۱۳	۱۲۹۳/۹	۱۷	۱۷۲۸	۲۶	۱۹۵۲/۴	۲۷	۲۰۲۱/۶	۱۲	۲۰۹۵/۴	۱۴	۲۸۶۳/۵	۲۱	۳۳۲۸/۹	۲۳
اختلالات عصبی	۵۷۲۷۶/۱	۴	۵۷۶۱۱/۶	۹	۵۸۲۱۵/۳	۱۲	۵۸۲۱۳/۹	۱۶	۵۱۳۲۲/۷	۳	۵۲۰۱۲/۶	۸	۵۲۱۶۶/۴	۶	۵۲۱۴۷/۹	۷
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۴۷۴۸۹/۱	۲۲	۴۷۹۲۲/۲	۲۱	۵۰۰۱۳/۱	۲۲	۵۶۵۸۰/۷	۲۱	۳۸۸۰۰/۸	۱۹	۳۹۸۰۳/۶	۱۶	۴۱۳۰۷/۲	۱۷	۴۶۱۹۱/۴	۱۷
بیماری‌های مزمن تنفسی	۱۹۸۲۰/۹	۳	۱۸۴۴۵/۴	۵	۱۸۰۸۰/۸	۶	۱۶۱۰۴/۱	۹	۱۷۹۰۵/۳	۲	۱۵۷۹۶/۸	۳	۱۴۸۹۴/۶	۳	۱۳۷۲۳/۸	۶
بیماری‌های گوارشی	۴۶۷۲۵/۹	۱۲	۴۷۹۰۷/۹	۱۳	۵۱۲۸۸/۱	۱۷	۵۳۱۸۷/۹	۱۶	۵۸۰۰۱/۷	۹	۶۰۲۳۲/۶	۷	۶۳۵۴۷/۳	۸	۶۶۷۶۳/۱	۶
سوانح حمل و نقل	۶۸۸۱/۴	۲۵	۶۳۱۴/۳	۲۸	۶۶۶۳/۷	۲۵	۵۸۶۶/۴	۲۶	۱۱۷۳۴/۹	۲۰	۱۰۹۷۶/۱	۲۴	۱۰۷۳۶/۷	۲۶	۹۱۴۷/۳	۲۶
سوانح غیرعمدی	۲۳۸۲۹	۱۲	۲۰۱۶۶/۳	۱۳	۲۱۲۲۶/۳	۱۴	۲۱۵۲۳/۷	۲۵	۳۳۹۸۹/۷	۱۰	۲۹۳۲۱/۶	۱۴	۳۱۴۶۴/۲	۱۹	۲۸۹۹۴/۱	۲۳

میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی و **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سال ۲۰۱۷ در سطح ملی و استان




^۲ علل براساس میزان استاندارد شده سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ و هر دو جنسیت در سطح ملی مرتب شده‌اند.


^۳ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی مرگ به تفکیک علت، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.

^۴ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی شیوع به تفکیک مشکل سلامتی، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.







جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۹۹۴/۲	۱۷۷۲/۹	۱۲۱۷/۸	۱۲۳۵/۹
زنان	۱۷۷۳/۹	۱۵۶۱/۵	۱۰۴۳/۴	۱۰۹۴/۷
مردان	۲۲۱۸/۳	۱۹۸۴/۵	۱۳۹۸/۱	۱۴۰۰/۹




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۸۰۱/۸	۶۶۹/۳	۵۱۶/۵	۴۸۱/۱
زنان	۸۱۹/۱	۶۷۲/۸	۴۸۶/۸	۴۶۱/۵
مردان	۷۸۵/۶	۶۶۹/۴	۵۴۶/۸	۵۰۶/۴




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۳۴۸/۹	۳۲۲/۷	۳۷۵/۶	۳۸۱/۸
زنان	۳۵۲/۳	۳۱۸/۶	۳۹۲/۱	۳۷۹/۳
مردان	۳۴۸/۹	۳۲۸/۷	۳۵۶/۲	۳۸۹/۲



جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۳۰/۵	۳۷/۵	۵۰	۷۵/۸
زنان	۳۲/۱	۴۰/۹	۵۴	۸۶/۷
مردان	۲۹/۲	۳۴/۶	۴۵/۹	۶۴




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۹۴/۲	۸۳	۸۲/۷	۸۲/۲
زنان	۸۱/۶	۷۰/۴	۶۷/۹	۶۶/۹
مردان	۱۰۸/۲	۹۶/۴	۹۸	۱۰۰/۴




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۹/۸	۱۷/۵	۱۶/۹	۱۵/۷
زنان	۱۲/۱	۱۰/۸	۱۱/۷	۱۰/۹
مردان	۲۷/۳	۲۳/۹	۲۲/۳	۲۱/۲




Ischemic heart disease
Female Male




Stroke
Female Male




Alzheimer's disease and other dementias
Female Male




Diabetes mellitus type 2
Female Male





Lower respiratory infections
Female Male





Falls
Female Male







اختلالات افسردگی				اختلالات اضطرابی				جنسیت
۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	
۶۳۷۳/۴	۶۲۵۱/۶	۶۰۶۱/۲	۶۱۰۷/۵	۶۵۴۳/۸	۶۶۸۱/۹	۶۳۸۵/۷	۶۳۸۷/۸	هر دو
۷۳۹۷/۳	۷۲۸۴/۵	۷۱۳۴/۵	۷۱۷۲/۵	۸۲۰۴/۷	۸۳۹۳/۷	۸۲۵۲/۸	۸۲۷۱/۴	زنان
۵۲۴۸/۷	۵۱۳۶/۲	۵۱۰۴/۷	۵۱۹۴/۴	۴۷۱۷/۷	۴۸۴۴	۴۷۲۳	۴۷۵۲/۷	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۱۰۵۵۶/۲	۱۱۳۱۹/۷	۱۱۳۰۸	۱۱۳۰۰/۷	هر دو
۱۰۲۸۸/۵	۱۰۹۲۹/۷	۱۰۸۳۵/۵	۱۰۸۲۷/۱	زنان
۱۰۸۵۱	۱۱۷۲۸/۱	۱۱۷۳۰/۸	۱۱۷۳۵/۴	مردان



۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۱۹۰/۸	۸۴۹۶/۷	۷۳۹۹/۹	۸۶۴۶/۳	هر دو
۷۰۷۶/۲	۶۶۵۷/۶	۵۷۶۲/۲	۶۶۲۳/۶	زنان
۹۴۱۹/۵	۱۰۴۵۳/۹	۸۸۶۵/۳	۱۰۴۳۶/۸	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۳۶۲/۵	۸۸۰۳/۵	۸۴۶۴/۳	۸۹۴۴/۹	هر دو
۸۹۵۷/۹	۹۸۹۳/۴	۹۵۳۳/۲	۹۸۳۱/۷	زنان
۷۷۰۹/۷	۷۶۶۸/۶	۷۵۴۹/۳	۸۱۷۵/۷	مردان




۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۷۳۲۴/۵	۷۱۱۷/۵	۷۰۴۰/۵	۷۹۴۹/۳	هر دو
۷۹۹۸/۲	۷۳۷۴/۲	۷۶۵۰/۲	۹۱۰۰/۸	زنان
۶۵۸۲/۵	۶۸۳۶/۸	۶۴۹۶/۲	۶۸۹۱/۹	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۵۳۳۸/۵	۵۴۰۶/۹	۵۵۴۹/۵	۵۶۳۷/۶	هر دو
۵۵۸۳/۳	۵۶۵۸/۶	۵۸۱۰/۲	۵۸۶۱/۷	زنان
۵۰۶۶/۵	۵۱۴۷/۱	۵۳۱۱/۶	۵۴۱۲/۵	مردان




وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
آدریس سلامت استان


Mental disorders
Female Male




Ischemic heart disease
Female Male




Falls
Female Male




Chronic obstructive pulmonary disease
Female Male



Stroke
Female Male



Alzheimer's disease and other dementias
Female Male



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
آمار و سلامت سالان

سیمای سلامت سالمندان

استان اردبیل

میزان مرگ و شیوع بیماری ها



سیمای سلامت سالمندان

استان اردبیل

(میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها در کل جمعیت، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (کمتر از ۶۰ سال) ساکن در استان اردبیل و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس و گروه‌های سنی بیان شده است. به منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی حاوی: اطلاعات مقایسه‌ای با شاخص کل کشور و مقایسه با استان‌های مجاور استان اردبیل شامل: استان‌های آذربایجان شرقی، گیلان و زنجان نیز تدوین و ترسیم شده است.

آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر این مطلب است که شایع‌ترین علل مرگ در سالمندان ساکن استان اردبیل (هر دو جنس) براساس میزان در سال ۲۰۱۷، به ترتیب بیماری‌های غیرواگیر، سوانح و حوادث و بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای است. این شاخص در افراد غیر سالمند ساکن استان اردبیل دارای الگویی مشابه سالمندان است.

روند زمانی تعداد مرگ به علت هر سه دسته اصلی بیماری‌ها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ در حال افزایش است. سالمندان ساکن در استان اردبیل و در سال ۲۰۱۷ از لحاظ میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری‌های غیرواگیر از میانگین کشوری بالاتر و از لحاظ دو دسته‌ی دیگر پایین‌تر هستند. لازم به ذکر است تغییر ناگهانی که در تعداد و میزان مرگ به علت سوانح و حوادث اتفاق افتاده به علت زمین لرزه رخ داده در اسفند سال ۱۳۷۵ در این استان است.

سالمندان ساکن استان اردبیل، از بین علل مختلف مرگ در بیماری‌های قلبی-عروقی (زنان و مردان در سال ۲۰۱۷) و سرطان‌ها (زنان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) واجد رتبه‌ی ده و کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند. از نظر شیوع مشکلات سلامتی در سالمندان ساکن استان اردبیل، این گروه جمعیتی در بیماری‌های قلبی-عروقی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۱۰، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۷)، سرطان‌ها (زنان در سال ۲۰۱۷)، اختلالات عصبی (زنان در سال ۲۰۱۰) و سوانح غیرعمدی (زنان و مردان در سال ۲۰۱۷)، واجد رتبه‌ی ده و کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، سکته و افتادن کاهشی و برای بیماری آلزایمر و دیابت نوع دو افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت عفونت‌های تنفسی تحتانی در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان اردبیل نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر و برای بیماری ایسکمیک قلب بیشتر بوده است. میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری آلزایمر و عفونت‌های تنفسی تحتانی در مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان اردبیل نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر و برای بیماری ایسکمیک قلب بیشتر بوده است.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع به علت مشکلات سلامتی در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی، بیماری ایسکمیک قلب و بیماری آلزایمر کاهشی و برای افتادن، بیماری مزمن انسدادی ریه و سکته افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع برای بیماری مزمن انسدادی ریه در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان اردبیل نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر و برای اختلالات روانی بیشتر بوده است. میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع برای افتادن و بیماری مزمن انسدادی ریه در مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان اردبیل نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر بوده است.




تعداد و میزان^۱ مرگ به تفکیک گروه سنی در سال ۲۰۱۷ در استان

گروه سنی	جنسیت	همه علل		بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای		بیماری‌های غیرواگیر		سوانح و حوادث	
		تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان
همه سنین	هر دو	۷۱۵۸	۵۵۱/۳	۳۳۳	۲۵/۶	۶۲۲۷	۴۷۹/۶	۵۹۹	۴۶/۱
	زنان	۳۱۹۲	۵۰۳/۵	۱۴۲	۲۲/۴	۲۸۸۸	۴۵۵/۶	۱۶۲	۲۵/۶
	مردان	۳۹۶۶	۵۹۶/۹	۱۹۱	۲۸/۷	۳۳۳۹	۵۰۲/۵	۴۳۷	۶۵/۷
کمتر از ۶۰ سال	هر دو	۲۰۲۶	۱۷۲/۷	۲۴۰	۲۰/۵	۱۳۰۸	۱۱۱/۵	۴۷۸	۴۰/۸
	زنان	۷۴۴	۱۳۰/۸	۱۰۲	۱۷/۹	۵۲۳	۹۱/۸	۱۲۰	۲۱/۱
	مردان	۱۲۸۲	۲۱۲/۲	۱۳۸	۲۲/۹	۷۸۵	۱۳۰	۳۵۸	۵۹/۳
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۵۱۳۲	۴۰۹۲/۹	۹۳	۷۳/۸	۴۹۱۹	۳۹۲۲/۸	۱۲۱	۹۶/۳
	زنان	۲۴۴۸	۳۷۷۷/۸	۴۰	۶۲	۲۳۶۵	۳۶۵۰/۸	۴۲	۶۵
	مردان	۲۶۸۵	۴۴۲۹/۷	۵۲	۸۶/۴	۲۵۵۴	۴۲۱۳/۵	۷۹	۱۲۹/۷
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۴۹۸	۱۲۲۱/۴	۸	۲۰/۸	۴۶۴	۱۱۳۸/۱	۲۵	۶۲/۴
	زنان	۲۰۶	۹۶۳/۹	۴	۱۶/۵	۱۹۵	۹۱۲/۴	۷	۳۵
	مردان	۲۹۲	۱۵۰۴/۸	۵	۲۵/۵	۲۶۹	۱۳۸۶/۶	۱۸	۹۲/۷
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۵۱۳	۱۸۱۷/۴	۸	۲۸/۶	۴۸۵	۱۷۲۰/۷	۱۹	۶۸/۱
	زنان	۲۳۹	۱۵۵۶/۵	۴	۲۳/۹	۲۲۹	۱۴۹۰/۶	۶	۴۲
	مردان	۲۷۴	۲۱۲۸/۵	۴	۳۴/۱	۲۵۷	۱۹۹۵/۱	۱۳	۹۹/۲
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۶۵۵	۳۲۰۶/۴	۱۰	۵۰	۶۲۷	۳۰۶۹/۵	۱۸	۸۶/۹
	زنان	۳۱۷	۳۰۱۷/۵	۵	۴۵	۳۰۶	۲۹۱۱/۶	۶	۶۰/۹
	مردان	۳۳۸	۳۴۰۵/۹	۶	۵۵/۴	۳۲۲	۳۲۳۶/۳	۱۱	۱۱۴/۲
۷۵ تا ۷۹ سال	هر دو	۸۴۱	۵۵۱۴/۳	۱۳	۸۶/۶	۸۱۰	۵۳۱۱/۳	۱۸	۱۱۶/۵
	زنان	۴۰۲	۵۴۴۷/۵	۶	۷۹	۳۹۰	۵۲۸۲/۱	۶	۸۶/۴
	مردان	۴۳۹	۵۵۷۷	۷	۹۳/۷	۴۲۰	۵۳۳۸/۶	۱۱	۱۴۴/۷
۸۰ سال و بالاتر	هر دو	۲۶۲۶	۱۲۶۷۷/۸	۵۳	۲۵۴	۲۵۳۳	۱۲۲۲۸/۲	۴۱	۱۹۵/۶
	زنان	۱۲۸۴	۱۲۵۹۴/۲	۲۲	۲۲۰	۱۲۴۷	۱۲۲۲۳/۲	۱۵	۱۵۰/۹
	مردان	۱۳۴۱	۱۲۷۵۹	۳۰	۲۸۷	۱۲۸۶	۱۲۲۳۳	۲۵	۲۳۹

امید زندگی (سال) در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ در استان

جنسیت	بدو تولد		۶۰ تا ۶۴ سال		۶۵ تا ۶۹ سال		۷۰ تا ۷۴ سال		۷۵ تا ۷۹ سال		۸۰ سال و بالاتر	
	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰
زنان	۶۵/۷	۷۹/۵	۱۵	۲۲/۴	۱۱/۶	۱۸/۲	۸/۸	۱۴/۱	۶/۴	۱۰/۵	۶/۶	۷/۱
مردان	۶۳/۳	۷۴/۵	۱۴/۵	۱۹/۷	۱۱/۳	۱۶	۸/۶	۱۲/۴	۶/۷	۹	۶/۷	۵/۷

روند زمانی تعداد در مقابل میزان استاندارد شده سنی مرگ در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سطح ملی و استان



^۱ در این گزارش تمامی میزان‌ها در ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت گزارش شده‌اند.




میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

علت ^۲	مردان								زنان							
	۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰		۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰	
	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه ^۳	میزان
بیماری‌های قلبی-عروقی	۳	۲۴۵۸/۳	۱۷	۲۱۱۳	۲۷	۲۰۷۴	۱۸	۲۹۷۴/۱	۳	۲۳۶۰/۸	۲۹	۱۶۶۸/۳	۲۷	۱۹۲۱/۴	۱۸	۲۸۸۷/۴
سرطان‌ها	۲	۸۹۰/۵	۷	۷۲۷/۴	۱۴	۵۱۶/۶	۶	۷۶۳/۳	۱	۵۶۷/۶	۲۲	۳۶۳/۷	۱۸	۳۱۱/۸	۷	۴۶۴
اختلالات عصبی	۱۷	۳۱۳/۶	۲۷	۲۱۵/۶	۲۷	۱۶۸/۳	۲۶	۲۲۳/۷	۱۲	۳۸۷/۹	۳۰	۲۴۲/۴	۲۸	۱۸۹/۹	۲۱	۲۶۴/۲
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۱۵	۲۳۳/۸	۲۵	۱۶۴	۲۸	۱۱۰/۲	۲۵	۱۴۳/۵	۱۲	۲۷۴/۴	۲۶	۱۵۰/۱	۲۳	۱۲۵/۴	۲۱	۱۶۵/۶
بیماری‌های مزمن تنفسی	۲۱	۱۶۸/۲	۲۷	۱۴۹/۷	۲۷	۱۵۴/۶	۱۹	۲۴۲/۲	۱۶	۱۳۲/۶	۲۸	۱۰۰/۲	۲۵	۱۱۴/۷	۱۷	۱۶۱/۲
بیماری‌های گوارشی	۲۹	۸۲/۷	۳۰	۶۹/۷	۳۱	۵۸/۷	۲۷	۹۵/۳	۲۶	۶۹/۲	۳۱	۴۸/۱	۳۱	۴۶/۴	۲۶	۸۱/۳
سوانح حمل و نقل	۲۸	۶۱/۴	۲۹	۶۳/۴	۲۹	۶۸/۶	۲۹	۹۵/۳	۲۸	۲۷/۷	۳۰	۲۱/۴	۳۰	۲۲/۲	۳۰	۳۰/۱
سوانح غیرعمدی	۲۰	۵۱/۹	۲۶	۴۸/۵	۲۸	۴۷/۸	۲۷	۶۵/۸	۲۹	۳۱/۳	۳۱	۲۵/۱	۲۹	۲۸/۶	۲۷	۴۱/۹

میزان استاندارد شده سنی **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

مشکل سلامتی	مردان								زنان							
	۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰		۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰	
	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه ^۴	میزان
بیماری‌های قلبی-عروقی	۲	۳۳۸۴۰/۴	۳	۳۳۳۷۶/۴	۲	۳۳۰۵۱/۹	۳	۳۳۰۴۶/۸	۱	۳۴۸۴۵/۷	۳	۳۳۳۹۳/۷	۳	۳۳۴۹۳/۳	۷	۳۳۸۷۲/۳
سرطان‌ها	۱۱	۳۶۹۷/۴	۲۲	۲۸۴۱/۵	۲۸	۱۶۹۲	۱۹	۱۷۹۹/۶	۶	۲۴۴۹/۳	۳۱	۱۶۰۱/۴	۲۹	۱۱۳۴/۹	۱۵	۱۲۸۴/۴
اختلالات عصبی	۱۲	۵۲۱۴۳	۱۵	۵۲۱۴۶/۵	۱۲	۵۱۹۹۹/۹	۱۵	۵۱۲۷۷/۷	۱۴	۵۸۲۱۵/۱	۹	۵۸۲۱۷/۸	۲۱	۵۷۵۸۷/۹	۲۱	۵۷۳۴۵/۴
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۱۹	۴۶۱۴۶/۵	۲۴	۳۹۸۱۴/۶	۲۸	۳۷۹۹۳/۷	۲۶	۳۷۶۸۱/۱	۱۹	۵۷۲۷۲/۳	۲۴	۴۹۰۳۳/۸	۲۴	۴۶۷۶۵/۴	۲۳	۴۷۱۵۸/۴
بیماری‌های مزمن تنفسی	۲۴	۱۲۳۱۸/۲	۲۴	۱۱۸۶۵	۲۱	۱۱۹۷۷/۹	۲۳	۱۲۶۷۱/۷	۱۴	۱۵۲۷۴/۴	۲۵	۱۵۰۷۰/۸	۱۸	۱۴۹۹۰/۴	۲۱	۱۵۲۴۶/۶
بیماری‌های گوارشی	۲۲	۶۶۴۴۴/۱	۲۵	۶۳۰۲۵/۷	۲۲	۵۹۵۴۶	۲۲	۵۷۴۱۲/۵	۱۹	۵۳۰۴۲/۳	۲۷	۵۰۸۲۳/۱	۲۳	۴۷۵۲۹	۲۲	۴۶۳۶۸/۴
سوانح حمل و نقل	۲۸	۸۷۲۶/۷	۲۹	۹۸۷۷/۲	۲۹	۹۷۹۵	۲۹	۱۰۰۲۰/۷	۲۸	۵۶۹۵/۸	۳۰	۶۲۳۰/۶	۳۰	۵۹۶۲/۱	۳۰	۶۳۸۰
سوانح غیرعمدی	۱۰	۳۰۷۱۸/۷	۲۱	۳۱۲۰۰/۳	۲۵	۲۷۲۱۵/۵	۲۸	۲۹۳۳۵/۵	۹	۲۲۱۷۵/۵	۱۸	۲۱۰۴۴/۶	۲۰	۱۹۴۷۲/۹	۲۷	۲۱۱۷۰/۹

میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی و **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سال ۲۰۱۷ در سطح ملی و استان




^۲ علل براساس میزان استاندارد شده سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ و هر دو جنسیت در سطح ملی مرتب شده‌اند.


^۳ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی مرگ به تفکیک علت، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.

^۴ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی شیوع به تفکیک مشکل سلامتی، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.







جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۹۰۷/۶	۱۳۳۰/۳	۱۱۵۹	۱۴۴۹/۲
زنان	۱۷۸۰/۴	۱۲۲۴/۱	۹۷۳/۳	۱۳۶۹
مردان	۲۰۰۲/۵	۱۴۱۳/۸	۱۳۳۱/۹	۱۵۳۸/۹




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۷۱۴/۶	۴۵۷/۷	۳۹۹/۲	۵۰۰
زنان	۷۳۲/۵	۴۵۶/۳	۳۶۰/۶	۵۱۰/۱
مردان	۶۹۹/۵	۴۵۹/۹	۴۳۴/۴	۴۹۱/۶




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۱۶/۷	۱۵۶/۶	۱۹۹/۴	۳۰۸/۸
زنان	۲۴۱	۱۷۲/۳	۲۲۰/۸	۳۵۳/۶
مردان	۱۸۹/۷	۱۴۰/۷	۱۷۷/۳	۲۶۴/۱



جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۶	۲۶/۳	۴۴/۳	۸۳/۵
زنان	۲۸/۳	۳۰	۴۵/۴	۹۸/۱
مردان	۲۴/۱	۲۳/۳	۴۳/۲	۶۸/۷




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۴۷/۶	۳۲/۹	۳۴/۷	۴۷/۶
زنان	۴۱/۸	۲۷/۸	۲۶/۷	۳۹/۲
مردان	۵۳/۲	۳۷/۲	۴۱/۹	۵۶/۲




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۵/۷	۱۳/۴	۱۳/۱	۱۴
زنان	۹/۶	۸/۱	۷/۶	۸/۶
مردان	۲۱/۲	۱۷/۸	۱۸/۴	۱۹/۶




Ischemic heart disease
Female Male




Stroke
Female Male




Alzheimer's disease and other dementias
Female Male




Diabetes mellitus type 2
Female Male





Lower respiratory infections
Female Male





Falls
Female Male







اختلالات افسردگی				اختلالات اضطرابی				جنسیت
۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	
۶۳۶۷	۶۲۱۱/۵	۶۰۴۰	۶۰۷۹/۸	۶۵۲۴/۱	۶۶۱۷/۳	۶۳۳۲/۴	۶۳۲۷/۷	هر دو
۷۴۰۰	۷۲۸۶/۷	۷۱۳۵/۳	۷۱۹۰/۲	۸۲۰۴/۷	۸۳۹۳/۷	۸۲۵۲/۸	۸۲۷۱/۴	زنان
۵۲۴۷/۹	۵۱۳۰/۳	۵۱۱۸/۵	۵۱۹۱/۵	۴۷۱۷/۷	۴۸۴۴	۴۷۲۳	۴۷۵۲/۷	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۱۰۵۰۲/۵	۱۱۰۸۳/۹	۱۱۰۸۶/۲	۱۰۹۳۹/۲	هر دو
۱۰۲۵۳/۱	۱۰۷۳۴/۱	۱۰۷۱۰	۱۰۵۸۷/۷	زنان
۱۰۷۶۷/۹	۱۱۴۲۱	۱۱۴۰۱	۱۱۳۳۷/۲	مردان



۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۳۵۱/۳	۸۴۱۱/۳	۷۰۳۵/۹	۷۷۱۲/۲	هر دو
۷۰۷۰/۵	۶۳۱۲	۵۴۲۰/۷	۵۹۰۰/۵	زنان
۹۷۱۵	۱۰۴۷۵/۵	۸۳۷۵/۱	۹۲۰۵/۷	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۷۳۱۹/۷	۶۶۶۸/۲	۶۱۶۶	۵۹۴۲/۶	هر دو
۸۱۱۷/۱	۷۶۵۹/۲	۷۱۰۵/۹	۶۸۱۷/۷	زنان
۶۴۷۸/۳	۵۷۰۸/۵	۵۳۹۸/۳	۵۲۱۹/۲	مردان




۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۷۸۳۸/۱	۶۱۸۷/۵	۶۱۳۷/۹	۶۹۲۷/۶	هر دو
۸۶۴۱/۲	۶۶۲۸/۷	۶۷۰۰/۸	۷۸۵۱/۸	زنان
۶۹۹۷/۸	۵۷۶۷/۴	۵۶۶۲/۲	۶۱۵۷/۱	مردان


۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۵۳۱۲/۴	۵۳۷۰/۲	۵۵۲۷/۶	۵۶۱۶	هر دو
۵۵۶۴/۹	۵۶۴۶/۲	۵۷۹۵/۱	۵۸۵۲/۴	زنان
۵۰۵۷/۵	۵۱۱۳	۵۳۰۹/۲	۵۳۹۷/۱	مردان




Mental disorders
Female Male




Ischemic heart disease
Female Male




Falls
Female Male




Chronic obstructive pulmonary disease
Female Male



Stroke
Female Male



Alzheimer's disease and other dementias
Female Male



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
آمار و روستا سالان

سیمای سلامت سالمندان

استان اصفهان

میزان مرگ و شیوع بیماری ها



سیمای سلامت سالمندان

استان اصفهان

(میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها در کل جمعیت، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (کمتر از ۶۰ سال) ساکن در استان اصفهان و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس و گروه‌های سنی بیان شده است. به منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی حاوی: اطلاعات مقایسه‌ای با شاخص کل کشور و مقایسه با استان‌های مجاور استان اصفهان شامل: استان‌های چهارمحال و بختیاری، فارس، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی، قم، سمنان و یزد نیز تدوین و ترسیم شده است.

آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر این مطلب است که شایع‌ترین علل مرگ در سالمندان ساکن استان اصفهان (هر دو جنس) براساس میزان در سال ۲۰۱۷، به ترتیب بیماری‌های غیرواگیر، سوانح و حوادث و بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای است. این شاخص در افراد غیر سالمند ساکن استان اصفهان دارای الگویی مشابه سالمندان است.

روند زمانی تعداد مرگ به علت هر سه دسته اصلی بیماری‌ها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ در حال افزایش است. سالمندان ساکن در استان اصفهان و در سال ۲۰۱۷ از لحاظ میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت هر سه دسته‌ی بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای، بیماری‌های غیرواگیر و سوانح و حوادث از میانگین کشوری پایین‌تر هستند.

سالمندان ساکن استان اصفهان از بین علل مختلف مرگ در دیابت و بیماری‌های کلیوی (زنان در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷ و مردان در سال‌های ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) واجد رتبه‌ی ده و کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

از نظر شیوع مشکلات سلامتی در سالمندان ساکن استان اصفهان، این گروه جمعیتی در سرطان‌ها (مردان در سال ۲۰۱۰)، دیابت و بیماری‌های کلیوی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، بیماری‌های گوارشی (مردان در سال ۲۰۱۷) و سوانح غیرعمدی (زنان و مردان در سال ۲۰۱۷) واجد رتبه‌ی ده و کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب و سکته کاهشی و برای بیماری آلزایمر، دیابت نوع دو، عفونت‌های تنفسی تحتانی و افتادن افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت سکته در مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان اصفهان نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر بوده است.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع به علت مشکلات سلامتی در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای اختلالات اضطرابی، بیماری ایسکمیک قلب، سکته و بیماری آلزایمر کاهشی و برای اختلالات افسردگی، افتادن و بیماری مزمن انسدادی ریه افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع برای مشکلات سلامتی سکته و بیماری آلزایمر در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان اصفهان نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر و برای اختلالات روانی بیشتر بوده است. میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع سکته در مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان اصفهان نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر بوده است.




تعداد و میزان^۱ مرگ به تفکیک گروه سنی در سال ۲۰۱۷ در استان

گروه سنی	جنسیت	همه علل		بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای		بیماری‌های غیرواگیر		سوانح و حوادث	
		تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان
همه سنین	هر دو	۲۳۲۹۶	۴۴۵/۱	۱۳۳۴	۲۵/۵	۱۹۷۰۶	۳۷۶/۵	۲۲۵۶	۴۳/۱
	زنان	۹۹۱۴	۳۸۵	۵۷۱	۲۲/۲	۸۸۰۴	۳۴۱/۹	۵۳۸	۲۰/۹
	مردان	۱۳۳۸۱	۵۰۳/۳	۷۶۳	۲۸/۷	۱۰۹۰۲	۴۱۰	۱۷۱۷	۶۴/۶
کمتر از ۶۰ سال	هر دو	۶۲۵۷	۱۳۴/۲	۷۸۷	۱۶/۹	۳۷۷۴	۸۱	۱۶۹۶	۳۶/۴
	زنان	۲۰۵۶	۸۹/۷	۳۳۵	۱۴/۶	۱۳۶۶	۵۹/۶	۳۵۵	۱۵/۵
	مردان	۴۲۰۱	۱۷۷/۲	۴۵۲	۱۹/۱	۲۴۰۸	۱۰۱/۶	۱۳۴۱	۵۶/۶
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۷۰۳۹	۲۹۷۵/۸	۵۴۷	۹۵/۵	۱۵۹۳۲	۲۷۸۲/۵	۵۶۰	۹۷/۸
	زنان	۷۸۵۹	۲۷۶۷/۲	۲۳۶	۸۳/۱	۷۴۳۹	۲۶۱۹/۴	۱۸۴	۶۴/۷
	مردان	۹۱۸۰	۳۱۸۱	۳۱۱	۱۰۷/۷	۸۴۹۳	۲۹۴۳	۳۷۶	۱۳۰/۳
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۱۵۳۹	۷۶۰/۴	۴۱	۲۰	۱۳۸۷	۶۸۵/۵	۱۱۱	۵۴/۸
	زنان	۵۷۲	۵۸۱/۳	۱۵	۱۵/۶	۵۲۸	۵۳۶/۴	۲۹	۲۹/۲
	مردان	۹۶۷	۹۲۹/۹	۲۵	۲۴/۲	۸۵۹	۸۲۶/۶	۸۲	۷۹
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۱۷۱۸	۱۳۴۱/۱	۴۴	۳۴	۱۵۸۰	۱۲۳۳/۸	۹۴	۷۳/۲
	زنان	۶۷۲	۱۰۲۳/۴	۱۷	۲۵/۴	۶۳۰	۹۵۹/۵	۲۵	۳۸/۵
	مردان	۱۰۴۵	۱۶۷۵/۶	۲۷	۴۳/۱	۹۵۰	۱۵۲۲/۶	۶۹	۱۰۹/۹
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۱۸۶۸	۲۰۸۵/۵	۵۲	۵۷/۶	۱۷۳۹	۱۹۴۰/۷	۷۸	۸۷/۲
	زنان	۸۳۶	۱۸۰۴/۹	۲۲	۴۷/۵	۷۸۹	۱۷۰۳/۳	۲۵	۵۴/۱
	مردان	۱۰۳۲	۲۳۸۶/۱	۳۰	۶۸/۵	۹۴۹	۲۱۹۵	۵۳	۱۲۲/۶
۷۵ تا ۷۹ سال	هر دو	۲۶۵۹	۳۸۷۵/۶	۷۹	۱۱۴/۹	۲۴۹۷	۳۶۳۹/۲	۸۳	۱۲۱/۵
	زنان	۱۱۷۱	۳۵۲۳/۳	۳۱	۹۳/۲	۱۱۱۳	۳۳۴۸/۸	۲۷	۸۱/۳
	مردان	۱۴۸۸	۴۲۰۶/۴	۴۸	۱۳۵/۲	۱۳۸۴	۳۹۱۲	۵۶	۱۵۹/۲
۸۰ سال و بالاتر	هر دو	۹۲۵۵	۱۱۰۲۴/۲	۳۳۲	۳۹۵/۹	۸۷۲۹	۱۰۳۹۷/۶	۱۹۴	۲۳۰/۷
	زنان	۴۶۰۷	۱۱۴۱۹/۹	۱۵۱	۳۷۴/۴	۴۳۷۹	۱۰۸۵۲/۹	۷۸	۱۹۲/۶
	مردان	۴۶۴۸	۱۰۶۵۸/۱	۱۸۱	۴۱۵/۸	۴۳۵۰	۹۹۷۶/۳	۱۱۶	۲۶۶

امید زندگی (سال) در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ در استان

جنسیت	بدو تولد		۶۰ تا ۶۴ سال		۶۵ تا ۶۹ سال		۷۰ تا ۷۴ سال		۷۵ تا ۷۹ سال		۸۰ سال و بالاتر	
	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰
زنان	۷۱/۵	۷۷/۹	۱۹	۲۰/۷	۱۵/۵	۱۶/۳	۱۲/۶	۱۲/۲	۱۰	۸/۴	۷/۹	۵/۳
مردان	۶۹/۲	۷۳/۸	۱۶/۹	۱۹/۹	۱۳/۵	۱۶/۲	۱۱/۱	۱۲/۵	۸/۷	۹/۲	۶/۵	۶/۳

روند زمانی تعداد در مقابل میزان استاندارد شده سنی مرگ در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سطح ملی و استان



^۱ در این گزارش تمامی میزان‌ها در ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت گزارش شده‌اند.




میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

علت ^۲	مردان								زنان							
	۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰		۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰	
	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه ^۳	میزان
بیماری‌های قلبی-عروقی	۲۶	۱۸۲۲/۸	۲۵	۱۹۳۱/۷	۲۲	۲۱۷۹/۸	۲۸	۲۵۰۰/۳	۲۴	۱۷۹۴/۴	۲۵	۱۸۸۰/۱	۲۸	۱۹۰۵/۹	۳۰	۲۱۲۲/۴
سرطان‌ها	۳۰	۵۲۹/۸	۲۳	۵۴۴/۹	۳۰	۳۹۰/۳	۳۱	۴۶۲/۷	۳۰	۳۳۶/۳	۲۵	۳۵۳/۵	۳۰	۲۳۱/۶	۳۱	۲۵۳/۴
اختلالات عصبی	۲۳	۳۰۱/۶	۱۵	۲۵۹/۶	۲۳	۱۹۸/۱	۲۵	۲۲۳/۹	۱۷	۳۶۴	۲۱	۳۲۵/۱	۲۶	۲۰۲/۴	۲۸	۲۲۱/۵
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۹	۲۷۹/۴	۷	۲۶۳/۳	۱۰	۱۸۵/۲	۱۴	۱۸۹/۹	۱۰	۲۸۴/۷	۹	۲۶۳/۱	۱۶	۱۶۷/۸	۲۲	۱۶۱/۶
بیماری‌های مزمن تنفسی	۱۷	۱۸۷/۵	۱۵	۲۱۵/۵	۱۵	۲۲۳/۷	۱۷	۲۵۴/۶	۱۷	۱۳۱/۸	۱۶	۱۵۲/۱	۲۰	۱۲۶/۴	۲۴	۱۲۵/۵
بیماری‌های گوارشی	۳۰	۸۱/۸	۲۳	۸۶/۵	۲۷	۶۶/۷	۲۹	۸۸/۶	۲۲	۷۵/۷	۲۲	۸۰/۴	۲۸	۴۹/۷	۳۱	۶۳/۱
سوانح حمل و نقل	۲۵	۷۴/۸	۲۳	۹۸/۶	۲۴	۱۰۴	۲۶	۱۱۳/۲	۲۵	۳۰/۴	۲۲	۳۹/۹	۲۸	۳۴	۲۹	۳۵/۷
سوانح غیرعمدی	۱۸	۵۲/۴	۱۶	۵۶/۷	۲۴	۵۱/۲	۲۸	۶۱/۱	۱۶	۳۶/۴	۱۷	۳۹/۵	۲۸	۲۸/۷	۳۱	۳۴/۳

میزان استاندارد شده سنی **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

مشکل سلامتی	مردان								زنان							
	۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰		۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰	
	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه ^۴	میزان
بیماری‌های قلبی-عروقی	۱۸	۳۱۰۸۷/۹	۱۳	۳۱۶۵۰/۴	۱۳	۳۱۳۴۲/۹	۱۱	۳۱۷۱۲/۸	۲۰	۳۲۱۷۳/۴	۱۸	۳۱۹۵۳/۹	۲۲	۳۱۷۶۵	۲۰	۳۲۳۳۵/۸
سرطان‌ها	۱۷	۳۵۵۱/۴	۴	۳۳۸۹/۵	۱۸	۲۰۰۳	۲۱	۱۷۶۸/۴	۲۵	۲۰۸۹/۴	۱۳	۲۰۵۳	۲۲	۱۲۲۲/۲	۲۶	۱۱۱۵
اختلالات عصبی	۲۶	۵۲۱۲۳/۹	۲۰	۵۲۱۳۹/۵	۲۲	۵۱۹۸۱/۴	۲۹	۵۱۲۴۳/۷	۲۲	۵۸۲۰۵/۸	۱۳	۵۸۲۱۴	۲۷	۵۷۵۷۲/۶	۲۴	۵۷۲۳۶/۴
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۱	۵۷۴۷۶/۱	۱	۵۳۶۴۵/۷	۱	۵۱۸۳۵/۸	۱	۵۰۷۶۶/۶	۴	۵۹۷۷۸/۶	۳	۵۵۲۹۷/۲	۳	۵۲۴۷۳/۷	۴	۵۱۱۹۵
بیماری‌های مزمن تنفسی	۱۷	۱۲۶۷۱/۴	۱۸	۱۲۶۳۰/۷	۱۶	۱۲۵۳۷/۶	۱۷	۱۴۱۴۴/۹	۱۷	۱۴۹۸۱/۴	۱۸	۱۵۶۱۹/۳	۲۳	۱۴۵۹۳/۵	۱۹	۱۵۳۸۶/۷
بیماری‌های گوارشی	۸	۶۶۷۳۶/۶	۱۱	۶۳۴۶۲/۲	۲۳	۵۹۵۱۸/۱	۲۸	۵۷۰۰۴/۳	۱۱	۵۳۳۶۵/۷	۱۲	۵۱۴۰۴/۲	۲۶	۴۷۴۱۵/۸	۲۷	۴۵۹۶۸/۸
سوانح حمل و نقل	۲۵	۹۲۰۶/۸	۲۰	۱۱۱۷۵/۹	۲۳	۱۱۰۲۵/۷	۲۴	۱۱۴۳۵	۲۱	۵۹۶۵/۸	۱۵	۷۲۰۷	۲۲	۶۶۴۱/۹	۲۳	۷۱۰۳/۵
سوانح غیرعمدی	۹	۳۰۹۴۷/۳	۱۱	۳۲۷۸۷/۶	۲۰	۲۸۳۲۸/۲	۱۹	۳۱۷۷۰/۳	۱۰	۲۲۱۴۴/۳	۱۵	۲۱۱۹۵/۶	۲۶	۱۸۹۵۱/۵	۲۳	۲۱۹۱۶/۲

میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی و **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سال ۲۰۱۷ در سطح ملی و استان




^۲ علل براساس میزان استاندارد شده سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ و هر دو جنسیت در سطح ملی مرتب شده‌اند.


^۳ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی مرگ به تفکیک علت، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.

^۴ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی شیوع به تفکیک مشکل سلامتی، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.







جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۵۸۴/۷	۱۴۲۵/۷	۱۱۰۸/۳	۱۱۰۲/۳
زنان	۱۴۰۷/۷	۱۲۸۱/۷	۱۰۳۹	۱۰۴۶/۳
مردان	۱۷۹۱/۷	۱۵۷۱/۹	۱۱۷۳/۴	۱۱۶۰/۵




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۵۵۷/۲	۴۷۷/۳	۴۱۰/۸	۳۷۸/۸
زنان	۵۵۴/۵	۴۷۹/۹	۴۲۶/۹	۴۰۰/۵
مردان	۵۵۹/۲	۴۷۳/۸	۳۹۴/۳	۳۵۹




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۹۶/۶	۱۷۵/۵	۲۵۷/۲	۲۹۶
زنان	۲۰۲/۲	۱۸۴/۱	۲۹۷/۲	۳۳۶/۱
مردان	۱۸۸/۵	۱۶۶/۱	۲۱۷/۸	۲۵۸/۱



جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۵۳	۶۱/۳	۹۸/۹	۱۲۴
زنان	۵۱/۵	۶۲/۵	۱۰۲/۹	۱۳۱/۳
مردان	۵۵/۴	۶۱	۹۵/۱	۱۱۷/۱




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۶۶/۸	۶۰	۸۶/۶	۸۶/۲
زنان	۵۴/۱	۴۸/۹	۷۶/۵	۷۶/۸
مردان	۸۴	۷۳/۳	۹۶/۱	۹۵/۴




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۵/۶	۱۴/۳	۱۹/۹	۱۸/۶
زنان	۱۱/۲	۱۰/۴	۱۷/۵	۱۶/۴
مردان	۲۰/۸	۱۸/۵	۲۲/۲	۲۰/۸




Ischemic heart disease




Stroke




Alzheimer's disease and other dementias




Diabetes mellitus type 2




Lower respiratory infections




Falls







اختلالات افسردگی				اختلالات اضطرابی				جنسیت
۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	
۶۳۱۲/۳	۶۲۱۰/۶	۶۰۹۰/۱	۶۱۹۰/۳	۶۴۵۱/۴	۶۶۰۸/۵	۶۴۳۳/۶	۶۵۲۷/۴	هر دو
۷۳۹۲	۷۲۸۸/۱	۷۱۳۹/۴	۷۱۷۱/۷	۸۲۰۴/۷	۸۳۹۳/۷	۸۲۵۲/۸	۸۲۷۱/۴	زنان
۵۲۴۲/۶	۵۱۴۱/۶	۵۱۰۹/۱	۵۲۱۰/۶	۴۷۱۷/۷	۴۸۴۴	۴۷۲۳	۴۷۵۲/۷	مردان




۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۱۰۲۸۷	۱۱۱۳۴/۳	۱۱۱۶۹/۳	۱۰۹۸۶/۱	هر دو
۱۰۰۳۹/۴	۱۰۸۰۵/۲	۱۰۷۷۱/۱	۱۰۵۹۵/۷	زنان
۱۰۵۳۰	۱۱۴۵۴/۲	۱۱۵۵۴/۷	۱۱۴۱۴/۱	مردان




۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۶۱۶/۱	۹۰۲۱/۸	۷۴۲۹/۴	۸۴۹۶	هر دو
۷۴۷۲/۸	۷۱۸۶/۳	۶۰۹۲/۸	۷۰۲۸/۳	زنان
۹۷۴۷	۱۰۸۲۵/۵	۸۷۰۱/۸	۱۰۰۱۸/۵	مردان



۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۷۹۴۵/۱	۷۹۶۴/۵	۷۲۸۶/۹	۷۶۱۱/۱	هر دو
۸۶۷۹/۸	۸۹۷۴/۲	۸۰۳۵/۷	۸۰۹۰	زنان
۷۲۲۲/۱	۶۹۸۹/۵	۶۵۹۴/۳	۷۱۳۰/۵	مردان




۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۶۱۴۶/۷	۵۹۵۴/۷	۵۶۴۵/۴	۶۴۳۴/۸	هر دو
۶۸۰۳/۲	۶۳۷۵/۸	۶۰۶۰/۵	۷۰۶۲/۲	زنان
۵۵۰۶/۷	۵۵۴۵/۸	۵۲۴۵/۶	۵۷۱۱/۹	مردان




۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۵۲۸۱/۶	۵۳۴۷/۵	۵۵۰۵/۳	۵۵۷۹/۳	هر دو
۵۵۳۷/۵	۵۶۱۲/۹	۵۷۴۸/۵	۵۷۸۳	زنان
۵۰۳۳/۸	۵۰۹۲/۶	۵۲۴۹/۱	۵۳۱۸/۳	مردان




Mental disorders




Ischemic heart disease




Falls




Chronic obstructive pulmonary disease



Stroke



Alzheimer's disease and other dementias



سیمای سلامت سالمندان

استان البرز

میزان مرگ و شیوع بیماری ها



سیمای سلامت سالمندان

استان البرز

(میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها در کل جمعیت، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (کمتر از ۶۰ سال) ساکن در استان البرز و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس و گروه‌های سنی بیان شده است. به منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی حاوی: اطلاعات مقایسه‌ای با شاخص کل کشور و مقایسه با استان‌های مجاور استان البرز شامل: استان‌های تهران، مرکزی، مازندران و قزوین نیز تدوین و ترسیم شده است.

آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر این مطلب است که شایع‌ترین علل مرگ در سالمندان ساکن استان البرز (هر دو جنس) براساس میزان در سال ۲۰۱۷، به ترتیب بیماری‌های غیرواگیر، بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای و سوانح و حوادث است. این شاخص در افراد غیر سالمند ساکن استان البرز به ترتیب، بیماری‌های غیرواگیر، سوانح و حوادث و بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای است و دارای الگوی متفاوت با سالمندان است.

روند زمانی تعداد مرگ به علت هر سه دسته اصلی بیماری‌ها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ در حال افزایش است. سالمندان ساکن در استان البرز و در سال ۲۰۱۷ از لحاظ میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای از میانگین کشوری بالاتر و از لحاظ دو دسته‌ی دیگر پایین‌تر هستند.

سالمندان ساکن استان البرز، از بین علل مختلف مرگ در بیماری‌های قلبی-عروقی (زنان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰)، سرطان‌ها (زنان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰)، اختلالات عصبی (زنان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰)، دیابت و بیماری‌های کلیوی (زنان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰)، بیماری‌های گوارشی (زنان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰) و سوانح غیرعمدی (زنان در سال ۲۰۰۰) واجد رتبه‌ی ده و کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

از نظر شیوع مشکلات سلامتی در سالمندان ساکن استان البرز، این گروه جمعیتی در بیماری‌های قلبی-عروقی (زنان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰)، سرطان‌ها (زنان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰) و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰)، اختلالات عصبی (زنان در سال‌های ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، دیابت و بیماری‌های کلیوی (زنان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰)، بیماری‌های گوارشی (زنان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰) و سوانح غیرعمدی (مردان در سال ۲۰۰۰) واجد رتبه‌ی ده و کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، سکته، بیماری آلزایمر، عفونت‌های تنفسی تحتانی و افتادن کاهشی و برای دیابت نوع دو افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری ایسکمیک قلب در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان البرز نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ بیشتر بوده است. میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری آلزایمر در مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان البرز نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر بوده است.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع به علت مشکلات سلامتی در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای اختلالات افسردگی، بیماری ایسکمیک قلب، افتادن، بیماری مزمن انسدادی ریه، سکته و بیماری آلزایمر کاهشی و برای اختلالات اضطرابی تقریباً بدون تغییر است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع به علت مشکلات سلامتی برای اختلالات روانی و افتادن در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان البرز نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر و برای بیماری ایسکمیک قلب و آلزایمر بیشتر بوده است. اختلالات روانی در مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان البرز نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر و برای بیماری ایسکمیک قلب بیشتر بوده است.




تعداد و میزان^۱ مرگ به تفکیک گروه سنی در سال ۲۰۱۷ در استان

گروه سنی	جنسیت	همه علل		بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای		بیماری‌های غیرواگیر		سوانح و حوادث	
		تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان
همه سنین	هر دو	۹۵۱۰	۳۳۶/۸	۶۱۵	۲۱/۸	۷۸۷۶	۲۷۸/۹	۱۰۱۹	۳۶/۱
	زنان	۳۶۸۴	۲۶۵/۴	۲۳۱	۱۶/۶	۳۳۳۰	۲۳۲/۷	۲۲۳	۱۶
	مردان	۵۸۲۶	۴۰۵/۸	۳۸۴	۲۶/۷	۴۶۴۶	۲۲۳/۷	۷۹۶	۵۵/۴
کمتر از ۶۰ سال	هر دو	۳۰۰۵	۱۱۷/۲	۳۶۷	۱۴/۳	۱۸۱۹	۷۰/۹	۸۱۸	۳۱/۹
	زنان	۸۸۳	۷۰	۱۳۳	۱۰/۵	۵۹۰	۴۶/۸	۱۶۰	۱۲/۷
	مردان	۲۱۲۲	۱۶۲/۷	۲۳۵	۱۸	۱۲۲۹	۹۴/۲	۶۵۸	۵۰/۵
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۶۵۰۵	۲۵۱۴/۶	۲۴۷	۹۵/۶	۶۰۵۷	۲۳۴۱/۵	۲۰۰	۷۷/۴
	زنان	۲۸۰۱	۲۱۹۱/۲	۹۸	۷۶/۹	۲۶۴۰	۲۰۶۵/۳	۶۳	۴۹
	مردان	۳۷۰۳	۲۸۳۰/۶	۱۴۹	۱۱۳/۹	۳۴۱۷	۲۶۱۱/۵	۱۳۸	۱۰۵/۲
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۷۹۲	۸۱۴/۶	۲۹	۳۰/۲	۷۱۶	۷۳۶/۵	۴۷	۴۷/۹
	زنان	۲۸۰	۵۷۹/۹	۱۰	۱۹/۹	۲۵۸	۵۳۴/۵	۱۲	۲۵/۵
	مردان	۵۱۳	۱۰۴۵/۴	۲۰	۴۰/۳	۴۵۹	۹۳۵/۱	۳۴	۷۰/۱
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۷۸۷	۱۲۲۳/۵	۲۸	۴۳/۸	۷۲۳	۱۱۲۴/۵	۳۶	۵۵/۲
	زنان	۳۰۵	۹۱۷/۳	۱۰	۲۹/۸	۲۸۴	۸۵۵	۱۱	۳۲/۶
	مردان	۴۸۲	۱۵۵۰/۲	۱۸	۵۸/۷	۴۳۹	۱۴۱۲/۲	۲۵	۷۹/۴
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۹۴۵	۲۲۷۰/۶	۳۴	۸۱/۶	۸۷۹	۲۱۱۰/۹	۳۳	۷۸/۱
	زنان	۳۸۴	۱۸۷۲/۶	۱۳	۶۳/۱	۳۶۱	۱۷۵۹/۷	۱۰	۴۹/۸
	مردان	۵۶۱	۲۶۵۷/۵	۲۱	۹۹/۶	۵۱۸	۲۴۵۲/۳	۲۲	۱۰۵/۶
۷۵ تا ۷۹ سال	هر دو	۱۰۷۱	۳۹۳۹/۵	۳۸	۱۴۱/۶	۱۰۰۳	۳۶۸۸/۲	۳۰	۱۰۹/۷
	زنان	۴۵۸	۳۵۳۴/۸	۱۵	۱۱۲/۹	۴۳۴	۳۳۵۰/۶	۹	۷۱/۴
	مردان	۶۱۳	۴۳۰۸/۱	۲۴	۱۶۷/۸	۵۶۸	۳۹۹۵/۸	۲۱	۱۴۴/۶
۸۰ سال و بالاتر	هر دو	۲۹۰۹	۱۰۲۹۲/۷	۱۱۷	۴۱۵/۳	۲۷۳۶	۹۶۷۹/۹	۵۶	۱۹۷/۵
	زنان	۱۳۷۵	۱۰۶۳۵/۴	۵۱	۳۹۶/۷	۱۳۰۳	۱۰۰۸۳/۷	۲۰	۱۵۵
	مردان	۱۵۳۴	۱۰۰۰۳/۸	۶۶	۴۳۰/۹	۱۴۳۳	۹۳۳۹/۶	۳۶	۲۳۳/۳

امید زندگی (سال) در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ در استان

جنسیت	بدو تولد		۶۰ تا ۶۴ سال		۶۵ تا ۶۹ سال		۷۰ تا ۷۴ سال		۷۵ تا ۷۹ سال		۸۰ سال و بالاتر	
	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰
زنان	۷۵	۷۷/۷	۱۸/۸	۲۰/۸	۱۴/۵	۱۶/۷	۱۰/۶	۱۲/۹	۷/۴	۹/۲	۵	۶/۲
مردان	۷۱	۷۵/۲	۱۸/۱	۲۰/۸	۱۴/۱	۱۶/۸	۱۰/۳	۱۳	۷/۱	۹/۷	۴/۹	۷/۱

روند زمانی تعداد در مقابل میزان استاندارد شده سنی مرگ در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سطح ملی و استان



^۱ در این گزارش تمامی میزان‌ها در ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت گزارش شده‌اند.




میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

علت ^۲	زنان								مردان							
	۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷		۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷	
	میزان	رتبه ^۳	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه
بیماری‌های قلبی-عروقی	۳۳۷۶/۵	۷	۲۹۳۴/۹	۴	۲۳۷۶/۹	۳	۱۸۹۵/۱	۲۱	۲۸۶۵/۸	۲۱	۲۲۳۴/۵	۲۱	۱۸۰۵/۲	۲۷	۱۹۲۷/۳	۲۲
سرطان‌ها	۴۸۲/۲	۵	۴۴۶/۸	۳	۳۹۶/۳	۱۳	۳۴۳/۹	۲۸	۶۲۲/۵	۱۶	۴۶۷/۴	۱۹	۴۸۴/۹	۳۱	۵۵۴/۴	۲۸
اختلالات عصبی	۴۹۵/۹	۲	۵۰۱/۳	۱	۴۵۶/۴	۱	۳۸۷/۱	۱۳	۲۶۱/۶	۱۶	۲۱۶	۱۸	۲۲۲/۷	۲۵	۲۷۹/۳	۲۷
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۲۵۱/۲	۴	۲۵۰/۹	۴	۲۳۱/۸	۱۲	۲۲۶/۵	۱۹	۱۹۳	۱۳	۱۷۱	۱۳	۱۷۳/۴	۲۳	۲۰۸/۳	۲۱
بیماری‌های مزمن تنفسی	۱۶۶/۱	۱۶	۱۵۹/۳	۱۵	۱۳۶/۳	۲۰	۹۹/۲	۲۵	۲۴۷/۸	۱۸	۱۸۵/۹	۲۰	۱۵۱/۸	۲۶	۱۵۵/۴	۲۵
بیماری‌های گوارشی	۱۴۲/۴	۵	۱۲۰/۳	۴	۹۹	۱۰	۷۷/۸	۱۸	۱۲۰/۹	۲۰	۸۶/۱	۲۱	۸۱/۴	۲۴	۸۶/۷	۲۵
سوانح حمل و نقل	۳۵/۸	۲۸	۳۵/۹	۲۷	۳۲/۹	۲۹	۲۴/۴	۳۰	۷۱/۵	۳۰	۶۲/۵	۳۰	۶۱/۵	۳۰	۵۱/۴	۳۰
سوانح غیرعمدی	۴۷/۶	۲۲	۴۴	۹	۳۸/۴	۱۹	۳۲/۱	۲۷	۶۶/۳	۲۶	۵۶/۱	۲۲	۵۰/۶	۲۵	۵۰/۷	۲۳

میزان استاندارد شده سنی **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

مشکل سلامتی	زنان								مردان							
	۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷		۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷	
	میزان	رتبه ^۴	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه
بیماری‌های قلبی-عروقی	۳۳۳۹۵/۶	۸	۳۲۹۲۱/۹	۷	۳۲۶۲۰/۴	۱۰	۳۲۶۹۶	۱۲	۳۱۶۶۴/۴	۱۲	۳۱۲۶۷/۸	۱۲	۳۱۳۲۵/۹	۱۶	۳۱۲۸۹/۲	۱۳
سرطان‌ها	۲۱۴۲	۲	۲۴۲۳/۳	۱	۲۴۷۱/۹	۳	۲۴۰۰	۱۱	۲۵۴۸/۵	۳	۲۶۹۹/۵	۳	۳۳۸۴/۶	۵	۳۹۷۰/۸	۷
اختلالات عصبی	۵۷۲۵۵/۸	۱۲	۵۷۶۲۲/۲	۶	۵۸۲۳۳/۷	۷	۵۸۲۳۰/۵	۶	۵۱۲۴۶/۳	۲۶	۵۱۹۷۰	۲۶	۵۲۱۳۶/۲	۲۲	۵۲۱۱۹/۴	۳۰
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۴۹۴۵۹/۴	۱۰	۵۰۲۶۰/۲	۹	۵۱۹۷۹/۴	۱۰	۵۷۳۳۴/۵	۱۸	۳۹۴۹۷	۱۵	۳۹۷۷۴/۶	۱۵	۴۰۸۴۷/۲	۲۱	۴۶۱۰۵/۱	۲۰
بیماری‌های مزمن تنفسی	۱۵۰۰۰/۸	۲۲	۱۵۳۷۹/۵	۱۶	۱۵۴۱۲/۷	۲۲	۱۴۸۳۷/۵	۲۱	۱۲۴۶۷/۱	۲۵	۱۱۸۱۱/۳	۲۵	۱۱۸۴۷/۵	۲۵	۱۲۵۳۶/۶	۱۹
بیماری‌های گوارشی	۴۶۸۸۳/۵	۱۰	۴۸۳۶۲/۶	۶	۵۱۶۲۶/۷	۷	۵۳۲۲۲/۹	۱۴	۵۷۳۴۱/۴	۲۵	۵۹۶۵۶/۹	۲۵	۶۳۲۶۵/۴	۱۸	۶۶۴۸۲/۶	۲۱
سوانح حمل و نقل	۶۶۸۹/۶	۲۷	۶۵۲۵/۶	۲۵	۶۴۷۸/۲	۲۸	۵۴۷۷/۷	۲۹	۹۱۴۳/۳	۳۰	۹۱۳۷/۷	۳۰	۹۲۳۶/۹	۳۰	۸۱۹۷/۱	۳۰
سوانح غیرعمدی	۲۰۹۶۷/۱	۲۹	۱۹۰۹۲/۶	۲۴	۲۰۲۳۸/۱	۲۷	۲۱۷۶۰/۴	۲۷	۳۲۳۹۵/۳	۱۸	۲۹۸۸۶/۱	۱۸	۳۱۴۶۳/۵	۹	۲۹۵۴۷/۳	۱۷

میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی و **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سال ۲۰۱۷ در سطح ملی و استان




^۲ علل براساس میزان استاندارد شده سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ و هر دو جنسیت در سطح ملی مرتب شده‌اند.


^۳ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی مرگ به تفکیک علت، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.

^۴ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی شیوع به تفکیک مشکل سلامتی، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.







جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۹۲۳/۹	۱۶۰۱/۹	۱۲۵۴/۲	۱۲۴۲/۱
زنان	۱۹۴۸/۲	۱۷۲۸/۵	۱۴۰۹/۸	۱۱۹۷/۷
مردان	۱۸۶۰/۴	۱۴۷۲/۵	۱۱۵۸/۲	۱۳۰۱




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۸۹۲/۳	۶۸۵/۳	۵۲۷/۸	۴۱۸/۳
زنان	۱۰۱۶/۱	۸۲۷/۷	۶۴۱/۲	۴۳۶
مردان	۷۴۹/۲	۵۵۵/۷	۴۴۴/۸	۴۰۶/۶




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۳۴۶/۴	۳۱۴	۲۸۵/۳	۲۸۹/۹
زنان	۴۵۷/۱	۴۶۲/۷	۴۲۱/۵	۳۵۷/۶
مردان	۲۱۷	۱۷۷	۱۸۳/۲	۲۳۴/۱



جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۵۷/۸	۶۳/۸	۷۳/۵	۹۸/۱
زنان	۶۷/۹	۸۱/۶	۹۱	۱۱۲/۵
مردان	۴۷/۱	۴۸/۶	۵۹/۸	۸۵/۷




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۵۲	۱۲۶/۱	۱۰۴/۹	۱۰۲/۱
زنان	۱۵۱/۷	۱۳۲/۷	۱۱۱/۵	۹۰/۸
مردان	۱۴۹/۶	۱۱۸/۸	۱۰۱/۷	۱۱۳/۲




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۳/۹	۲۲/۸	۲۱/۳	۲۰/۸
زنان	۱۸/۲	۱۷/۷	۱۷	۱۵/۲
مردان	۲۹/۴	۲۶/۸	۲۵/۲	۲۶




Ischemic heart disease




Stroke




Alzheimer's disease and other dementias




Diabetes mellitus type 2





Lower respiratory infections



Falls





روند زمانی میزان استاندارد شده سنی شیوع به تفکیک مشکل سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان





اختلالات افسردگی				اختلالات اضطرابی				جنسیت
۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	
۶۳۰۴/۷	۶۱۵۳/۶	۶۰۰۳/۹	۶۱۳۹/۱	۶۴۳۵/۳	۶۵۱۶	۶۲۸۰/۱	۶۴۴۶/۹	هر دو
۷۳۸۹/۴	۷۲۸۹/۱	۷۱۴۷/۸	۷۱۷۱	۸۲۰۴/۷	۸۳۹۳/۷	۸۲۵۲/۸	۸۲۷۱/۴	زنان
۵۲۴۴/۲	۵۱۳۶/۱	۵۱۰۸/۵	۵۱۹۴/۹	۴۷۱۷/۷	۴۸۴۴	۴۷۲۳	۴۷۵۲/۷	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۱۱۳۰۴/۷	۱۱۹۶۵/۷	۱۱۹۳۲/۴	۱۱۶۷۳/۲	هر دو
۱۰۹۹۴/۴	۱۱۵۹۱/۴	۱۱۵۰۷/۲	۱۱۲۶۹/۵	زنان
۱۱۵۹۶/۶	۱۲۲۹۰/۴	۱۲۲۷۷/۵	۱۲۰۶۲/۷	مردان



۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۹۰۷۲/۸	۹۹۱۱/۲	۹۱۲۹/۷	۹۸۲۱/۶	هر دو
۷۳۸۰/۶	۷۱۸۶	۶۶۵۶/۳	۷۲۵۸/۸	زنان
۱۰۶۹۷/۵	۱۲۳۱۶/۷	۱۱۱۰۲/۵	۱۲۲۳۸/۳	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۷۷۸۹/۹	۷۹۳۸/۸	۷۸۸۶/۹	۷۸۵۶/۹	هر دو
۸۴۹۶/۹	۹۳۷۶/۷	۹۱۵۲/۳	۸۵۳۸/۶	زنان
۷۱۱۶/۵	۶۶۹۵/۲	۶۸۴۵/۵	۷۱۹۲	مردان




۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۷۲۰۷/۹	۶۸۱۸/۹	۷۰۶۹/۶	۸۱۲۶/۸	هر دو
۷۸۹۹/۸	۷۷۴۹	۸۱۸۶/۴	۹۳۱۵/۶	زنان
۶۵۶۶/۱	۶۰۳۵/۶	۶۱۳۳/۴	۶۹۱۳/۷	مردان


۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۵۲۹۰/۶	۵۳۲۹/۲	۵۴۸۵/۲	۵۵۶۰	هر دو
۵۵۸۱/۴	۵۶۲۸	۵۷۷۸/۴	۵۷۸۹/۸	زنان
۵۰۲۸/۲	۵۰۸۳	۵۲۲۷/۹	۵۳۱۰/۲	مردان




Mental disorders
Female Male




Ischemic heart disease
Female Male




Falls
Female Male




Chronic obstructive pulmonary disease
Female Male



Stroke
Female Male



Alzheimer's disease and other dementias
Female Male



سیمای سلامت سالمندان

استان ایلام

میزان مرگ و شیوع بیماری ها



سیمای سلامت سالمندان

استان ایلام

(میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها در کل جمعیت، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (کمتر از ۶۰ سال) ساکن در استان ایلام و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس و گروه‌های سنی بیان شده است. به منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی حاوی: اطلاعات مقایسه‌ای با شاخص کل کشور و مقایسه با استان‌های مجاور استان ایلام شامل: استان‌های کرمانشاه، خوزستان و لرستان نیز تدوین و ترسیم شده است.

آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر این مطلب است که شایع‌ترین علل مرگ در سالمندان ساکن استان ایلام (هر دو جنس) براساس میزان در سال ۲۰۱۷، به ترتیب بیماری‌های غیرواگیر، سوانح و حوادث و بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای است. این شاخص در افراد غیر سالمند ساکن استان ایلام دارای الگوی مشابه سالمندان است.

روند زمانی تعداد مرگ به علت هر سه دسته اصلی بیماری‌ها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ در حال افزایش است. سالمندان ساکن در استان ایلام و در سال ۲۰۱۷ از لحاظ میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای و بیماری‌های غیرواگیر از میانگین کشوری پایین‌تر و از لحاظ سوانح و حوادث از میانگین کشوری بالاتر هستند.

سالمندان ساکن استان ایلام، از بین علل مختلف مرگ در بیماری‌های قلبی-عروقی (مردان در سال ۱۹۹۰) و سرطان‌ها (زنان در سال ۲۰۱۷) واجد رتبه‌ی ده و کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

از نظر شیوع مشکلات سلامتی در سالمندان ساکن استان ایلام، این گروه جمعیتی در سرطان‌ها (مردان در سال ۲۰۱۷) واجد رتبه‌ی ده و کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، سکته، عفونت‌های تنفسی تحتانی و افتادن کاهشی و در مقابل برای بیماری آلزایمر و دیابت نوع دو افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت سکته، بیماری آلزایمر، دیابت نوع دو و عفونت‌های تنفسی تحتانی در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان ایلام نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر بوده است. میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری ایسکمیک قلب در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان ایلام نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ بیشتر بوده است.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع به علت مشکلات سلامتی در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری آلزایمر کاهشی و برای اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی، بیماری ایسکمیک قلب، افتادن، بیماری مزمن انسدادی ریه و سکته افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع به علت مشکلات سلامتی برای بیماری ایسکمیک قلب و سکته در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان ایلام نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر بوده است. میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع برای بیماری آلزایمر در مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان ایلام نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر بوده است.




تعداد و میزان^۱ مرگ به تفکیک گروه سنی در سال ۲۰۱۷ در استان

گروه سنی	جنسیت	همه علل		بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای		بیماری‌های غیرواگیر		سوانح و حوادث	
		تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان
همه سنین	هر دو	۲۳۹۰	۴۰۶/۱	۱۳۲	۲۲/۵	۱۸۷۳	۳۱۸/۲	۳۸۵	۶۵/۴
	زنان	۹۳۹	۳۲۵/۴	۵۶	۱۹/۴	۷۷۷	۲۶۹/۳	۱۰۶	۳۶/۷
	مردان	۱۴۵۱	۴۸۳/۷	۷۶	۲۵/۴	۱۰۹۵	۳۶۵/۳	۲۷۹	۹۳
کمتر از ۶۰ سال	هر دو	۸۶۸	۱۶۱/۴	۱۰۰	۱۸/۶	۴۴۳	۸۲/۴	۳۲۵	۶۰/۴
	زنان	۳۰۶	۱۱۶/۲	۴۳	۱۶/۵	۱۷۷	۶۷/۱	۸۶	۳۲/۶
	مردان	۵۶۱	۲۰۴/۹	۵۶	۲۰/۶	۲۶۶	۹۷	۲۳۹	۸۷/۳
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۵۲۲	۳۰۰/۱/۱	۳۳	۶۴/۲	۱۴۳۰	۲۸۱/۹	۶۰	۱۱۷/۹
	زنان	۶۳۳	۲۵۴/۱/۲	۱۳	۵۱	۶۰۰	۲۴۱۰/۱	۲۰	۸۰
	مردان	۸۸۹	۳۴۴/۴/۸	۲۰	۷۶/۹	۸۲۹	۳۲۱۳/۴	۴۰	۱۵۴/۵
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۱۷۴	۹۶۵/۸	۳	۱۸/۵	۱۵۶	۸۶۳/۱	۱۵	۸۴/۱
	زنان	۷۱	۷۵۷/۶	۱	۱۴/۵	۶۵	۶۹۴/۳	۵	۴۸/۸
	مردان	۱۰۳	۱۱۸۹/۴	۲	۲۲/۸	۹۱	۱۰۴۴/۵	۱۱	۱۲۲/۱
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۲۱۰	۱۵۱۵/۱	۴	۲۷/۹	۱۹۳	۱۳۹۴/۹	۱۳	۹۲/۳
	زنان	۹۲	۱۳۰۷/۷	۲	۲۳/۶	۸۶	۱۲۲۱/۲	۴	۶۲/۹
	مردان	۱۱۸	۱۷۲۸/۴	۲	۳۲/۳	۱۰۷	۱۵۷۳/۵	۸	۱۲۲/۶
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۱۴۸	۲۲۳۹/۳	۳	۴۲/۳	۱۳۹	۲۰۹۹/۵	۶	۹۷/۵
	زنان	۷۸	۲۲۱۲/۳	۱	۴۰/۷	۷۴	۲۰۹۱/۹	۳	۷۹/۷
	مردان	۷۰	۲۲۷۰/۳	۱	۴۴/۲	۶۵	۲۱۰۸/۱	۴	۱۱۷/۹
۷۵ تا ۷۹ سال	هر دو	۲۱۷	۴۰۴۸/۲	۴	۷۸/۳	۲۰۵	۳۸۳۳/۲	۷	۱۴۶/۷
	زنان	۹۸	۴۱۲۰/۸	۲	۷۶/۲	۹۴	۳۹۳۴/۱	۳	۱۱۰/۵
	مردان	۱۱۹	۳۹۹۰/۳	۲	۷۹/۹	۱۱۲	۳۷۵۲/۷	۵	۱۵۷/۶
۸۰ سال و بالاتر	هر دو	۷۷۳	۱۱۳۰/۱/۳	۱۸	۲۶۸/۷	۷۳۶	۱۰۷۶۸/۷	۱۸	۲۶۳/۹
	زنان	۲۹۴	۱۱۲۳۲/۸	۶	۲۴۶/۳	۲۸۲	۱۰۷۷۶/۴	۵	۲۱۰
	مردان	۴۷۹	۱۱۳۴۳/۹	۱۲	۲۸۲/۶	۴۵۴	۱۰۷۶۳/۹	۱۳	۲۹۷/۴

امید زندگی (سال) در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ در استان

جنسیت	بدو تولد		۶۰ تا ۶۴ سال		۶۵ تا ۶۹ سال		۷۰ تا ۷۴ سال		۷۵ تا ۷۹ سال		۸۰ سال و بالاتر	
	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰
زنان	۶۸/۲	۷۸/۴	۱۹	۲۲/۲	۱۵/۵	۱۷/۹	۱۲/۷	۱۳/۹	۱۱/۱	۱۰/۳	۱۰/۵	۷
مردان	۶۶/۲	۷۴/۸	۱۶/۴	۲۱/۱	۱۲/۹	۱۷/۵	۹/۹	۱۳/۸	۷/۹	۱۰/۵	۷	۷/۴

روند زمانی تعداد در مقابل میزان استاندارد شده سنی مرگ در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سطح ملی و استان



^۱ در این گزارش تمامی میزان‌ها در ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت گزارش شده‌اند.




میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

علت ^۲	مردان								زنان							
	۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰		۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰	
	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه ^۳	میزان
بیماری‌های قلبی-عروقی	۱۸	۲۰۰۸/۶	۱۶	۲۱۲۵/۶	۱۴	۲۵۴۹/۶	۹	۳۳۳۳/۸	۱۳	۲۰۷۸/۹	۲۱	۱۹۵۳/۲	۲۲	۲۲۷۰/۹	۱۳	۲۹۹۵/۶
سرطان‌ها	۱۲	۶۵۴	۱۷	۵۸۰/۵	۱۵	۵۰۳/۶	۱۳	۶۶۹	۱۰	۴۴۶/۸	۱۷	۳۷۸/۶	۱۶	۳۱۶/۶	۱۳	۳۹۷/۶
اختلالات عصبی	۳۰	۲۴۸/۱	۳۱	۱۸۶/۱	۳۱	۱۴۱/۸	۳۱	۱۷۴/۲	۳۱	۲۷۳/۹	۳۱	۲۰۱/۵	۳۱	۱۳۰	۳۱	۱۵۶
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۲۲	۲۰۵/۱	۲۴	۱۶۴/۵	۲۳	۱۲۸/۷	۱۹	۱۵۶/۵	۲۳	۲۱۵/۷	۲۵	۱۵۱/۶	۲۷	۱۱۸/۳	۲۴	۱۴۰/۳
بیماری‌های مزمن تنفسی	۳۱	۱۲۱/۵	۳۰	۱۱۷/۱	۳۱	۱۱۶/۸	۳۰	۱۶۳/۵	۲۷	۹۶/۵	۳۱	۸۸/۱	۳۱	۸۱	۳۰	۱۰۰/۷
بیماری‌های گوارشی	۲۷	۸۳/۸	۲۹	۷۳/۲	۲۶	۷۰/۷	۲۶	۱۱۲/۷	۲۹	۶۶/۱	۳۰	۵۸/۱	۲۹	۴۹/۳	۲۸	۷۴/۵
سوانح حمل و نقل	۲۲	۷۹/۷	۲۴	۸۹	۲۲	۱۰۸/۹	۲۰	۱۴۱/۱	۱۸	۳۷/۲	۲۵	۳۶/۳	۲۶	۳۶/۵	۲۳	۴۴/۵
سوانح غیرعمدی	۲۷	۴۸/۳	۲۸	۴۷/۸	۲۳	۵۲/۶	۲۳	۶۹/۵	۲۵	۳۲/۶	۲۹	۳۰/۴	۳۰	۲۸/۲	۳۰	۳۸

میزان استاندارد شده سنی **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

مشکل سلامتی	مردان								زنان							
	۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰		۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰	
	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه ^۴	میزان
بیماری‌های قلبی-عروقی	۲۸	۳۰۲۵۳/۳	۳۱	۳۰۳۶۵/۱	۳۱	۲۹۹۲۴/۸	۳۰	۳۰۰۱۷/۱	۲۲	۳۱۷۶۷/۶	۳۰	۳۰۹۷۵	۳۰	۳۰۸۱۱/۲	۳۰	۳۱۰۷۳/۹
سرطان‌ها	۹	۳۸۲۳/۷	۱۹	۲۸۹۶/۱	۱۵	۲۰۲۵/۸	۱۴	۱۸۹۸/۹	۱۲	۲۳۸۵/۸	۱۸	۱۹۵۰/۴	۱۵	۱۳۱۲/۸	۱۷	۱۲۵۰/۶
اختلالات عصبی	۲۷	۵۲۱۲۳/۸	۲۶	۵۲۱۲۶/۷	۲۱	۵۱۹۸۳/۵	۱۸	۵۱۲۷۰/۱	۱۱	۵۸۲۲۰/۱	۲۱	۵۸۲۰۳/۵	۱۸	۵۷۵۹۰/۱	۱۸	۵۷۲۵۱/۲
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۲۶	۴۴۷۸۸/۶	۲۷	۳۹۵۴۸/۴	۲۶	۳۸۱۳۴/۱	۲۷	۳۷۵۳۳/۱	۲۴	۵۵۸۸۷/۴	۲۹	۴۸۷۳۴/۲	۲۷	۴۶۵۱۲/۵	۲۵	۴۶۵۶۶/۶
بیماری‌های مزمن تنفسی	۲۹	۱۱۷۳۹/۵	۳۰	۱۰۵۹۳/۱	۳۰	۱۰۳۳۶/۶	۳۱	۱۱۲۲۰/۸	۲۵	۱۴۶۷۸	۳۱	۱۳۹۹۵/۵	۳۱	۱۳۰۲۹/۶	۳۰	۱۳۲۵۹
بیماری‌های گوارشی	۲۷	۶۶۲۱۵/۵	۲۹	۶۲۷۵۲/۵	۲۹	۵۹۰۳۴/۵	۳۰	۵۶۹۴۷/۹	۳۰	۵۲۶۳۷/۷	۳۰	۵۰۵۹۶	۲۹	۴۷۰۵۲/۴	۲۹	۴۵۸۸۷/۳
سوانح حمل و نقل	۲۴	۹۲۱۱/۴	۲۵	۱۰۷۵۳/۸	۲۱	۱۱۰۸۰/۸	۲۲	۱۱۴۸۰	۲۰	۶۰۴۰/۳	۲۴	۶۷۳۸/۷	۲۶	۶۳۵۰/۷	۲۶	۶۷۶۲/۴
سوانح غیرعمدی	۲۵	۲۸۹۶۹/۱	۳۰	۲۹۶۷۲/۲	۲۸	۲۶۸۰۰/۹	۲۵	۳۰۷۰۶/۳	۲۹	۲۱۳۵۷/۷	۳۱	۱۹۹۳۳/۱	۳۰	۱۷۹۴۸/۸	۳۰	۲۰۴۶۸/۹

میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی و **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سال ۲۰۱۷ در سطح ملی و استان




^۲ علل براساس میزان استاندارد شده سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ و هر دو جنسیت در سطح ملی مرتب شده‌اند.


^۳ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی مرگ به تفکیک علت، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.

^۴ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی شیوع به تفکیک مشکل سلامتی، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.







جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۳۹۹/۶	۱۸۶۵/۶	۱۴۰۲/۱	۱۳۳۳/۴
زنان	۲۲۱۲/۶	۱۷۲۹/۹	۱۳۰۳/۱	۱۳۵۳/۳
مردان	۲۵۲۵/۸	۱۹۶۴/۱	۱۴۹۸	۱۳۳۵/۳




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۵۹۲/۶	۴۱۱/۹	۳۲۹/۶	۳۶۴
زنان	۵۵۰	۳۷۵/۳	۳۲۴/۴	۳۷۲
مردان	۶۲۹/۳	۴۴۵/۹	۳۳۶/۷	۳۵۹/۷




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۴۱/۷	۱۱۵/۱	۱۶۴/۵	۲۲۶/۶
زنان	۱۳۹/۲	۱۱۵/۳	۱۸۱/۱	۲۴۹
مردان	۱۴۴	۱۱۵/۴	۱۵۳/۳	۲۱۰/۲



جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۱/۲	۲۱/۷	۲۴/۲	۳۶/۸
زنان	۲۰/۷	۲۲/۴	۲۴/۵	۴۱/۶
مردان	۲۱/۶	۲۱/۵	۲۴/۱	۳۲/۶




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۵۵	۴۱/۹	۴۶/۴	۵۲/۷
زنان	۵۱	۳۷/۹	۴۲/۴	۴۹/۸
مردان	۵۸/۱	۴۵/۱	۴۹/۵	۵۴/۷




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۵/۷	۱۳/۵	۱۳/۹	۱۳/۹
زنان	۸/۲	۷/۱	۸/۹	۹/۱
مردان	۲۱/۵	۱۸/۴	۱۸	۱۷/۹




Ischemic heart disease
Female Male




Stroke
Female Male




Alzheimer's disease and other dementias
Female Male




Diabetes mellitus type 2
Female Male





Lower respiratory infections
Female Male





Falls
Female Male







اختلالات افسردگی				اختلالات اضطرابی				جنسیت
۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	
۶۳۱۷/۷	۶۱۹۶/۲	۵۹۶۹/۵	۵۹۹۹/۵	۶۴۲۹	۶۵۷۶/۸	۶۲۱۶/۹	۶۲۰۲/۳	هر دو
۷۳۹۲/۵	۷۲۸۰	۷۱۳۵/۴	۷۱۷۵/۱	۸۲۰۴/۷	۸۳۹۳/۷	۸۲۵۲/۸	۸۲۷۱/۴	زنان
۵۲۵۹/۷	۵۱۳۴/۵	۵۱۱۱/۳	۵۱۸۷/۶	۴۷۱۷/۷	۴۸۴۴	۴۷۲۳	۴۷۵۲/۷	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۱۰۰۱۹/۶	۱۰۶۱۴/۵	۱۰۳۶۵/۷	۹۹۹۶/۹	هر دو
۹۷۷۵/۴	۱۰۳۰۴/۱	۱۰۰۱۳/۶	۹۶۵۷/۷	زنان
۱۰۲۴۳/۶	۱۰۸۷۸/۵	۱۰۶۲۵/۳	۱۰۲۴۳/۷	مردان



۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۳۶۵/۲	۸۳۵۱	۷۱۴۲/۱	۷۸۷۰/۳	هر دو
۷۰۳۸/۷	۶۳۷۶/۱	۵۳۵۶/۴	۵۷۵۲/۱	زنان
۹۶۰۶/۵	۱۰۱۳۸/۹	۸۴۴۹/۴	۹۳۹۷/۶	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۷۲۲۹/۵	۶۸۱۰/۹	۶۰۲۰/۱	۵۹۵۰/۵	هر دو
۸۲۸۳/۸	۸۰۶۷	۷۱۲۸/۹	۶۸۶۰/۷	زنان
۶۲۴۳/۷	۵۷۱۱/۹	۵۲۲۹/۸	۵۲۹۸/۶	مردان




۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۶۴۴۷	۵۷۱۸/۷	۵۶۱۲/۶	۶۲۳۹/۸	هر دو
۷۱۴۴/۷	۵۹۹۸/۶	۵۹۷۱	۶۹۰۳/۷	زنان
۵۸۲۷/۹	۵۴۴۴/۸	۵۳۴۸/۱	۵۷۶۰/۸	مردان


۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۵۲۸۱/۳	۵۳۳۳/۲	۵۵۱۱/۴	۵۶۰۰/۶	هر دو
۵۵۸۵/۶	۵۶۴۵/۹	۵۷۹۸/۸	۵۸۵۳/۹	زنان
۵۰۴۱/۷	۵۱۰۷/۲	۵۳۰۲/۴	۵۲۹۷	مردان




Mental disorders
Female Male




Ischemic heart disease
Female Male




Falls
Female Male




Chronic obstructive pulmonary disease
Female Male



Stroke
Female Male



Alzheimer's disease and other dementias
Female Male



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
آمار و سلامت استان

سیمای سلامت سالمندان

استان بوشهر

میزان مرگ و شیوع بیماری ها



سیمای سلامت سالمندان

استان بوشهر

(میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها در کل جمعیت، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (کمتر از ۶۰ سال) ساکن در استان بوشهر و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس و گروه‌های سنی بیان شده است. به منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی حاوی: اطلاعات مقایسه‌ای با شاخص کل کشور و مقایسه با استان‌های مجاور استان بوشهر شامل: استان‌های فارس، هرمزگان، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد نیز تدوین و ترسیم شده است.

آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر این مطلب است که شایع‌ترین علل مرگ در سالمندان ساکن استان بوشهر (هر دو جنس) براساس میزان در سال ۲۰۱۷، به ترتیب بیماری‌های غیرواگیر، سوانح و حوادث و بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای است. این شاخص در افراد غیر سالمند ساکن استان بوشهر دارای الگویی مشابه سالمندان است.

روند زمانی تعداد مرگ به علت هر سه دسته اصلی بیماری‌ها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ در حال افزایش است. سالمندان ساکن در استان بوشهر و در سال ۲۰۱۷ از لحاظ میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای و بیماری‌های غیرواگیر از میانگین کشوری پایین‌تر و از لحاظ سوانح و حوادث بالاتر هستند.

سالمندان ساکن استان بوشهر، از بین علل مختلف مرگ در بیماری‌های قلبی-عروقی (مردان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰)، دیابت و بیماری‌های کلیوی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، بیماری‌های گوارشی (مردان در سال ۲۰۰۰) و سوانح حمل و نقل (مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) واجد رتبه‌ی ده و کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

از نظر شیوع مشکلات سلامتی در سالمندان ساکن استان بوشهر، این گروه جمعیتی در سرطان‌ها (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، دیابت و بیماری‌های کلیوی (زنان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰) و سوانح حمل و نقل (مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۷) واجد رتبه‌ی ده و کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، سکته، عفونت‌های تنفسی تحتانی و افتادن کاهشی و برای بیماری آلزایمر و دیابت نوع دو افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری ایسکمیک قلب و بیماری آلزایمر در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان بوشهر نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر بوده است. میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت سکته در مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان بوشهر نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ بیشتر بوده است.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع به علت مشکلات سلامتی در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، افتادن، سکته و بیماری آلزایمر کاهشی و برای اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی و بیماری مزمن انسدادی ریه افزایشی بوده است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع برای مشکلات سلامتی به علت افتادن در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان بوشهر نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ بیشتر بوده است. میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع برای سکته در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان بوشهر نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ بیشتر بوده است.




تعداد و میزان^۱ مرگ به تفکیک گروه سنی در سال ۲۰۱۷ در استان

گروه سنی	جنسیت	همه علل		بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای		بیماری‌های غیرواگیر		سوانح و حوادث	
		تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان
همه سنین	هر دو	۳۹۶۰	۳۳۰/۷	۲۷۵	۲۳	۳۱۳۰	۲۶۱/۳	۵۵۵	۴۶/۴
	زنان	۱۶۱۳	۲۸۷/۹	۱۱۳	۲۰/۱	۱۳۴۹	۲۴۰/۹	۱۵۱	۲۶/۹
	مردان	۲۳۴۷	۳۶۸/۳	۱۶۲	۲۵/۵	۱۷۸۰	۲۷۹/۳	۴۰۵	۶۳/۵
کمتر از ۶۰ سال	هر دو	۱۴۴۹	۱۳۰/۵	۲۰۳	۱۸/۳	۷۹۸	۷۱/۹	۴۴۷	۴۰/۳
	زنان	۵۱۷	۱۰۰/۲	۸۴	۱۶/۴	۳۱۶	۶۱/۳	۱۱۷	۲۲/۶
	مردان	۹۳۲	۱۵۶/۸	۱۱۹	۲۰	۴۸۲	۸۱/۱	۳۳۱	۵۵/۶
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۲۵۱۱	۲۸۷۰	۷۲	۸۲	۲۳۳۲	۲۶۶۴/۶	۱۰۸	۱۲۳/۵
	زنان	۱۰۹۶	۲۴۷۰	۲۸	۶۳/۸	۱۰۳۳	۲۳۲۹/۴	۳۴	۷۶/۸
	مردان	۱۴۱۶	۳۲۸۱/۳	۴۳	۱۰۰/۶	۱۲۹۸	۳۰۰۹/۱	۷۴	۱۷۱/۶
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۳۳۷	۱۰۹۵/۳	۹	۲۸/۶	۲۹۹	۹۷۲/۱	۲۹	۹۴/۶
	زنان	۱۴۴	۹۴۲/۵	۴	۲۳/۹	۱۳۲	۸۶۴/۶	۸	۵۴
	مردان	۱۹۳	۱۲۴۵/۷	۵	۳۳/۲	۱۶۷	۱۰۷۸	۲۱	۱۳۴/۵
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۳۶۳	۱۶۸۲/۹	۹	۴۲/۵	۳۳۱	۱۵۳۴/۱	۲۳	۱۰۶/۳
	زنان	۱۵۸	۱۴۱۵	۴	۳۴/۵	۱۴۷	۱۳۱۷/۵	۷	۶۳
	مردان	۲۰۵	۱۹۷۰/۹	۵	۵۱/۱	۱۸۴	۱۷۶۷	۱۶	۱۵۲/۸
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۳۶۰	۲۴۴۸/۷	۱۰	۶۴/۸	۳۳۳	۲۲۶۸	۱۷	۱۱۵/۸
	زنان	۱۳۸	۱۸۰۸/۲	۳	۴۳/۸	۱۳۰	۱۷۰۲/۱	۵	۶۲/۳
	مردان	۲۲۱	۳۱۴۵/۴	۶	۸۷/۸	۲۰۳	۲۸۸۳/۶	۱۲	۱۷۴
۷۵ تا ۷۹ سال	هر دو	۴۴۰	۴۲۰۴/۸	۱۱	۱۰۹/۷	۴۱۳	۳۹۴۸/۷	۱۵	۱۴۶/۴
	زنان	۱۸۴	۳۴۱۶/۵	۴	۷۸/۱	۱۷۵	۳۲۴۸/۳	۵	۹۰
	مردان	۲۵۶	۵۰۳۷/۶	۷	۱۴۲/۱	۲۳۹	۴۶۸۸/۵	۱۰	۲۰۶/۱
۸۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۰۱۲	۱۰۱۰۹/۳	۳۳	۳۲۷/۲	۹۵۵	۹۵۴۵/۱	۲۴	۲۳۷
	زنان	۴۷۲	۹۶۴۸	۱۳	۲۷۱/۳	۴۴۹	۹۱۸۹/۲	۹	۱۸۷/۵
	مردان	۵۴۰	۱۰۵۵۰	۱۹	۳۸۰/۶	۵۰۶	۹۸۸۵/۱	۱۵	۲۸۴/۳

امید زندگی (سال) در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ در استان

جنسیت	بدو تولد		۶۰ تا ۶۴ سال		۶۵ تا ۶۹ سال		۷۰ تا ۷۴ سال		۷۵ تا ۷۹ سال		۸۰ سال و بالاتر	
	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰
زنان	۷۱	۷۷/۳	۱۷	۲۱/۳	۱۳/۳	۱۷/۲	۹/۹	۱۳/۳	۸	۹/۹	۷	۷/۵
مردان	۶۶/۸	۷۳	۱۶/۲	۱۹/۹	۱۲/۵	۱۶/۲	۹/۴	۱۲/۵	۷/۲	۹/۴	۵/۸	۶/۵

روند زمانی تعداد در مقابل میزان استاندارد شده سنی مرگ در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سطح ملی و استان



^۱ در این گزارش تمامی میزان‌ها در ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت گزارش شده‌اند.




میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

علت ^۲	مردان								زنان							
	۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰		۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰	
	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه ^۳	میزان
بیماری‌های قلبی-عروقی	۱۷	۲۰۹۴/۱	۱۲	۲۳۰۳/۳	۷	۲۹۱۷/۱	۶	۳۵۴۹/۳	۲۵	۱۷۵۷/۸	۲۳	۱۹۳۱/۲	۲۰	۲۳۳۰/۹	۱۶	۲۹۳۶
سرطان‌ها	۲۱	۶۰۰/۵	۱۵	۵۹۳	۱۲	۵۴۵/۴	۱۷	۶۱۹/۱	۲۷	۳۵۴/۲	۲۳	۳۵۷/۸	۲۲	۲۹۲/۱	۲۲	۳۳۴/۲
اختلالات عصبی	۲۸	۲۷۵/۱	۲۰	۲۴۸	۲۰	۲۰۹/۹	۲۱	۲۳۹/۵	۳۰	۲۸۸	۲۷	۲۷۸/۷	۲۷	۱۹۷/۵	۲۷	۲۲۴/۶
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۵	۲۹۷/۸	۵	۲۹۳/۳	۵	۲۲۵/۹	۵	۲۴۴/۶	۹	۲۹۳/۵	۸	۲۷۴/۶	۱۰	۲۰۲/۵	۹	۲۲۱/۸
بیماری‌های مزمن تنفسی	۲۶	۱۴۹/۵	۲۳	۱۶۱/۷	۲۴	۱۷۰/۵	۲۴	۲۲۱/۶	۲۹	۹۳/۹	۲۵	۱۰۸/۹	۲۷	۱۱۲/۸	۲۲	۱۲۹/۹
بیماری‌های گوارشی	۱۶	۱۰۷/۳	۱۱	۱۱۱/۸	۱۰	۱۱۶/۹	۱۱	۱۶۲/۵	۲۳	۷۲/۷	۲۳	۸۰	۲۳	۶۸/۴	۲۱	۹۶/۶
سوانح حمل و نقل	۵	۱۱۲/۷	۴	۱۳۳/۶	۹	۱۶۰/۹	۸	۱۹۱/۸	۱۹	۳۷/۱	۱۸	۴۳/۱	۱۷	۴۵	۱۵	۵۱/۷
سوانح غیرعمدی	۱۶	۵۲/۹	۱۴	۵۸/۵	۱۲	۶۸/۱	۱۳	۸۳/۵	۱۵	۳۷/۲	۱۳	۴۲	۱۷	۴۰/۵	۱۹	۵۰/۸

میزان استاندارد شده سنی **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

مشکل سلامتی	مردان								زنان							
	۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰		۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰	
	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه ^۴	میزان
بیماری‌های قلبی-عروقی	۱۲	۳۱۳۰۶/۵	۱۱	۳۱۸۵۷/۶	۱۱	۳۱۵۳۳/۲	۱۳	۳۱۵۷۶/۷	۱۷	۳۲۳۶۶/۴	۲۰	۳۱۸۰۰/۲	۱۹	۳۱۸۳۷/۵	۱۹	۳۲۴۱۸/۱
سرطان‌ها	۲	۴۴۵۵/۸	۲	۳۸۷۸	۲	۲۷۲۰/۶	۶	۲۱۲۳/۶	۳	۲۵۳۴/۶	۴	۲۳۷۰/۴	۶	۱۵۴۸/۲	۱۰	۱۳۴۷/۹
اختلالات عصبی	۱۱	۵۲۱۴۶/۳	۱۶	۵۲۱۴۵/۹	۱۴	۵۱۹۹۸/۲	۱۳	۵۱۲۸۱/۹	۲۳	۵۸۲۰۳/۷	۱۸	۵۸۲۰۸/۹	۱۳	۵۷۶۰۳/۲	۲۰	۵۷۲۴۹/۱
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۱۱	۴۷۷۲۰/۴	۹	۴۳۸۷۸/۴	۸	۴۲۳۹۴/۹	۱۰	۴۱۴۸۹/۴	۱۰	۵۸۹۰۸/۳	۷	۵۳۱۳۵/۴	۷	۵۰۵۴۸/۹	۶	۵۰۱۷۰/۲
بیماری‌های مزمن تنفسی	۲۵	۱۲۳۰۶/۴	۲۶	۱۱۸۰۲/۷	۲۳	۱۱۸۶۷/۸	۲۴	۱۲۶۱۹/۲	۲۶	۱۴۶۵۸/۱	۲۴	۱۵۲۹۷	۲۰	۱۴۷۴۷/۳	۲۵	۱۴۶۹۲/۱
بیماری‌های گوارشی	۲۳	۶۶۳۷۹/۲	۱۹	۶۳۲۳۸/۷	۱۵	۵۹۷۰۷/۶	۱۸	۵۷۷۰۶/۳	۲۲	۵۲۹۶۵/۲	۲۲	۵۱۰۶۴/۶	۲۲	۴۷۵۷۳/۸	۱۹	۴۶۴۹۶/۲
سوانح حمل و نقل	۱۰	۹۶۱۸/۲	۱۴	۱۱۵۰۵/۳	۹	۱۲۱۹۵/۳	۹	۱۲۴۴۵/۳	۱۵	۶۱۱۱/۸	۲۱	۷۰۴۱/۴	۱۹	۶۸۶۲/۱	۱۸	۷۲۶۳/۲
سوانح غیرعمدی	۳۰	۲۸۵۰۶/۹	۲۹	۲۹۸۱۷	۲۳	۲۷۶۱۴/۶	۲۳	۳۰۸۲۴/۱	۱۳	۲۱۹۹۳/۶	۱۶	۲۱۱۷۰/۱	۱۷	۱۹۶۵۰/۶	۱۸	۲۲۴۶۸/۸

میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی و **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سال ۲۰۱۷ در سطح ملی و استان




^۲ علل براساس میزان استاندارد شده سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ و هر دو جنسیت در سطح ملی مرتب شده‌اند.


^۳ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی مرگ به تفکیک علت، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.

^۴ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی شیوع به تفکیک مشکل سلامتی، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.







جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۰۱۵/۷	۱۶۸۱/۲	۱۲۲۰/۸	۱۱۳۳/۵
زنان	۱۷۴۶/۲	۱۴۲۷/۱	۱۰۵۷/۷	۱۰۰۵/۲
مردان	۲۲۷۹	۱۹۰۲/۷	۱۳۵۵	۱۲۶۳/۵




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۰۵۷/۳	۸۲۲/۶	۶۲۷/۱	۵۳۸/۶
زنان	۱۰۰۵/۴	۷۵۹	۵۸۱/۴	۵۰۵/۱
مردان	۱۱۰۲/۱	۸۷۰	۶۶۰/۳	۵۷۳/۳




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۰۱/۴	۱۷۶/۶	۲۳۲/۱	۲۴۸/۳
زنان	۲۰۳/۱	۱۷۸/۱	۲۵۴/۱	۲۶۳/۷
مردان	۱۹۹/۷	۱۷۲/۶	۲۰۵/۸	۲۳۲



جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۷۲/۲	۷۹/۳	۱۰۸	۱۳۴/۳
زنان	۷۲/۱	۸۱/۲	۱۱۴/۴	۱۴۸/۸
مردان	۷۲/۵	۷۷/۲	۱۰۰/۷	۱۱۹/۳




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۸۴/۴	۶۹/۲	۷۳/۹	۶۹/۴
زنان	۷۰/۶	۵۶/۱	۵۹/۷	۵۵/۱
مردان	۹۹/۷	۸۲/۶	۸۷	۸۴




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۴/۳	۲۱/۸	۲۲/۵	۲۰
زنان	۱۸/۴	۱۶/۶	۲۰	۱۷/۷
مردان	۳۰/۲	۲۶/۷	۲۴/۶	۲۲/۴




Ischemic heart disease




Stroke




Alzheimer's disease and other dementias




Diabetes mellitus type 2





Lower respiratory infections





Falls







اختلالات افسردگی				اختلالات اضطرابی				جنسیت
۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	
۶۳۳۲/۱	۶۲۰۸/۴	۶۰۷۲/۵	۶۱۵۲/۳	۶۴۸۶/۶	۶۶۰۹/۷	۶۴۰۹/۱	۶۴۶۰/۱	هر دو
۷۳۹۵/۵	۷۲۸۸/۲	۷۱۲۹/۶	۷۱۷۵/۷	۸۲۰۴/۷	۸۳۹۳/۷	۸۲۵۲/۸	۸۲۷۱/۴	زنان
۵۲۳۷	۵۱۳۴	۵۱۱۰/۴	۵۲۰۰/۸	۴۷۱۷/۷	۴۸۴۴	۴۷۲۳	۴۷۵۲/۷	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۱۰۳۸۱/۵	۱۱۰۱۶/۸	۱۰۹۲۳/۵	۱۰۶۳۹/۹	هر دو
۱۰۱۳۸/۷	۱۰۷۰۵/۳	۱۰۵۶۵/۴	۱۰۳۱۳/۸	زنان
۱۰۶۲۹/۷	۱۱۳۲۱	۱۱۲۶۱/۵	۱۰۹۵۸	مردان



۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۶۰۶/۳	۹۰۸۷/۹	۷۹۹۵/۹	۸۷۳۷/۷	هر دو
۷۶۳۴	۷۶۰۸/۴	۶۷۵۱	۷۳۳۸/۳	زنان
۹۶۰۸/۵	۱۰۵۳۹/۴	۹۱۴۳/۹	۱۰۰۷۲/۵	مردان







۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۷۶۶۷/۷	۷۵۰۰/۶	۶۹۵۰/۴	۶۷۶۵/۱	هر دو
۸۳۹۰/۳	۸۶۰۸/۵	۷۸۵۶/۱	۷۴۵۶/۶	زنان
۶۹۲۶/۲	۶۴۳۷/۳	۶۱۲۱/۵	۶۱۰۰/۸	مردان



۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۳۹۶/۹	۸۱۰۸/۴	۸۱۰۴/۸	۸۹۱۸/۳	هر دو
۹۰۹۱/۵	۸۲۳۹/۱	۸۳۸۶/۷	۹۶۸۷/۳	زنان
۷۶۸۹/۸	۷۹۴۸/۱	۷۸۱۸/۴	۸۱۲۸/۶	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۵۳۲۹/۳	۵۳۹۲	۵۵۵۸/۸	۵۶۲۸/۲	هر دو
۵۵۸۸/۵	۵۶۶۱/۲	۵۸۱۶/۹	۵۸۵۱/۴	زنان
۵۰۶۴/۷	۵۱۳۰/۴	۵۲۹۸/۹	۵۳۸۴/۶	مردان





سیمای سلامت سالمندان

استان تهران

میزان مرگ و شیوع بیماری ها



سیمای سلامت سالمندان

استان تهران

(میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها در کل جمعیت، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (کمتر از ۶۰ سال) ساکن در استان تهران و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس و گروه‌های سنی بیان شده است. به منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مقایسه‌ای با شاخص کل کشور و مقایسه با استان‌های مجاور استان تهران شامل: استان‌های البرز، مرکزی، مازندران، قم و سمنان نیز تدوین و ترسیم شده است.

آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر این مطلب است که شایع‌ترین علل مرگ در سالمندان ساکن استان تهران (هر دو جنس) براساس میزان در سال ۲۰۱۷، به ترتیب بیماری‌های غیرواگیر، بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای و سوانح و حوادث است. این شاخص در افراد غیر سالمند ساکن استان تهران به ترتیب بیماری‌های غیرواگیر، سوانح و حوادث و بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای است و دارای الگوی متفاوت با سالمندان است.

روند زمانی تعداد مرگ به علت هر سه دسته اصلی بیماری‌ها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ در حال افزایش است. سالمندان ساکن در استان تهران و در سال ۲۰۱۷ از لحاظ میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای از میانگین کشوری بالاتر و به علت سوانح و حوادث پایین‌تر و به علت بیماری‌های غیرواگیر تقریباً یکسان با میانگین کشوری هستند.

سالمندان ساکن استان تهران از بین علل مختلف مرگ در سرطان‌ها (زنان و مردان در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷ و زنان در سال ۱۹۹۰)، اختلالات عصبی (زنان و مردان در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، دیابت و بیماری‌های کلیوی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) و بیماری‌های گوارشی (زنان و مردان در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) واجد رتبه‌ی ده و یا کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند. از نظر شیوع مشکلات سلامتی در سالمندان ساکن استان تهران، این گروه جمعیتی در بیماری‌های قلبی-عروقی (زنان در سال ۲۰۱۷)، سرطان‌ها (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، اختلالات عصبی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، دیابت و بیماری‌های کلیوی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، بیماری‌های گوارشی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) و سوانح غیر عمدی (زنان و مردان در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷ و زنان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰) یکی از ده استان دارای بالاترین شیوع در کل کشور بوده‌اند.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب و سکتة کاهشی؛ برای بیماری آلزایمر، عفونت‌های تنفسی تحتانی و دیابت نوع دو افزایشی و به علت افتادن ثابت است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری ایسکمیک قلب در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان تهران نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر بوده است. میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت سکتة در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان تهران، نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر بوده است. میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت دیابت نوع دو در زنان و مردان و به علت بیماری آلزایمر در مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان تهران نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ بیشتر بوده است.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع به علت مشکلات سلامتی در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی، بیماری ایسکمیک قلب و بیماری آلزایمر کاهشی و برای افتادن، بیماری مزمن انسدادی ریه و سکتة افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع برای اختلالات روانی و افتادن در زنان و مردان و به علت سکتة در مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان تهران در سال ۲۰۱۷ نسبت به تمام استان‌های مجاور بیشتر و به علت بیماری آلزایمر در مردان کمتر بوده است.




تعداد و میزان^۱ مرگ به تفکیک گروه سنی در سال ۲۰۱۷ در استان

گروه سنی	جنسیت	همه علل		بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای		بیماری‌های غیرواگیر		سوانح و حوادث	
		تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان
همه سنین	هر دو	۵۹۹۷۲	۴۴۰/۶	۳۵۰۰	۲۵/۷	۵۲۸۹۳	۳۸۸/۶	۳۵۷۹	۲۶/۳
	زنان	۲۵۱۶۹	۳۷۲/۲	۱۵۱۱	۲۲/۳	۲۲۸۲۳	۳۳۷/۵	۸۳۶	۱۲/۴
	مردان	۳۴۸۰۲	۵۰۸	۱۹۸۹	۲۹	۳۰۰۷۱	۴۳۸/۹	۲۷۴۲	۴۰
کمتر از ۶۰ سال	هر دو	۱۷۴۷۰	۱۴۳/۵	۱۸۷۷	۱۵/۴	۱۲۷۸۲	۱۰۵	۲۸۱۱	۲۳/۱
	زنان	۵۷۹۰	۹۵/۹	۷۷۸	۱۲/۹	۴۴۸۰	۷۴/۲	۵۳۲	۸/۸
	مردان	۱۱۶۸۰	۱۹۰/۵	۱۰۹۹	۱۷/۹	۸۳۰۲	۱۳۵/۴	۲۲۷۹	۳۷/۲
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۴۲۵۰۱	۲۹۴۸/۷	۱۶۲۳	۱۱۲/۶	۴۰۱۱۱	۲۷۸۲/۸	۷۶۷	۵۳/۲
	زنان	۱۹۳۷۹	۲۶۷۹/۳	۷۳۲	۱۰۱/۳	۱۸۳۴۳	۲۵۳/۶	۳۰۴	۴۲
	مردان	۲۳۱۲۲	۳۲۱۹/۹	۸۹۱	۱۲۴	۲۱۷۶۸	۳۰۳۱/۴	۴۶۳	۶۴/۵
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۴۸۱۶	۹۴۰	۱۷۲	۳۳/۶	۴۵۰۵	۸۷۹/۲	۱۴۰	۲۷/۲
	زنان	۱۸۱۵	۷۱۱/۸	۶۴	۲۵/۲	۱۷۱۱	۶۷۱	۴۰	۱۵/۶
	مردان	۳۰۰۱	۱۱۶۶/۲	۱۰۸	۴۱/۹	۲۷۹۳	۱۰۸۵/۶	۱۰۰	۳۸/۷
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۵۱۴۷	۱۴۵۸/۷	۱۷۱	۴۸/۵	۴۸۶۴	۱۳۷۸/۷	۱۱۱	۳۱/۵
	زنان	۲۱۵۴	۱۱۹۴/۴	۷۰	۳۸/۹	۲۰۴۴	۱۱۳۳/۷	۳۹	۲۱/۹
	مردان	۲۹۹۳	۱۷۳۴/۹	۱۰۱	۵۸/۶	۲۸۲۰	۱۶۳۴/۷	۷۲	۴۱/۶
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۵۹۸۲	۲۴۶۱/۱	۱۹۹	۸۱/۷	۵۶۷۵	۲۳۳۴/۷	۱۰۹	۴۴/۷
	زنان	۲۶۰۵	۲۱۲۳/۵	۷۹	۶۴/۷	۲۴۸۶	۲۰۲۶/۴	۴۰	۳۲/۴
	مردان	۳۳۷۷	۲۸۰۵/۲	۱۱۹	۹۹	۳۱۸۹	۲۶۴۸/۹	۶۹	۵۷/۲
۷۵ تا ۷۹ سال	هر دو	۷۳۰۵	۴۴۱۹	۲۶۵	۱۶۰/۱	۶۹۱۹	۴۱۸۵/۵	۱۲۱	۷۳/۳
	زنان	۳۲۶۱	۳۹۶۰/۹	۱۱۶	۱۴۰/۴	۳۰۹۹	۳۷۶۳/۴	۴۷	۵۷/۲
	مردان	۴۰۴۴	۴۸۷۳/۶	۱۴۹	۱۷۹/۷	۳۸۲۰	۴۶۰۴/۵	۷۴	۸۹/۴
۸۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۹۲۵۲	۱۱۴۶۹/۹	۸۱۷	۴۸۶/۶	۱۸۱۴۸	۱۰۸۱۲/۵	۲۸۷	۱۷۰/۷
	زنان	۹۵۴۳	۱۱۵۱۱/۳	۴۰۳	۴۸۶/۳	۹۰۰۲	۱۰۸۵۸/۶	۱۳۸	۱۶۶/۴
	مردان	۹۷۰۸	۱۱۴۲۹/۴	۴۱۴	۴۸۶/۹	۹۱۴۶	۱۰۷۶۷/۶	۱۴۹	۱۷۵

امید زندگی (سال) در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ در استان

جنسیت	بدو تولد		۶۰ تا ۶۴ سال		۶۵ تا ۶۹ سال		۷۰ تا ۷۴ سال		۷۵ تا ۷۹ سال		۸۰ سال و بالاتر	
	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰
زنان	۶۲/۸	۸۴/۲	۱۲/۹	۲۷/۵	۹/۵	۲۳/۲	۶/۸	۱۹	۴/۵	۱۵/۲	۲/۸	۱۲/۱
مردان	۵۷/۶	۷۹/۷	۱۲/۷	۲۵/۶	۹/۵	۲۱/۷	۷/۳	۱۸	۴/۹	۱۴/۸	۳/۷	۱۲/۵

روند زمانی تعداد در مقابل میزان استاندارد شده سنی مرگ در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سطح ملی و استان



^۱ در این گزارش تمامی میزان‌ها در ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت گزارش شده‌اند.




میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

علت ^۲	مردان								زنان							
	۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰		۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰	
	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه ^۳	میزان
بیماری‌های قلبی-عروقی	۳۰	۱۵۵۸/۴	۳۱	۱۴۶۹/۴	۳۱	۱۲۳۲/۹	۳۱	۱۵۴۳/۷	۳۱	۱۴۶۷/۳	۳۱	۱۵۲۲/۱	۳۱	۱۲۶۵/۸	۳۱	۱۴۵۷/۳
سرطان‌ها	۴	۸۱۱/۷	۹	۶۵۴/۲	۲۹	۳۹۹/۶	۲۱	۵۸۲/۶	۲	۵۴۹/۸	۲	۵۰۴/۱	۱۳	۳۳۱/۶	۹	۴۲۰
اختلالات عصبی	۵	۴۱۳/۱	۵	۳۲۸	۱۶	۲۲۰/۳	۱۵	۲۶۸/۶	۶	۴۵۲/۶	۷	۴۰۲/۵	۱۵	۲۷۴/۱	۱۴	۳۰۵/۸
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۱	۵۲۹/۳	۱	۴۹۳/۳	۱	۳۳۰	۱	۳۶۶/۴	۱	۵۱۳/۷	۱	۵۱۳/۲	۱	۳۷۷/۹	۱	۳۸۱/۶
بیماری‌های مزمن تنفسی	۲۰	۱۸۲/۱	۲۲	۱۷۹/۳	۲۸	۱۴۵/۸	۲۸	۱۸۸/۹	۲۰	۱۱۷/۴	۲۲	۱۲۶/۴	۲۹	۹۲/۸	۳۱	۹۵/۵
بیماری‌های گوارشی	۵	۱۳۱/۳	۷	۱۱۷/۶	۲۲	۸۱/۸	۲۵	۱۱۴/۳	۵	۱۱۱/۲	۶	۱۰۹/۳	۱۵	۷۸/۲	۱۸	۱۰۱/۵
سوانح حمل و نقل	۳۱	۱۶/۹	۳۱	۱۹/۱	۳۱	۱۴/۹	۳۱	۱۶/۹	۳۱	۱۱/۲	۳۱	۱۲/۹	۳۱	۱۰/۱	۳۱	۱۰/۴
سوانح غیرعمدی	۳۰	۴۶/۲	۲۷	۴۸/۲	۳۰	۴۲/۸	۳۱	۵۰/۱	۱۲	۳۸/۸	۱۴	۴۱/۷	۲۴	۳۶/۲	۲۹	۳۸/۹

میزان استاندارد شده سنی **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

مشکل سلامتی	مردان								زنان							
	۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰		۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰	
	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه ^۴	میزان
بیماری‌های قلبی-عروقی	۱۱	۳۱۳۳۳/۱	۱۹	۳۱۱۸۱/۹	۲۴	۳۰۶۴۲/۵	۲۴	۳۰۹۰۳/۵	۱۰	۳۲۸۰۸/۵	۱۲	۳۲۲۷۹	۱۷	۳۱۹۵۵/۱	۲۲	۳۲۰۳۵/۳
سرطان‌ها	۱	۶۱۳۶	۱	۴۵۹۲/۵	۴	۲۶۲۹/۹	۱	۲۷۲۱/۶	۱	۴۰۲۶/۴	۱	۳۵۰۳/۳	۲	۲۲۰۵/۸	۱	۲۲۴۷/۱
اختلالات عصبی	۱	۵۵۰۸۳/۲	۱	۵۵۰۹۶/۸	۱	۵۵۰۰۷/۱	۱	۵۴۲۷۶/۸	۲	۵۸۷۲۱	۲	۵۸۷۱۱/۷	۲	۵۸۳۷۹/۴	۲	۵۸۱۹۵
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۲	۵۳۰۷۳/۱	۲	۴۷۶۵۶/۵	۲	۴۵۶۷۳/۳	۳	۴۴۹۲۴/۴	۱	۶۴۲۶۲/۷	۱	۵۸۸۸۱/۱	۱	۵۶۵۶۵	۱	۵۵۰۴۰
بیماری‌های مزمن تنفسی	۱۲	۱۳۰۴۷/۳	۲۱	۱۱۹۹۳/۹	۲۸	۱۱۲۱۲/۷	۳۰	۱۱۶۴۳/۶	۱۶	۱۵۰۶۱/۱	۲۶	۱۵۰۱۹	۲۸	۱۳۸۲۴/۸	۳۱	۱۳۱۶۷/۳
بیماری‌های گوارشی	۲	۶۷۶۷۶/۹	۲	۶۴۵۲۴/۴	۲	۶۰۸۸۰/۴	۲	۵۹۰۵۹/۴	۳	۵۴۴۷۰/۸	۳	۵۲۳۶۷	۳	۴۸۹۵۷/۵	۳	۴۷۹۶۵/۷
سوانح حمل و نقل	۳۱	۷۳۰۸	۳۱	۶۸۲۴/۶	۳۱	۵۸۴۵/۴	۳۱	۵۶۸۷/۶	۳۱	۴۸۶۸/۶	۳۱	۴۷۸۳/۷	۳۱	۴۱۴۵/۷	۳۱	۴۲۱۲/۶
سوانح غیرعمدی	۳	۳۶۶۶۰/۶	۶	۳۳۹۲۱/۱	۲۱	۲۸۱۳۶/۸	۳۰	۲۸۶۵۵/۵	۳	۳۱۲۵۵/۵	۳	۲۷۷۲۹/۶	۲	۲۳۹۲۰/۴	۶	۲۴۳۸۳/۲

میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی و **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سال ۲۰۱۷ در سطح ملی و استان




^۲ علل براساس میزان استاندارد شده سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ و هر دو جنسیت در سطح ملی مرتب شده‌اند.


^۳ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی مرگ به تفکیک علت، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.

^۴ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی شیوع به تفکیک مشکل سلامتی، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.







جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۹۲۱/۲	۷۸۲/۲	۸۹۶/۸	۹۰۳
زنان	۸۷۳/۴	۷۶۶/۹	۸۹۶/۴	۸۶۰/۵
مردان	۹۶۱	۷۷۴/۲	۸۸۶/۸	۹۴۳




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۳۹۹/۶	۳۳۱/۶	۳۹۹/۲	۳۹۳/۶
زنان	۳۸۱/۵	۳۲۸/۳	۳۹۵/۹	۳۷۵/۱
مردان	۴۱۸/۱	۳۲۸/۴	۳۹۹/۳	۴۱۱/۳




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۴۹/۵	۲۱۳/۸	۳۱۳/۱	۳۷۷/۳
زنان	۲۷۲/۹	۲۴۲/۵	۳۵۹	۴۰۹/۷
مردان	۲۱۷/۷	۱۷۶/۱	۲۶۴/۹	۳۴۳/۷



جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۳۲/۶	۲۲۶/۷	۳۳۲/۱	۳۴۵/۴
زنان	۲۵۳/۷	۲۵۶/۶	۳۵۶/۹	۳۶۰/۳
مردان	۲۰۶/۶	۱۹۳/۹	۳۰۶/۳	۳۲۹/۸




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۹۸/۸	۸۴/۱	۱۰۶/۳	۱۰۷/۸
زنان	۹۴/۴	۸۳/۹	۱۰۵/۴	۱۰۱/۷
مردان	۱۰۳/۴	۸۲/۹	۱۰۶/۱	۱۱۳/۷




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۰	۱۹/۶	۲۱	۲۰
زنان	۱۹/۳	۱۹/۳	۲۱/۵	۲۰/۲
مردان	۲۰/۱	۱۸/۸	۲۰/۲	۱۹/۷




Ischemic heart disease




Stroke




Alzheimer's disease and other dementias




Diabetes mellitus type 2





Lower respiratory infections





Falls







اختلالات افسردگی				اختلالات اضطرابی				جنسیت
۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	
۷۳۲۶/۲	۷۳۵۳/۴	۷۴۵۹/۹	۷۴۲۷/۹	۶۴۶۸/۵	۶۶۰۰/۴	۶۴۱۴/۲	۶۵۴۴/۷	هر دو
۸۹۸۲/۹	۹۰۴۶/۴	۹۲۶۴/۵	۸۹۹۹/۲	۸۲۰۴/۷	۸۳۹۳/۷	۸۲۵۲/۸	۸۲۷۱/۴	زنان
۵۶۵۴/۲	۵۶۹۳/۶	۵۸۱۶/۹	۵۸۱۷/۵	۴۷۱۷/۷	۴۸۴۴	۴۷۲۳	۴۷۵۲/۷	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۱۱۲۰۲	۱۲۱۰۷/۴	۱۲۱۷۴/۳	۱۲۰۷۴/۲	هر دو
۱۰۹۳۴/۵	۱۱۷۶۱/۶	۱۱۷۹۲/۵	۱۱۷۱۶	زنان
۱۱۴۷۱/۵	۱۲۴۴۶	۱۲۵۳۵/۲	۱۲۴۶۲/۷	مردان



۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۱۴۸۰۴/۱	۱۳۳۰۰/۳	۱۰۹۴۴/۱	۱۱۰۲۴/۶	هر دو
۱۳۸۵۰/۴	۱۲۲۳۸/۵	۱۰۶۳۰/۴	۱۰۶۲۹	زنان
۱۵۷۶۴/۹	۱۴۳۲۹/۳	۱۱۲۰۱/۸	۱۱۴۰۹/۸	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۲۱۱/۶	۷۸۶۱/۶	۷۱۸۲/۳	۶۹۲۶/۶	هر دو
۸۷۵۲/۵	۸۷۷۳/۹	۷۸۲۱/۶	۷۱۳۷/۶	زنان
۷۶۶۸/۴	۶۹۷۶/۵	۶۵۸۰/۹	۶۷۰۴/۳	مردان




۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۷۳۵۳	۶۳۰۸/۷	۵۷۵۳	۶۲۲۷/۸	هر دو
۷۷۰۸/۱	۶۷۲۱/۸	۶۲۰۴/۷	۶۶۴۰/۵	زنان
۶۹۹۶/۸	۵۹۰۰/۷	۵۲۷۵/۸	۵۷۲۳/۲	مردان


۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۵۲۹۳/۶	۵۳۴۲	۵۴۸۹/۲	۵۵۴۵/۵	هر دو
۵۵۶۹/۸	۵۶۲۰/۷	۵۷۴۷/۲	۵۷۶۴	زنان
۵۰۱۶/۹	۵۰۶۸/۵	۵۲۱۴/۳	۵۲۶۹/۹	مردان




Mental disorders
Female Male




Ischemic heart disease
Female Male




Falls
Female Male




Chronic obstructive pulmonary disease
Female Male



Stroke
Female Male



Alzheimer's disease and other dementias
Female Male



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
آمار و سلامت سالانه

سیمای سلامت سالمندان

استان چهارمحال و بختیاری

میزان مرگ و شیوع بیماری ها

سیمای سلامت سالمندان

استان چهارمحال و بختیاری

(میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها)



در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها در کل جمعیت، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (کمتر از ۶۰ سال) ساکن در استان چهارمحال و بختیاری و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس و گروه‌های سنی بیان شده است. به منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی حاوی: اطلاعات مقایسه‌ای با شاخص کل کشور و مقایسه با استان‌های مجاور استان چهارمحال و بختیاری شامل: استان‌های اصفهان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان نیز تدوین و ترسیم شده است.

آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر این مطلب است که شایع‌ترین علل مرگ در سالمندان ساکن استان چهارمحال و بختیاری (هر دو جنس) براساس میزان در سال ۲۰۱۷، به ترتیب بیماری‌های غیرواگیر، سوانح و حوادث و بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای است. این شاخص در افراد غیر سالمند ساکن استان چهارمحال و بختیاری دارای الگویی مشابه سالمندان است. روند زمانی تعداد مرگ به علت هر سه دسته اصلی بیماری‌ها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ در حال افزایش است. سالمندان ساکن در استان چهارمحال و بختیاری و در سال ۲۰۱۷ از لحاظ میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای و بیماری‌های غیرواگیر از میانگین کشوری پایین‌تر و به علت سوانح و حوادث از میانگین کشوری بالاتر هستند. سالمندان ساکن استان چهارمحال و بختیاری، از بین علل مختلف مرگ در بیماری‌های قلبی-عروقی (زنان در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷ و مردان در سال ۲۰۱۷) واجد رتبه‌ی ده و کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند. از نظر شیوع مشکلات سلامتی در سالمندان ساکن استان چهارمحال و بختیاری، این گروه جمعیتی در سوانح حمل و نقل (زنان و مردان در سال ۲۰۱۷) واجد رتبه‌ی ده و کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند. روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، سکته، عفونت‌های تنفسی تحتانی و افتادن کاهشی و برای بیماری آلزایمر و دیابت نوع دو افزایشی است. میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری ایسکمیک قلب در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان چهارمحال و بختیاری نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ بیشترین و به علت عفونت‌های تنفسی تحتانی کمترین بوده است. روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع به علت مشکلات سلامتی در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، افتادن و بیماری آلزایمر کاهشی و برای اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی، بیماری مزمن انسدادی ریه و سکته افزایشی بوده است. میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع برای مشکلات سلامتی افتادن در مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان چهارمحال و بختیاری نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ بیشتر بوده است.




تعداد و میزان^۱ مرگ به تفکیک گروه سنی در سال ۲۰۱۷ در استان

گروه سنی	جنسیت	همه علل		بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای		بیماری‌های غیرواگیر		سوانح و حوادث	
		تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان
همه سنین	هر دو	۴۳۰۰	۴۳۹/۵	۱۶۱	۱۶/۵	۳۵۶۵	۳۶۴/۴	۵۷۴	۵۸/۶
	زنان	۱۸۰۶	۳۷۶/۵	۶۷	۱۴	۱۵۹۹	۳۳۳/۳	۱۴۰	۲۹/۱
	مردان	۲۴۹۳	۵۰۰/۱	۹۴	۱۸/۸	۱۹۶۶	۳۹۴/۳	۴۳۴	۸۷
کمتر از ۶۰ سال	هر دو	۱۲۹۶	۱۴۵/۶	۱۰۹	۱۲/۳	۷۱۵	۸۰/۲	۴۷۳	۵۳/۱
	زنان	۴۱۹	۹۶/۳	۴۶	۱۰/۶	۲۶۷	۶۱/۳	۱۰۶	۲۴/۴
	مردان	۸۷۷	۱۹۲/۶	۶۳	۱۳/۸	۴۴۸	۹۸/۴	۳۶۷	۸۰/۵
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۳۰۰۳	۳۴۲۶/۷	۵۲	۵۹/۴	۲۸۵۰	۳۲۵۲/۴	۱۰۱	۱۱۴/۹
	زنان	۱۳۸۷	۳۱۱۸/۶	۲۱	۴۷/۲	۱۳۳۳	۲۹۹۵/۸	۳۴	۷۵/۶
	مردان	۱۶۱۶	۳۷۴۴/۲	۳۱	۷۲	۱۵۱۸	۳۵۱۶/۸	۶۷	۱۵۵/۵
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۲۵۲	۸۳۱	۴	۱۲/۸	۲۲۷	۷۴۸/۴	۲۱	۶۹/۹
	زنان	۹۴	۶۱۴/۶	۱	۸/۶	۸۷	۵۷۱/۸	۵	۳۴/۳
	مردان	۱۵۸	۱۰۴۹/۶	۳	۱۷	۱۴۰	۹۲۶/۷	۱۶	۱۰۵/۹
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۳۰۴	۱۴۶۰/۱	۴	۲۱/۲	۲۸۲	۱۳۵۵	۱۷	۸۴
	زنان	۱۳۸	۱۲۲۳/۸	۲	۱۵/۸	۱۳۰	۱۱۵۶/۷	۶	۵۱/۲
	مردان	۱۶۶	۱۷۳۸/۷	۳	۲۷/۵	۱۵۲	۱۵۸۸/۷	۱۲	۱۲۲/۵
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۲۹۴	۲۵۰۶/۵	۴	۳۷/۵	۲۷۷	۲۳۶۸	۱۲	۱۰۰/۹
	زنان	۱۴۴	۲۲۵۸/۸	۲	۲۹/۷	۱۳۸	۲۱۶۰/۱	۴	۶۹
	مردان	۱۴۹	۲۸۰۲/۸	۲	۴۶/۹	۱۴۰	۲۶۱۶/۸	۷	۱۳۹/۱
۷۵ تا ۷۹ سال	هر دو	۴۵۴	۴۴۰۲/۲	۷	۶۷	۴۳۴	۴۲۰۱/۲	۱۴	۱۳۴
	زنان	۲۱۲	۴۱۷۸/۲	۳	۵۵	۲۰۴	۴۰۲۷/۹	۵	۹۵/۴
	مردان	۲۴۳	۴۶۱۸/۱	۴	۷۸/۶	۲۳۰	۴۳۶۸/۳	۹	۱۷۱/۲
۸۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۷۰۰	۱۱۷۱۶/۶	۳۲	۲۲۳/۹	۱۶۳۱	۱۱۲۴۱/۶	۳۶	۲۵۱/۱
	زنان	۸۰۰	۱۲۲۰۵/۸	۱۳	۲۰۱/۹	۷۷۳	۱۱۷۹۹/۷	۱۳	۲۰۴/۳
	مردان	۹۰۰	۱۱۳۱۳/۳	۱۹	۲۴۲/۱	۸۵۷	۱۰۷۸۱/۶	۲۳	۲۸۹/۶

امید زندگی (سال) در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ در استان

جنسیت	بدو تولد		۶۰ تا ۶۴ سال		۶۵ تا ۶۹ سال		۷۰ تا ۷۴ سال		۷۵ تا ۷۹ سال		۸۰ سال و بالاتر	
	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰
زنان	۶۷/۵	۸۰/۷	۱۶/۶	۲۳/۹	۱۳/۱	۱۹/۷	۹/۹	۱۵/۸	۷/۵	۱۲/۳	۶/۴	۹/۳
مردان	۶۵/۲	۷۵/۳	۱۵/۸	۲۱/۴	۱۲/۵	۱۷/۵	۹/۷	۱۳/۷	۷/۱	۱۰/۲	۶/۴	۷/۱

روند زمانی تعداد در مقابل میزان استاندارد شده سنی مرگ در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سطح ملی و استان



^۱ در این گزارش تمامی میزان‌ها در ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت گزارش شده‌اند.




میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

علت ^۲	زنان								مردان							
	۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷		۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷	
	میزان	رتبه ^۳	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه
بیماری‌های قلبی-عروقی	۲۷۴۴/۱	۲۳	۲۳۳۴/۳	۱۹	۲۲۷۳/۶	۹	۲۲۹۶/۹	۴	۳۰۲۴/۷	۱۶	۲۴۲۵/۲	۱۶	۲۲۹۲/۷	۱۳	۲۲۳۱/۶	۹
سرطان‌ها	۳۰۲	۲۸	۲۶۰/۸	۲۶	۳۴۰/۱	۳۰	۴۰۴/۵	۱۶	۵۶۹/۸	۲۳	۴۴۴/۴	۲۴	۵۳۷/۴	۲۶	۵۹۱/۶	۲۲
اختلالات عصبی	۲۰۳/۵	۲۹	۱۸۰/۲	۲۹	۲۵۸	۲۹	۳۳۳/۸	۲۸	۱۸۶	۲۹	۱۴۸/۸	۲۹	۱۹۸/۷	۳۰	۲۴۸/۵	۲۹
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۱۰۹/۵	۳۰	۱۰۴/۵	۳۰	۱۲۴/۳	۳۰	۱۴۰	۳۰	۱۳۷/۶	۲۶	۱۱۹/۵	۲۵	۱۳۷/۶	۲۹	۱۴۲/۶	۳۰
بیماری‌های مزمن تنفسی	۱۲۷/۶	۲۳	۱۲۰/۱	۲۲	۱۰۶/۹	۲۶	۱۰۱/۵	۲۴	۲۲۰/۷	۲۵	۱۷۰/۹	۲۳	۱۴۳/۹	۲۸	۱۳۶	۲۸
بیماری‌های گوارشی	۶۴/۷	۳۰	۴۷/۵	۳۰	۶۰	۲۹	۶۸/۵	۲۷	۹۳/۸	۲۸	۶۲	۲۹	۷۶/۴	۲۶	۸۴/۶	۲۶
سوانح حمل و نقل	۴۵/۸	۲۲	۴۰/۶	۲۲	۴۱/۲	۲۱	۳۸/۵	۱۵	۱۴۶/۵	۱۷	۱۲۲/۴	۱۶	۱۰۳/۱	۲۰	۸۷/۳	۲۰
سوانح غیرعمدی	۴۲/۶	۲۶	۳۳/۹	۲۶	۳۴/۱	۲۶	۳۳/۴	۲۱	۷۵/۵	۲۲	۶۰/۱	۲۰	۵۴/۶	۲۰	۵۲/۷	۱۷

میزان استاندارد شده سنی **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

مشکل سلامتی	زنان								مردان							
	۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷		۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷	
	میزان	رتبه ^۴	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه
بیماری‌های قلبی-عروقی	۳۲۰۱۳/۸	۲۳	۳۱۴۴۴/۳	۲۳	۳۱۵۹۴	۲۲	۳۲۴۲۹/۱	۱۵	۳۰۹۴۷/۹	۲۲	۳۰۶۶۴/۶	۲۲	۳۱۱۹۲/۸	۱۸	۳۱۱۸۳/۶	۱۵
سرطان‌ها	۱۱۰۳/۸	۲۸	۱۱۶۸/۹	۲۵	۱۸۲۷/۸	۲۳	۲۳۰۶/۱	۱۵	۱۶۸۰/۳	۲۵	۱۷۸۹/۷	۲۶	۲۷۱۲/۵	۲۷	۳۳۹۲	۲۱
اختلالات عصبی	۵۷۲۵۷/۶	۱۱	۵۷۵۸۸/۱	۲۰	۵۸۲۱۶	۱۱	۵۸۲۱۹	۱۳	۵۱۲۸۶/۹	۱۱	۵۱۹۸۸/۸	۱۸	۵۲۱۴۲/۱	۱۸	۵۲۱۳۵/۴	۱۷
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۴۵۵۲۷/۹	۳۰	۴۵۸۹۶/۶	۳۰	۴۸۲۹۰/۷	۳۰	۵۵۱۴۰	۲۸	۳۷۷۷۲/۹	۲۵	۳۸۳۰۵/۸	۲۵	۳۹۷۹۶/۶	۲۵	۴۴۷۷۴/۳	۲۷
بیماری‌های مزمن تنفسی	۱۴۵۱۳/۵	۲۷	۱۳۸۶۲/۹	۲۷	۱۴۴۰۴/۳	۲۷	۱۴۴۸۶/۹	۲۷	۱۲۷۸۶/۴	۲۲	۱۱۲۹۹/۲	۲۶	۱۱۱۹۴/۳	۲۷	۱۱۷۸۴/۳	۲۷
بیماری‌های گوارشی	۴۵۹۶۴/۳	۲۸	۴۷۲۳۴/۶	۲۸	۵۰۷۰۴/۴	۲۹	۵۲۸۱۵/۲	۲۷	۵۷۱۷۴/۴	۲۶	۵۹۳۶۸/۵	۲۵	۶۲۹۵۱/۱	۲۶	۶۶۲۶۸/۹	۲۶
سوانح حمل و نقل	۷۳۲۱/۷	۱۶	۶۸۶۱/۵	۲۰	۷۳۳۸	۱۲	۶۳۲۳/۴	۶	۱۲۲۶۵/۱	۱۱	۱۱۷۳۵/۳	۱۴	۱۱۴۵۸/۴	۱۷	۹۷۲۴/۸	۷
سوانح غیرعمدی	۲۲۰۹۶/۳	۲۲	۱۹۱۱۲/۳	۲۳	۲۰۵۷۴/۷	۲۴	۲۱۷۰۲	۲۲	۳۲۹۸۳/۳	۱۴	۲۸۹۰۳/۷	۱۴	۳۱۷۷۷/۴	۱۷	۳۰۵۱۷/۲	۱۲

میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی و **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سال ۲۰۱۷ در سطح ملی و استان




^۲ علل براساس میزان استاندارد شده سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ و هر دو جنسیت در سطح ملی مرتب شده‌اند.


^۳ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی مرگ به تفکیک علت، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.

^۴ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی شیوع به تفکیک مشکل سلامتی، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.







جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۰۳۰/۶	۱۷۱۸/۷	۱۴۴۲/۱	۱۴۳۷/۱
زنان	۱۸۴۴/۱	۱۶۱۸/۵	۱۳۹۶/۳	۱۴۲۸/۹
مردان	۲۱۹۷/۴	۱۷۸۷/۹	۱۴۹۷	۱۴۶۶/۸




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۶۲۵/۴	۴۸۴/۷	۴۲۴	۴۳۱/۵
زنان	۶۳۸/۴	۵۰۲/۹	۴۳۳/۵	۴۴۸/۱
مردان	۶۰۱/۵	۴۵۹/۸	۴۱۷/۷	۴۲۱/۳




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۷۰/۸	۱۴۲/۴	۱۹۶/۶	۲۵۳/۶
زنان	۱۸۴/۲	۱۶۲/۴	۲۳۴/۱	۳۰۶/۳
مردان	۱۵۳/۳	۱۲۱	۱۶۴/۲	۲۰۹/۴



جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۴۱/۸	۴۴/۸	۵۸/۸	۶۴/۷
زنان	۳۹/۴	۴۳/۹	۵۸/۲	۶۷/۷
مردان	۴۴/۵	۴۵/۶	۵۹/۶	۶۱/۸




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۴۸/۴	۳۹/۷	۴۳/۵	۴۵/۱
زنان	۴۰/۱	۳۳/۴	۳۶/۷	۳۸/۵
مردان	۵۷	۴۵/۲	۴۹/۴	۵۱/۵




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۴/۲	۲۱/۵	۲۱/۳	۲۰/۲
زنان	۱۳/۸	۱۲/۴	۱۵/۱	۱۴/۳
مردان	۳۴/۴	۲۹/۷	۲۷/۳	۲۶




Ischemic heart disease




Stroke




Alzheimer's disease and other dementias




Diabetes mellitus type 2





Lower respiratory infections





Falls







اختلالات افسردگی				اختلالات اضطرابی				جنسیت
۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	
۶۳۴۶/۳	۶۲۲۳/۲	۶۰۵۰/۷	۶۰۹۶/۲	۶۴۹۹/۲	۶۶۳۹/۹	۶۳۵۳/۷	۶۳۷۰	هر دو
۷۳۹۲/۵	۷۲۷۳/۵	۷۱۲۹/۴	۷۱۶۹/۸	۸۲۰۴/۷	۸۳۹۳/۷	۸۲۵۲/۸	۸۲۷۱/۴	زنان
۵۲۴۴/۷	۵۱۳۱/۲	۵۱۲۴/۱	۵۱۹۹/۷	۴۷۱۷/۷	۴۸۴۴	۴۷۲۳	۴۷۵۲/۷	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۱۰۲۳۵/۹	۱۰۹۸۷	۱۰۸۰۹/۵	۱۰۵۰۵	هر دو
۱۰۰۳۱/۴	۱۰۷۲۴/۵	۱۰۴۹۶/۷	۱۰۲۱۷/۳	زنان
۱۰۴۴۳/۳	۱۱۲۳۸	۱۱۰۸۳	۱۰۷۶۷	مردان



۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۹۲۵۳/۸	۹۷۰۱/۳	۸۵۴۸/۳	۹۷۱۹/۷	هر دو
۷۴۴۹/۹	۷۰۳۵/۴	۶۰۶۳/۳	۶۸۷۳/۹	زنان
۱۱۱۲۲/۸	۱۲۳۶۳/۴	۱۰۶۸۸/۷	۱۲۲۲۳/۴	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۷۱۸۶/۷	۶۸۵۴	۶۳۴۵/۲	۶۵۵۷/۶	هر دو
۸۱۱۵/۳	۸۰۵۰/۳	۷۴۲۹/۶	۷۳۹۱/۵	زنان
۶۲۳۳/۶	۵۶۹۹/۷	۵۴۳۲	۵۸۲۳/۶	مردان




۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۷۴۱۴/۸	۶۵۲۲/۵	۶۲۹۸/۱	۷۱۶۲/۹	هر دو
۸۱۷۳/۳	۶۸۹۵/۷	۶۸۸۹/۸	۸۰۲۱/۴	زنان
۶۶۶۰/۳	۶۱۵۲/۲	۵۷۷۷/۸	۶۳۵۰/۴	مردان


۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۵۳۱۹/۴	۵۳۷۱/۶	۵۵۲۷/۶	۵۶۱۹	هر دو
۵۵۸۹/۳	۵۶۵۱/۸	۵۷۹۵/۴	۵۸۴۱/۲	زنان
۵۰۶۳/۱	۵۱۲۶/۸	۵۲۹۳/۵	۵۳۸۷/۸	مردان




Mental disorders




Ischemic heart disease




Falls




Chronic obstructive pulmonary disease



Stroke



Alzheimer's disease and other dementias



سیمای سلامت سالمندان

استان خراسان جنوبی

میزان مرگ و شیوع بیماری ها



سیمای سلامت سالمندان

استان خراسان جنوبی

(میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها در کل جمعیت، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (کمتر از ۶۰ سال) ساکن در استان خراسان جنوبی و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس و گروه‌های سنی بیان شده است. به منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی حاوی: اطلاعات مقایسه‌ای با شاخص کل کشور و مقایسه با استان‌های مجاور استان خراسان جنوبی شامل: استان‌های اصفهان، کرمان، خراسان رضوی، سمنان، سیستان و بلوچستان و یزد نیز تدوین و ترسیم شده است.

آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر این مطلب است که شایع‌ترین علل مرگ در سالمندان ساکن استان خراسان جنوبی (هر دو جنس) براساس میزان در سال ۲۰۱۷، به ترتیب بیماری‌های غیرواگیر، بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای و سوانح و حوادث است. این شاخص در افراد غیر سالمند ساکن استان سیستان و بلوچستان به ترتیب بیماری‌های غیرواگیر، سوانح و حوادث و بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای است و دارای الگویی متفاوت با سالمندان است.

روند زمانی تعداد مرگ به علت هر سه دسته اصلی بیماری‌ها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ در حال افزایش است. سالمندان ساکن در استان خراسان جنوبی و در سال ۲۰۱۷ از لحاظ میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای و سوانح و حوادث از میانگین کشوری بالاتر و از لحاظ بیماری‌های غیرواگیر پایین‌تر هستند. لازم به ذکر است تغییر ناگهانی که در تعداد و میزان مرگ به علت سوانح و حوادث اتفاق افتاده به علت زمین لرزه رخ داده در اردیبهشت سال ۱۳۷۶ در این استان است.

سالمندان ساکن استان خراسان جنوبی، از بین علل مختلف مرگ در بیماری‌های مزمن تنفسی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، بیماری‌های گوارشی (زنان و مردان در سال ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ و زنان در سال ۲۰۰۰)، سوانح حمل و نقل (زنان در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) و سوانح غیر عمدی (زنان در سال ۱۹۹۰) واجد رتبه‌ی ده و یا کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

از نظر شیوع مشکلات سلامتی در سالمندان ساکن استان خراسان جنوبی، این گروه جمعیتی در بیماری‌های قلبی-عروقی (زنان و مردان در سال‌های ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷ و مردان در سال ۱۹۹۰)، دیابت و بیماری‌های کلیوی (مردان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷)، بیماری‌های مزمن تنفسی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، بیماری‌های گوارشی (زنان و مردان در سال ۱۹۹۰ و مردان در سال ۲۰۰۰)، سوانح حمل و نقل (زنان در سال ۲۰۱۷ و مردان در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) و سوانح غیر عمدی (زنان و مردان در سال‌های ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) یکی از ده استان دارای بالاترین شیوع در کل کشور بوده‌اند.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، سکته، عفونت‌های تنفسی تحتانی و افتادن کاهشی و برای بیماری آلزایمر و دیابت نوع دو افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری دیابت نوع دو در زنان و مردان و به علت سکته در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان خراسان جنوبی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر بوده است.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع به علت مشکلات سلامتی در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب و بیماری آلزایمر کاهشی و برای اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی، افتادن و بیماری مزمن انسدادی ریه افزایشی بوده است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع برای هیچ یک از مشکلات سلامتی در زنان یا مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان خراسان جنوبی در سال ۲۰۱۷ نسبت به سایر استان‌های مجاور کمترین یا بیشترین بوده است.




تعداد و میزان^۱ مرگ به تفکیک گروه سنی در سال ۲۰۱۷ در استان

گروه سنی	جنسیت	همه علل		بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای		بیماری‌های غیرواگیر		سوانح و حوادث	
		تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان
همه سنین	هر دو	۳۹۲۹	۴۹۲/۱	۳۲۶	۴۰/۹	۳۱۹۵	۴۰۰/۲	۴۰۸	۵۱/۱
	زنان	۱۷۵۴	۴۴۶/۵	۱۴۹	۳۸/۱	۱۴۹۵	۳۸۰/۷	۱۰۹	۲۷/۸
	مردان	۲۱۷۵	۵۳۶/۳	۱۷۷	۴۳/۶	۱۷۰۰	۴۱۹/۱	۲۹۹	۷۳/۶
کمتر از ۶۰ سال	هر دو	۱۰۱۹	۱۴۱/۵	۱۷۲	۲۳/۹	۵۳۷	۷۴/۶	۳۱۰	۴۳
	زنان	۳۶۷	۱۰۳/۹	۷۵	۲۱/۴	۲۱۹	۶۲	۷۳	۲۰/۶
	مردان	۶۵۳	۱۷۷/۶	۹۷	۲۶/۴	۳۱۹	۸۶/۷	۲۳۷	۶۴/۵
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۲۹۱۰	۳۷۲۱/۵	۱۵۴	۱۹۷/۱	۲۶۵۸	۳۳۹۸/۸	۹۸	۱۲۵/۶
	زنان	۱۳۸۸	۳۴۵۹	۷۴	۱۸۴/۹	۱۲۷۷	۳۱۸۲/۸	۳۷	۹۱/۳
	مردان	۱۵۲۳	۳۹۹۸	۸۰	۲۱۰	۱۳۸۱	۳۶۲۶/۲	۶۲	۱۶۱/۷
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۲۱۹	۹۶۵/۲	۱۰	۴۲/۶	۱۹۱	۸۴۳/۶	۱۸	۷۸/۹
	زنان	۹۷	۸۲۰/۷	۵	۳۸/۲	۸۷	۷۳۱/۵	۶	۵۱/۱
	مردان	۱۲۱	۱۱۲۴/۲	۵	۴۷/۵	۱۰۴	۹۶۷/۱	۱۲	۱۰۹/۶
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۲۱۸	۱۳۲۸/۴	۹	۵۷/۲	۱۹۶	۱۱۸۹/۶	۱۳	۸۱/۶
	زنان	۱۰۴	۱۱۹۳	۵	۵۵/۱	۹۴	۱۰۷۸/۵	۵	۵۹/۴
	مردان	۱۱۴	۱۴۸۱/۶	۵	۵۹/۶	۱۰۱	۱۳۱۵/۳	۸	۱۰۶/۷
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۳۱۱	۲۳۳۱/۵	۱۵	۱۱۲/۷	۲۸۲	۲۱۱۳/۷	۱۴	۱۰۵/۲
	زنان	۱۴۳	۲۰۹۸/۴	۷	۱۰۵/۶	۱۳۰	۱۹۱۸/۸	۵	۷۴
	مردان	۱۶۸	۲۵۷۴/۴	۸	۱۲۰/۱	۱۵۱	۲۳۱۶/۶	۹	۱۳۷/۶
۷۵ تا ۷۹ سال	هر دو	۴۶۶	۴۳۸۴/۶	۲۴	۲۲۹/۷	۴۲۵	۴۰۰۵/۶	۱۶	۱۴۹/۳
	زنان	۲۲۷	۴۴۰۸/۸	۱۲	۲۲۸/۵	۲۰۹	۴۰۶۵/۹	۶	۱۱۴/۳
	مردان	۲۳۹	۴۳۶۱/۹	۱۳	۲۳۰/۸	۲۱۶	۳۹۴۸/۸	۱۰	۱۸۲/۲
۸۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۶۹۷	۱۱۱۸۶/۹	۹۶	۶۳۰/۸	۱۵۶۴	۱۰۳۱۱/۷	۳۷	۲۴۴/۴
	زنان	۸۱۶	۱۰۷۷۷/۵	۴۶	۶۰۵/۸	۷۵۶	۹۹۸۰/۶	۱۴	۱۹۱/۱
	مردان	۸۸۰	۱۱۵۹۵/۴	۵۰	۶۵۵/۸	۸۰۸	۱۰۶۴۲	۲۳	۲۹۷/۶

امید زندگی (سال) در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ در استان

جنسیت	بدو تولد		۶۰ تا ۶۴ سال		۶۵ تا ۶۹ سال		۷۰ تا ۷۴ سال		۷۵ تا ۷۹ سال		۸۰ سال و بالاتر	
	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰
زنان	۶۸/۵	۷۹/۷	۱۶/۴	۲۴/۹	۱۲/۵	۲۰/۷	۹/۷	۱۶/۹	۶/۸	۱۳/۴	۴/۲	۱۰/۷
مردان	۶۴/۶	۷۴/۶	۱۶	۲۲/۷	۱۲	۱۸/۹	۹/۲	۱۵/۴	۶	۱۲	۴/۴	۸/۹

روند زمانی تعداد در مقابل میزان استاندارد شده سنی مرگ در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سطح ملی و استان



^۱ در این گزارش تمامی میزان‌ها در ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت گزارش شده‌اند.




میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

علت ^۲	مردان								زنان							
	۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰		۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰	
	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه ^۳	میزان
بیماری‌های قلبی-عروقی	۲۹	۱۷۱۴/۷	۳۰	۱۶۶۲/۳	۳۰	۱۷۲۴/۸	۳۰	۲۳۹۷/۱	۲۹	۱۶۷۴/۲	۳۰	۱۶۲۷/۸	۳۰	۱۷۰۰/۴	۲۸	۲۲۷۶/۸
سرطان‌ها	۱۹	۶۰۰/۹	۲۵	۵۴۲/۵	۲۶	۴۳۲/۳	۲۰	۵۸۹/۹	۱۵	۴۰۵/۱	۲۷	۳۴۹/۹	۲۷	۲۵۹/۴	۲۳	۳۲۶
اختلالات عصبی	۱۴	۳۳۴/۵	۱۸	۲۵۴/۶	۲۲	۱۹۸/۹	۱۸	۲۵۲/۶	۲۲	۳۵۰/۱	۲۶	۲۹۵/۱	۲۵	۲۰۵	۲۵	۲۴۷/۶
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۲۶	۱۷۵/۸	۲۶	۱۵۴/۷	۲۷	۱۱۶	۲۰	۱۵۵/۳	۲۸	۱۷۱/۱	۲۷	۱۴۵/۳	۲۹	۱۰۹/۹	۲۵	۱۳۱/۲
بیماری‌های مزمن تنفسی	۴	۳۰۴/۸	۵	۳۱۵/۶	۷	۳۳۴/۵	۳	۴۹۰/۲	۵	۲۲۴/۸	۵	۲۲۵/۲	۸	۲۱۵/۸	۷	۲۶۱/۵
بیماری‌های گوارشی	۹	۱۱۵/۲	۱۲	۱۰۷/۴	۱۴	۱۰۳/۷	۱۰	۱۶۳/۴	۸	۱۰۴/۱	۱۲	۹۸	۱۰	۸۷/۷	۷	۱۳۵/۷
سوانح حمل و نقل	۱۵	۹۱/۸	۱۹	۱۰۳/۱	۲۳	۱۰۸/۴	۱۶	۱۴۷	۵	۴۶/۸	۱۰	۴۹	۱۴	۴۶/۷	۱۱	۵۷/۶
سوانح غیرعمدی	۲۱	۵۱/۷	۲۳	۵۲/۶	۲۱	۵۷/۸	۱۹	۷۸/۸	۱۷	۳۵/۴	۲۱	۳۷/۸	۱۲	۴۲/۷	۷	۵۸/۶

میزان استاندارد شده سنی **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

مشکل سلامتی	مردان								زنان							
	۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰		۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰	
	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه ^۴	میزان
بیماری‌های قلبی-عروقی	۴	۳۲۶۵۲/۵	۶	۳۲۵۲۶/۹	۷	۳۲۱۳۲/۵	۸	۳۲۱۴۹/۷	۷	۳۳۲۹۸/۳	۹	۳۲۶۵۰	۹	۳۲۶۴۰/۶	۱۲	۳۲۸۶۰/۷
سرطان‌ها	۳۰	۳۰۲۲/۶	۲۹	۲۴۸۹/۹	۲۹	۱۶۳۰/۸	۲۶	۱۶۳۲/۹	۲۰	۲۱۷۰/۵	۲۵	۱۷۶۰/۶	۲۷	۱۱۴۱/۶	۲۳	۱۱۴۶/۵
اختلالات عصبی	۲۹	۵۲۱۲۲	۲۹	۵۲۱۲۴/۱	۲۶	۵۱۹۷۲/۵	۲۷	۵۱۲۴۶/۳	۳۰	۵۸۱۷۴/۶	۳۰	۵۸۱۷۳/۳	۳۰	۵۷۵۶۰/۷	۳۰	۵۷۲۰۵/۷
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۷	۴۹۲۷۲/۳	۱۲	۴۲۵۱۳/۳	۱۴	۴۰۷۵۸/۸	۹	۴۱۵۳۴/۹	۱۵	۵۷۹۳۹/۹	۱۹	۵۰۵۱۸/۷	۲۲	۴۷۸۲۸/۹	۱۹	۴۸۱۵۳/۶
بیماری‌های مزمن تنفسی	۳	۱۴۵۱۴	۶	۱۴۳۴۵/۳	۶	۱۴۶۴۱/۳	۵	۱۵۸۹۳/۴	۴	۱۷۴۰۳/۲	۷	۱۷۸۹۴/۸	۷	۱۷۳۸۵/۷	۶	۱۷۵۶۶/۲
بیماری‌های گوارشی	۱۴	۶۶۵۸۵/۸	۱۲	۶۳۳۹۹	۵	۶۰۳۰۲/۹	۴	۵۸۳۷۴/۵	۱۳	۵۳۲۶۱/۷	۱۵	۵۱۲۹۷/۹	۱۱	۴۸۰۶۰/۶	۹	۴۶۹۸۱/۷
سوانح حمل و نقل	۲	۹۹۸۵/۹	۱۰	۱۱۵۶۴/۷	۱۶	۱۱۷۱۴	۱۵	۱۲۰۱۷	۴	۶۴۰۹/۱	۱۳	۷۲۵۷/۴	۱۳	۷۰۷۴/۲	۱۳	۷۵۳۶/۱
سوانح غیرعمدی	۴	۳۴۵۴۵/۹	۵	۳۴۵۰۳/۶	۸	۳۰۲۵۴/۵	۲۴	۳۰۷۲۰/۴	۴	۲۴۶۰۴/۴	۴	۲۳۴۳۸/۴	۴	۲۱۸۰۷/۷	۱۷	۲۲۵۹۸/۲

میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی و **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سال ۲۰۱۷ در سطح ملی و استان




^۲ علل براساس میزان استاندارد شده سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ و هر دو جنسیت در سطح ملی مرتب شده‌اند.


^۳ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی مرگ به تفکیک علت، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.

^۴ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی شیوع به تفکیک مشکل سلامتی، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.







جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۳۱۸/۴	۹۹۵/۹	۹۳۰/۳	۹۸۲/۴
زنان	۱۱۸۳/۲	۹۲۰/۶	۸۷۰/۵	۹۳۱/۶
مردان	۱۴۵۲/۳	۱۰۶۵/۴	۹۸۵/۱	۱۰۳۸/۵




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۶۳۹/۸	۴۴۵	۳۹۵/۸	۳۷۷/۸
زنان	۶۶۰/۸	۴۶۷/۴	۳۹۸/۹	۳۸۱/۴
مردان	۶۲۰/۴	۴۲۳	۳۹۰/۷	۳۷۵/۴




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۲۰/۵	۱۷۷	۲۴۲/۹	۳۰۳/۵
زنان	۲۲۵/۳	۱۸۵/۸	۲۶۹/۳	۳۲۰/۳
مردان	۲۱۵/۴	۱۶۷/۹	۲۱۴/۷	۲۸۸/۱



جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۷/۱	۱۸/۹	۳۲/۴	۴۵/۲
زنان	۱۴/۶	۱۸/۱	۳۰/۷	۴۵/۴
مردان	۱۹/۹	۱۹/۸	۳۳/۹	۴۴/۹




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۴۷/۱	۱۱۱/۳	۱۲۸/۹	۱۴۰/۴
زنان	۱۴۷	۱۱۳	۱۲۵/۲	۱۳۶/۱
مردان	۱۴۷/۶	۱۱۰/۲	۱۳۱/۷	۱۴۵/۱




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۹/۳	۱۶/۵	۱۶/۴	۱۶/۱
زنان	۱۳/۳	۱۱/۶	۱۱/۶	۱۱/۱
مردان	۲۵/۱	۲۱	۲۱/۲	۲۱/۴




Ischemic heart disease




Stroke




Alzheimer's disease and other dementias




Diabetes mellitus type 2





Lower respiratory infections





Falls







اختلالات افسردگی				اختلالات اضطرابی				جنسیت
۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	
۶۳۶۹/۶	۶۲۳۰/۱	۶۰۶۱/۱	۶۱۱۹/۴	۶۵۱۴/۳	۶۶۴۲/۵	۶۳۷۶/۵	۶۴۰۴/۹	هر دو
۷۴۰۹/۱	۷۲۹۳	۷۱۳۸/۸	۷۱۸۱/۸	۸۲۰۴/۷	۸۳۹۳/۷	۸۲۵۲/۸	۸۲۷۱/۴	زنان
۵۲۵۷/۳	۵۱۳۱/۹	۵۱۱۴/۴	۵۱۹۳/۹	۴۷۱۷/۷	۴۸۴۴	۴۷۲۳	۴۷۵۲/۷	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۹۷۴۹/۳	۱۰۴۲۱/۹	۱۰۲۷۰/۱	۹۹۳۹/۴	هر دو
۹۵۵۹/۵	۱۰۱۹۹/۶	۱۰۰۰۹/۵	۹۶۸۴	زنان
۹۹۵۰/۹	۱۰۶۴۸/۵	۱۰۵۰۶/۹	۱۰۱۷۲/۸	مردان



۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۴۸۰	۸۴۱۸/۳	۷۱۷۸/۱	۷۸۸۸/۵	هر دو
۷۲۷۷/۲	۶۵۶۲/۴	۵۶۷۳/۷	۶۱۶۲/۳	زنان
۹۷۴۹	۱۰۳۰۴/۳	۸۵۱۵/۴	۹۴۵۰/۲	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۹۱۹۸/۲	۸۵۳۴/۴	۷۷۹۱/۶	۷۶۱۳/۷	هر دو
۱۰۰۶۴/۴	۹۷۴۷/۵	۸۸۷۰/۶	۸۴۸۷/۷	زنان
۸۲۸۹/۷	۷۳۱۹/۶	۶۸۴۱/۶	۶۸۲۶/۵	مردان




۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۶۴۸۰	۵۷۴۹/۷	۵۶۸۰/۴	۶۳۸۳/۸	هر دو
۷۱۳۱/۱	۶۳۰۱	۶۳۴۳/۶	۷۲۶۸/۶	زنان
۵۸۰۳/۵	۵۱۹۰/۴	۵۰۷۹/۳	۵۵۵۷/۸	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۵۳۰۹/۱	۵۳۷۳/۵	۵۵۴۳/۸	۵۶۱۸	هر دو
۵۵۶۴/۸	۵۶۲۸/۷	۵۸۰۱/۳	۵۸۳۹/۸	زنان
۵۰۴۹/۹	۵۱۲۳/۸	۵۲۹۹/۴	۵۳۸۵/۷	مردان




وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
آدریس وزارت بهداشت


Mental disorders
Female Male




Ischemic heart disease
Female Male




Falls
Female Male




Chronic obstructive pulmonary disease
Female Male



Stroke
Female Male



Alzheimer's disease and other dementias
Female Male



سیمای سلامت سالمندان

استان خراسان رضوی

میزان مرگ و شیوع بیماری ها



سیمای سلامت سالمندان

استان خراسان رضوی

(میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها در کل جمعیت، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (کمتر از ۶۰ سال) ساکن در استان خراسان رضوی و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس و گروه‌های سنی بیان شده است. به منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی حاوی: اطلاعات مقایسه‌ای با شاخص کل کشور و مقایسه با استان‌های مجاور استان خراسان رضوی شامل: استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سمنان نیز تدوین و ترسیم شده است.

آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر این مطلب است که شایع‌ترین علل مرگ در سالمندان ساکن استان خراسان رضوی (هر دو جنس) و براساس میزان در سال ۲۰۱۷، به ترتیب بیماری‌های غیرواگیر، بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای و سوانح و حوادث است. این شاخص در افراد غیر سالمند ساکن استان خراسان رضوی به ترتیب، بیماری‌های غیرواگیر، سوانح و حوادث و بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای است و دارای الگویی متفاوت با سالمندان است.

روند زمانی تعداد مرگ به علت هر سه دسته اصلی بیماری‌ها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ در حال افزایش است. سالمندان ساکن در استان خراسان رضوی و در سال ۲۰۱۷ از لحاظ میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت هر سه دسته‌ی اصلی بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای، بیماری‌های غیرواگیر و سوانح و حوادث از میانگین کشوری بالاتر هستند.

سالمندان ساکن استان خراسان رضوی، از بین علل مختلف مرگ در بیماری‌های قلبی-عروقی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰)، سرطان‌ها (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، اختلالات عصبی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، دیابت و بیماری‌های کلیوی (مردان در سال ۲۰۱۰)، بیماری‌های مزمن تنفسی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، بیماری‌های گوارشی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) و سوانح غیرعمدی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) واجد رتبه‌ی ده و کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

از نظر شیوع مشکلات سلامتی در سالمندان ساکن استان خراسان رضوی، این گروه جمعیتی در بیماری‌های قلبی-عروقی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ و مردان در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، سرطان‌ها (زنان و مردان در سال ۲۰۰۰ و زنان در سال ۱۹۹۰)، دیابت و بیماری‌های کلیوی (مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، بیماری‌های مزمن تنفسی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، بیماری‌های گوارشی (زنان در سال ۲۰۱۷ و مردان در سال ۲۰۱۰)، سوانح حمل و نقل (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) و سوانح غیرعمدی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰) واجد رتبه‌ی ده و کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، سکته، عفونت‌های تنفسی تحتانی و افتادن کاهشی و برای بیماری آلزایمر و دیابت نوع دو افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت عفونت‌های تنفسی تحتانی در مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان خراسان رضوی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ بیشتر بوده است.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، افتادن، سکته و بیماری آلزایمر کاهشی و برای اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی و بیماری مزمن انسدادی ریه افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع برای مشکلات سلامتی بیماری آلزایمر در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان خراسان رضوی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر و برای بیماری مزمن انسدادی ریه بیشتر بوده است. بیماری آلزایمر و بیماری مزمن انسدادی ریه در مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان خراسان رضوی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ بیشتر بوده است.




تعداد و میزان^۱ مرگ به تفکیک گروه سنی در سال ۲۰۱۷ در استان

گروه سنی	جنسیت	همه علل		بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای		بیماری‌های غیرواگیر		سوانح و حوادث	
		تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان
همه سنین	هر دو	۳۰۸۵۷	۴۶۶/۲	۲۴۰۸	۳۶/۴	۲۴۹۶۸	۳۷۷/۲	۳۴۸۲	۵۲/۶
	زنان	۱۳۶۰۸	۴۱۵/۲	۱۰۸۸	۳۳/۲	۱۱۵۷۰	۳۵۳	۹۵۰	۲۹
	مردان	۱۷۲۴۸	۵۱۶/۳	۱۳۲۰	۳۹/۵	۱۳۳۹۷	۴۰۱	۲۵۳۱	۷۵/۸
کمتر از ۶۰ سال	هر دو	۹۵۴۱	۱۵۷/۹	۱۴۱۶	۲۳/۴	۵۵۱۴	۹۱/۲	۲۶۱۱	۴۳/۲
	زنان	۳۵۱۵	۱۱۷/۹	۶۲۸	۲۱/۱	۲۲۳۱	۷۴/۸	۶۵۶	۲۲
	مردان	۶۰۲۶	۱۹۶/۸	۷۸۸	۲۵/۷	۳۲۸۴	۱۰۷/۳	۱۹۵۵	۶۳/۸
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۲۱۳۱۶	۳۷۰۸/۴	۹۹۲	۱۷۲/۵	۱۹۴۵۳	۳۳۸۴/۴	۸۷۱	۱۵۱/۵
	زنان	۱۰۰۹۳	۳۴۱۱/۵	۴۵۹	۱۵۵/۳	۹۳۴۰	۳۱۵۶/۸	۲۹۴	۹۹/۴
	مردان	۱۱۲۲۲	۴۰۲۳/۴	۵۳۲	۱۹۰/۸	۱۰۱۱۳	۳۶۲۵/۸	۵۷۷	۲۰۶/۷
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۲۲۰۶	۱۱۵۷/۴	۸۵	۴۴/۶	۱۹۴۳	۱۰۱۹/۳	۱۷۸	۹۳/۶
	زنان	۹۳۰	۹۴۳/۳	۳۶	۳۶/۶	۸۴۱	۸۵۳/۱	۵۳	۵۳/۶
	مردان	۱۲۷۶	۱۳۸۶/۸	۴۹	۵۳/۱	۱۱۰۲	۱۱۹۷/۳	۱۲۵	۱۳۶/۴
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۱۹۷۹	۱۵۳۴/۶	۷۸	۶۰/۱	۱۷۷۶	۱۳۷۷/۳	۱۲۵	۹۷/۲
	زنان	۹۲۷	۱۳۵۳	۳۸	۵۵/۷	۸۴۶	۱۲۳۵/۳	۴۲	۶۱/۹
	مردان	۱۰۵۲	۱۷۴۰/۵	۳۹	۶۵/۱	۹۳۰	۱۵۳۸/۲	۸۳	۱۳۷/۲
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۲۸۶۸	۲۹۸۵	۱۲۱	۱۲۵/۷	۲۶۰۱	۲۷۰۷/۴	۱۴۶	۱۵۱/۹
	زنان	۱۳۳۱	۲۶۷۶/۳	۵۵	۱۱۰/۳	۱۲۲۸	۲۴۶۹/۹	۴۸	۹۶/۱
	مردان	۱۵۳۷	۳۳۱۶/۲	۶۶	۱۴۲/۲	۱۳۷۳	۲۹۶۲/۳	۹۸	۲۱۱/۸
۷۵ تا ۷۹ سال	هر دو	۳۴۴۱	۴۸۸۹/۲	۱۵۱	۲۱۵/۲	۳۱۵۷	۴۴۸۵	۱۳۳	۱۸۸/۹
	زنان	۱۶۲۴	۴۶۳۲/۴	۷۰	۱۹۹/۲	۱۵۱۰	۴۳۰۶	۴۵	۱۲۷/۲
	مردان	۱۸۱۷	۵۱۴۴/۱	۸۲	۲۳۱	۱۶۴۷	۴۶۶۲/۸	۸۸	۲۵۰/۳
۸۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۰۸۲۱	۱۲۱۹۲/۱	۵۵۷	۶۲۷/۴	۹۹۷۶	۱۱۲۴۰/۱	۲۸۸	۳۲۴/۶
	زنان	۵۲۸۱	۱۲۰۱۳	۲۶۰	۵۹۲/۴	۴۹۱۴	۱۱۱۷۸/۴	۱۰۶	۲۴۲/۲
	مردان	۵۵۴۰	۱۲۳۶۷/۹	۲۹۶	۶۶۱/۹	۵۰۶۲	۱۱۳۰۰/۶	۱۸۲	۴۰۵/۵

امید زندگی (سال) در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ در استان

جنسیت	بدو تولد		۶۰ تا ۶۴ سال		۶۵ تا ۶۹ سال		۷۰ تا ۷۴ سال		۷۵ تا ۷۹ سال		۸۰ سال و بالاتر	
	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰
زنان	۶۱/۱	۸۲/۹	۱۲/۸	۲۶	۹/۵	۲۱/۸	۷	۱۷/۹	۴/۵	۱۴/۴	۳/۳	۱۱/۵
مردان	۶۱/۱	۷۵/۶	۱۳/۸	۲۲/۳	۱۰/۳	۱۸/۹	۷/۷	۱۵/۷	۵	۱۳	۳/۶	۱۰/۵

روند زمانی تعداد در مقابل میزان استاندارد شده سنی مرگ در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سطح ملی و استان



^۱ در این گزارش تمامی میزان‌ها در ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت گزارش شده‌اند.




میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

علت ^۲	زنان								مردان							
	۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷		۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷	
	میزان	رتبه ^۳	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه
بیماری‌های قلبی-عروقی	۳۸۲۲/۸	۲	۳۰۳۹	۳	۲۱۰۰/۷	۱۵	۲۰۴۵/۱	۱۵	۳۸۰۷/۲	۴	۳۱۶۴/۳	۲	۲۳۱۹/۶	۱۱	۲۱۲۱/۸	۱۶
سرطان‌ها	۵۰۸/۳	۳	۴۱۸/۱	۴	۴۳۹/۷	۷	۴۷۸/۵	۸	۸۴۶/۲	۳	۶۹۱/۷	۳	۷۲۹/۴	۵	۷۳۴/۹	۱۰
اختلالات عصبی	۴۰۰/۴	۳	۳۴۷/۲	۴	۳۷۲/۲	۸	۴۴۳/۶	۷	۳۷۶/۷	۲	۳۲۹/۹	۲	۳۴۶/۷	۳	۳۸۲/۶	۷
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۱۸۹/۶	۱۵	۱۶۷	۱۷	۱۹۷/۸	۱۶	۲۲۰/۲	۲۱	۱۹۵/۷	۱۲	۱۷۶	۱۲	۲۱۹/۹	۱۰	۲۲۷/۳	۱۷
بیماری‌های مزمن تنفسی	۳۱۰/۸	۴	۲۷۱/۷	۴	۲۴۴/۴	۴	۲۴۵/۴	۳	۴۴۹/۷	۶	۳۴۸/۸	۵	۳۳۶/۴	۳	۳۰۲/۱	۵
بیماری‌های گوارشی	۱۳۰/۱	۹	۹۱/۴	۶	۹۹/۳	۹	۱۰۵	۷	۱۷۰/۴	۸	۱۲۰/۸	۸	۱۱۹/۶	۵	۱۱۳	۱۳
سوانح حمل و نقل	۹۶/۴	۱	۸۶/۳	۱	۶۰/۷	۲	۵۳/۹	۳	۳۰۰/۹	۱	۲۷۳/۹	۱	۱۴۹/۱	۱	۱۳۱/۹	۱
سوانح غیرعمدی	۷۹/۴	۳	۶۵/۵	۱	۵۲/۷	۲	۴۵/۷	۵	۱۱۸/۳	۳	۱۰۰/۷	۱	۷۵/۱	۲	۶۶/۱	۵

میزان استاندارد شده سنی **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

مشکل سلامتی	زنان								مردان							
	۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷		۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷	
	میزان	رتبه ^۴	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه
بیماری‌های قلبی-عروقی	۳۳۳۶۵/۴	۹	۳۲۶۱۱/۸	۱۰	۳۲۲۰/۱۲	۱۳	۳۲۴۶۷	۱۴	۳۲۲۹۹/۴	۶	۳۲۳۱۸	۵	۳۲۳۵۶/۷	۷	۳۱۶۰۹/۹	۹
سرطان‌ها	۱۴۲۵	۵	۱۴۵۷/۳	۹	۲۰۰۳/۹	۱۶	۲۲۹۶/۵	۱۶	۲۰۵۳/۹	۱۱	۲۲۱۹/۲	۱۰	۲۹۲۵/۸	۱۶	۳۳۱۴	۲۴
اختلالات عصبی	۵۷۲۲۱/۱	۲۹	۵۷۵۶۵/۷	۲۸	۵۸۱۸۰/۱	۲۹	۵۸۱۹۳/۴	۲۹	۵۱۲۶۳/۴	۲۳	۵۱۹۸۴/۵	۲۰	۵۲۱۲۹/۸	۲۴	۵۲۱۲۷/۴	۲۲
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۴۹۴۳۷/۴	۱۱	۴۸۸۸۲/۵	۱۵	۵۱۱۳۲/۷	۱۷	۵۸۰۹۲/۳	۱۴	۴۵۲۸۵	۲	۴۴۸۸۵	۳	۴۶۸۴۸/۲	۳	۵۲۲۵۴/۵	۳
بیماری‌های مزمن تنفسی	۱۸۲۴۳	۵	۱۸۵۰۸/۲	۴	۱۸۷۵۳/۲	۳	۱۷۴۹۸/۳	۲	۱۵۳۶۶/۸	۷	۱۴۷۹۳/۲	۵	۱۴۷۴۱/۶	۴	۱۴۳۱۲/۳	۴
بیماری‌های گوارشی	۴۶۶۹۰/۶	۱۳	۴۷۹۲۲/۲	۱۲	۵۱۴۳۷/۸	۱۱	۵۳۳۷۱/۵	۸	۵۷۷۶۰/۵	۱۵	۵۹۹۸۲/۷	۱۲	۶۳۵۵۲	۷	۶۶۶۱۷/۴	۱۳
سوانح حمل و نقل	۸۴۸۴	۲	۷۹۴۱/۷	۳	۷۵۷۷/۶	۴	۶۲۸۸/۴	۱۰	۱۳۲۶۸/۱	۳	۱۳۴۵۲/۹	۳	۱۲۳۳۷/۴	۳	۹۸۴۳/۶	۵
سوانح غیرعمدی	۲۴۳۹۷/۷	۵	۲۱۴۴۵/۸	۶	۲۱۹۰۶/۳	۱۰	۲۱۶۵۹/۸	۲۳	۳۵۰۹۸/۱	۷	۳۲۱۹۳/۸	۶	۳۳۳۲۱/۶	۸	۲۹۲۰۱/۵	۲۰

میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی و **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سال ۲۰۱۷ در سطح ملی و استان




^۲ علل براساس میزان استاندارد شده سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ و هر دو جنسیت در سطح ملی مرتب شده‌اند.


^۳ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی مرگ به تفکیک علت، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.

^۴ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی شیوع به تفکیک مشکل سلامتی، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.







جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۴۸۴/۵	۲۰۵۴/۲	۱۱۳۳/۴	۱۱۱۲/۸
زنان	۲۴۴۳	۱۹۸۵/۱	۱۰۲۰/۷	۱۰۴۶/۳
مردان	۲۵۱۸/۵	۲۱۱۳/۷	۱۲۵۰/۹	۱۱۸۵




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۰۶۰/۲	۸۲۷	۵۴۲/۸	۴۹۴
زنان	۱۰۸۰/۳	۸۱۷/۵	۵۳۲/۹	۴۹۶/۸
مردان	۱۰۴۷/۸	۸۴۰/۹	۵۵۴/۵	۴۹۲/۶




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۳۴۹	۳۰۱/۱	۳۱۸	۳۶۹/۵
زنان	۳۶۸/۲	۳۱۸/۴	۳۴۱/۳	۴۰۹/۸
مردان	۳۲۵	۲۸۱/۳	۲۹۶/۵	۳۳۰/۱



جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۳۲/۲	۳۳/۴	۵۲	۷۵/۲
زنان	۳۲/۴	۳۳/۷	۵۳/۶	۸۰/۶
مردان	۳۲/۹	۳۳/۳	۵۰/۴	۶۹/۶




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۷۰/۴	۱۴۰/۵	۱۵۸	۱۵۱/۶
زنان	۱۶۲/۵	۱۳۰/۷	۱۴۰/۳	۱۴۰/۳
مردان	۱۸۰/۷	۱۵۰/۶	۱۷۶/۱	۱۶۳/۲




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۳۵/۲	۳۳/۳	۲۸/۱	۲۴/۸
زنان	۲۴/۸	۲۳/۲	۲۲/۸	۱۹/۸
مردان	۴۶	۴۲/۸	۳۳/۵	۳۰




Ischemic heart disease




Stroke




Alzheimer's disease and other dementias




Diabetes mellitus type 2





Lower respiratory infections





Falls







اختلالات افسردگی				اختلالات اضطرابی				جنسیت
۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	
۶۳۶۷/۹	۶۲۳۹/۳	۶۰۶۲/۶	۶۱۲۴/۴	۶۵۱۵/۳	۶۶۶۲/۷	۶۳۸۳/۸	۶۴۲۲/۶	هر دو
۷۴۰۷/۶	۷۲۹۰/۲	۷۱۳۸/۵	۷۱۶۸/۳	۸۲۰۴/۷	۸۳۹۳/۷	۸۲۵۲/۸	۸۲۷۱/۴	زنان
۵۲۵۶/۵	۵۱۲۶/۳	۵۱۰۸/۱	۵۱۹۵/۹	۴۷۱۷/۷	۴۸۴۴	۴۷۲۳	۴۷۵۲/۷	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۱۰۹۱۵/۴	۱۱۷۹۸/۶	۱۲۱۰۴/۶	۱۲۰۶۲/۳	هر دو
۱۰۶۳۰/۴	۱۱۳۹۹	۱۱۶۴۶/۶	۱۱۶۴۵/۳	زنان
۱۱۲۱۵/۴	۱۲۲۰۵	۱۲۵۱۴/۹	۱۲۴۴۶/۸	مردان



۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۷۱۱	۹۷۶۶/۶	۸۹۸۶	۹۷۸۷/۷	هر دو
۷۴۷۸/۵	۷۵۱۸/۱	۶۸۴۵/۴	۷۵۲۷/۱	زنان
۱۰۰۱۸/۴	۱۲۱۰۴/۶	۱۰۸۹۸/۶	۱۱۸۶۸/۱	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۹۷۰۷/۴	۹۶۰۴/۱	۸۶۴۲/۸	۸۱۹۸/۵	هر دو
۱۰۶۷۷	۱۱۰۳۵/۶	۱۰۰۵۰/۱	۹۳۴۶/۴	زنان
۸۶۸۷/۸	۸۱۵۸/۸	۷۴۱۱/۷	۷۱۴۶/۱	مردان




۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۶۸۳۶/۷	۶۷۶۲/۷	۶۹۱۹/۱	۷۵۹۷/۱	هر دو
۷۴۹۹	۶۹۹۳/۵	۷۳۹۳/۲	۸۶۹۶/۷	زنان
۶۱۴۸/۸	۶۵۰۹/۶	۶۵۰۱/۴	۶۵۵۸	مردان


۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۵۳۰۶/۴	۵۳۶۵/۱	۵۵۰۸/۷	۵۵۹۰/۳	هر دو
۵۵۵۰/۷	۵۶۲۶/۱	۵۷۴۹/۵	۵۸۰۵/۱	زنان
۵۰۵۷/۵	۵۱۰۸/۵	۵۲۸۴/۸	۵۳۵۶/۸	مردان




Mental disorders
Female Male




Ischemic heart disease
Female Male




Falls
Female Male




Chronic obstructive pulmonary disease
Female Male



Stroke
Female Male



Alzheimer's disease and other dementias
Female Male



سیمای سلامت سالمندان

استان خراسان شمالی

میزان مرگ و شیوع بیماری ها



سیمای سلامت سالمندان

استان خراسان شمالی

(میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها در کل جمعیت، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (کمتر از ۶۰ سال) ساکن در استان خراسان شمالی و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس و گروه‌های سنی بیان شده است. به منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی حاوی: اطلاعات مقایسه‌ای با شاخص کل کشور و مقایسه با استان‌های مجاور استان خراسان شمالی شامل: استان‌های گلستان، خراسان رضوی و سمنان نیز تدوین و ترسیم شده است.

آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر این مطلب است که شایع‌ترین علل مرگ در سالمندان ساکن استان خراسان شمالی (هر دو جنس) براساس میزان در سال ۲۰۱۷، به ترتیب بیماری‌های غیرواگیر، بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای و سوانح و حوادث است. این شاخص در افراد غیر سالمند ساکن استان خراسان شمالی به ترتیب بیماری‌های غیرواگیر، سوانح و حوادث و بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای است و دارای الگویی متفاوت با سالمندان است.

روند زمانی تعداد مرگ به علت هر سه دسته اصلی بیماری‌ها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ در حال افزایش است. سالمندان ساکن در استان خراسان شمالی و در سال ۲۰۱۷ از لحاظ میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت هر دسته بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای، بیماری‌های غیرواگیر و سوانح و حوادث از میانگین کشوری بالاتر هستند.

سالمندان ساکن استان خراسان شمالی، از بین علل مختلف مرگ در بیماری‌های قلبی-عروقی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷ و زنان در سال ۲۰۰۰)، سرطان‌ها (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، اختلالات عصبی (زنان و مردان در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، بیماری‌های مزمن تنفسی (زنان و مردان در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷ و زنان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰)، بیماری‌های گوارشی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷ و نیز زنان در سال ۲۰۰۰)، سوانح حمل و نقل (زنان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ و زنان و مردان در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) و سوانح غیر عمدی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) واجد رتبه‌ی ده و یا کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

از نظر شیوع مشکلات سلامتی در سالمندان ساکن استان خراسان شمالی، این گروه جمعیتی در بیماری‌های قلبی-عروقی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، سرطان‌ها (زنان در سال ۲۰۱۷)، دیابت و بیماری‌های کلیوی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ و مردان در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰)، بیماری‌های مزمن تنفسی (زنان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷ و مردان در سال ۲۰۱۷)، مشکلات گوارشی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، سوانح حمل و نقل (زنان و مردان در سال ۲۰۱۷) یکی از ده استان دارای بالاترین شیوع در کل کشور بوده‌اند.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، سکته، عفونت‌های تنفسی تحتانی و افتادن کاهشی و برای بیماری آلزایمر و دیابت نوع دو افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری آلزایمر و افتادن در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان خراسان شمالی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ بیشتر و به علت دیابت نوع دو کمتر بوده است. در زنان سالمند استان خراسان شمالی میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت عفونت‌های تنفسی تحتانی نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ بیشتر بوده است.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع به علت مشکلات سلامتی در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، افتادن و بیماری آلزایمر کاهشی و برای اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی، بیماری مزمن انسدادی ریه و سکته افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع برای افتادن و بیماری ایسکمیک قلب در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان خراسان شمالی در سال ۲۰۱۷ نسبت به تمام استان‌های مجاور بیشتر بوده است.




تعداد و میزان^۱ مرگ به تفکیک گروه سنی در سال ۲۰۱۷ در استان

گروه سنی	جنسیت	همه علل		بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای		بیماری‌های غیرواگیر		سوانح و حوادث	
		تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان
همه سنین	هر دو	۴۶۳۷	۵۲۹/۷	۳۳۷	۳۸/۵	۳۷۶۱	۴۲۹/۷	۵۳۸	۶۱/۵
	زنان	۲۰۳۹	۴۶۸/۸	۱۵۱	۳۴/۷	۱۷۳۲	۳۹۸/۳	۱۵۶	۳۵/۸
	مردان	۲۵۹۸	۵۸۹/۸	۱۸۷	۴۲/۳	۲۰۲۹	۴۶۰/۷	۳۸۲	۸۶/۸
کمتر از ۶۰ سال	هر دو	۱۴۵۶	۱۸۲/۴	۲۰۴	۲۵/۵	۸۳۰	۱۰۴	۴۲۲	۵۲/۹
	زنان	۵۵۷	۱۴۰/۹	۸۹	۲۲/۵	۳۵۵	۹۰	۱۱۲	۲۸/۴
	مردان	۸۹۹	۲۲۳/۱	۱۱۵	۲۸/۵	۴۷۵	۱۱۷/۸	۳۱۰	۷۶/۹
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۳۱۸۱	۴۱۲۲/۲	۱۳۳	۱۷۲/۹	۲۹۳۱	۳۷۹۹	۱۱۶	۱۵۰/۴
	زنان	۱۴۸۲	۳۷۳۰/۵	۶۲	۱۵۵/۱	۱۳۷۷	۳۴۶۵/۴	۴۴	۱۱۰/۱
	مردان	۱۶۹۸	۴۵۳۸	۷۲	۱۹۱/۸	۱۵۵۴	۴۱۵۳	۷۲	۱۹۳/۱
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۳۶۴	۱۳۶۶/۵	۱۳	۴۹/۹	۳۲۳	۱۲۱۴/۳	۲۷	۱۰۲/۴
	زنان	۱۶۴	۱۱۶۶/۶	۶	۴۳/۹	۱۴۸	۱۰۵۷/۲	۹	۶۵/۶
	مردان	۲۰۰	۱۵۸۹/۵	۷	۵۶/۵	۱۷۵	۱۳۸۹/۶	۱۸	۱۴۳/۴
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۳۴۸	۱۹۲۷/۲	۱۳	۷۰	۳۱۶	۱۷۴۹/۹	۱۹	۱۰۷/۳
	زنان	۱۸۱	۱۸۲۱/۲	۷	۶۶/۴	۱۶۷	۱۶۷۵/۸	۸	۷۹
	مردان	۱۶۷	۲۰۵۶/۷	۶	۷۴/۳	۱۵۰	۱۸۴۰/۴	۱۲	۱۴۲
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۴۶۴	۳۶۱۲/۷	۱۸	۱۳۹	۴۲۸	۳۳۲۶/۶	۱۹	۱۴۷/۱
	زنان	۲۲۱	۳۳۵۹/۳	۸	۱۲۸	۲۰۵	۳۱۲۰/۹	۷	۱۱۰/۴
	مردان	۲۴۳	۳۸۷۸/۴	۹	۱۵۰/۵	۲۲۲	۳۵۴۲/۳	۱۲	۱۸۵/۶
۷۵ تا ۷۹ سال	هر دو	۵۶۰	۶۱۷۲/۱	۲۳	۲۴۹/۵	۵۱۹	۵۷۲۹/۷	۱۷	۱۹۲/۹
	زنان	۲۵۹	۵۸۸۲/۹	۱۰	۲۳۰/۸	۲۴۳	۵۵۰۲/۹	۷	۱۴۹/۲
	مردان	۳۰۰	۶۴۴۶	۱۲	۲۶۷/۳	۲۷۷	۵۹۴۴/۵	۱۱	۲۳۴/۲
۸۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۴۴۴	۱۳۶۹۹/۶	۶۷	۶۳۵/۲	۱۳۴۵	۱۲۷۵۱/۸	۳۳	۳۱۲/۶
	زنان	۶۵۷	۱۳۷۹۰/۸	۳۰	۶۳۴/۷	۶۱۴	۱۲۸۸۶/۶	۱۳	۲۶۹/۴
	مردان	۷۸۸	۱۳۶۲۴/۵	۳۷	۶۳۵/۷	۷۳۱	۱۲۶۴۰/۷	۲۰	۳۴۸/۲

امید زندگی (سال) در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ در استان

جنسیت	بدو تولد		۶۰ تا ۶۴ سال		۶۵ تا ۶۹ سال		۷۰ تا ۷۴ سال		۷۵ تا ۷۹ سال		۸۰ سال و بالاتر	
	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰
زنان	۶۴/۶	۸۰/۱	۱۳/۶	۲۴/۲	۲۰/۲	۱۰	۱۶/۵	۴/۷	۱۳/۳	۳/۵	۱۱	۳/۵
مردان	۶۱/۴	۷۵	۱۳/۶	۲۲/۲	۱۰/۱	۱۸/۶	۷/۳	۱۵/۲	۴/۴	۱۲/۲	۹/۹	۴/۴

روند زمانی تعداد در مقابل میزان استاندارد شده سنی مرگ در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سطح ملی و استان



^۱ در این گزارش تمامی میزان‌ها در ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت گزارش شده‌اند.




میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

علت ^۲	مردان								زنان							
	۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰		۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰	
	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان
بیماری‌های قلبی-عروقی	۲	۲۴۸۸/۲	۹	۲۳۳۴/۷	۱۷	۲۴۱۸/۸	۱۰	۳۲۳۸/۳	۲	۲۶۶۷/۵	۶	۲۳۳۷/۹	۷	۲۷۱۲	۴	۳۶۷۷/۷
سرطان‌ها	۳	۸۶۷/۶	۳	۷۵۵	۸	۵۸۵	۵	۷۸۰/۵	۳	۵۲۱/۸	۶	۴۵۲/۵	۶	۳۶۵	۶	۴۷۷/۹
اختلالات عصبی	۴	۴۱۷/۳	۷	۳۰۲	۱۵	۲۲۲	۱۲	۲۸۲/۷	۲	۴۷۶/۱	۶	۴۰۸	۱۱	۲۸۱/۹	۱۱	۳۳۷
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۲۰	۲۰۹/۷	۲۰	۱۷۹/۵	۱۸	۱۴۹/۷	۱۶	۱۸۷/۱	۲۰	۲۲۶/۱	۲۳	۱۷۲/۱	۱۸	۱۶۴/۳	۱۳	۲۰۲
بیماری‌های مزمن تنفسی	۷	۲۶۶/۱	۱۰	۲۴۹/۳	۱۴	۲۴۱/۱	۱۱	۳۴۵	۶	۲۲۳/۹	۷	۲۰۵/۹	۹	۱۹۹/۶	۹	۲۴۵
بیماری‌های گوارشی	۴	۱۳۵/۹	۴	۱۲۳	۱۲	۱۱۰/۶	۹	۱۶۹/۳	۶	۱۱۰/۵	۵	۱۱۰/۲	۷	۹۰/۵	۶	۱۳۶/۲
سوانح حمل و نقل	۶	۱۱۰/۲	۶	۱۲۶/۴	۱۴	۱۳۴/۷	۱۱	۱۷۳/۱	۱	۵۷/۶	۵	۵۴/۴	۶	۵۷/۹	۳	۷۱/۹
سوانح غیرعمدی	۳	۷۱/۸	۳	۷۰/۱	۴	۷۲/۷	۴	۹۵/۲	۲	۵۴/۸	۱	۵۴/۲	۳	۵۸/۷	۴	۷۶/۷

میزان استاندارد شده سنی **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

مشکل سلامتی	مردان								زنان							
	۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰		۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰	
	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان
بیماری‌های قلبی-عروقی	۳	۳۳۶۳۰/۳	۲	۳۲۵۳۰/۶	۳	۳۲۹۴۸/۵	۲	۳۳۱۲۴/۲	۳	۳۴۴۶۷/۲	۴	۳۳۳۳۹/۶	۴	۳۳۴۸۹/۱	۲	۳۴۲۴۰/۷
سرطان‌ها	۱۲	۳۶۶۰/۶	۱۸	۲۸۹۶/۶	۲۲	۱۸۸۷/۵	۱۷	۱۸۵۸/۴	۸	۲۴۲۵/۹	۱۷	۱۹۹۶/۹	۱۶	۱۳۱۱/۶	۱۱	۱۳۴۴/۳
اختلالات عصبی	۲۱	۵۲۱۳۰/۸	۳۰	۵۲۱۲۲	۲۳	۵۱۹۸۰/۴	۱۶	۵۱۲۷۵/۵	۱۹	۵۸۲۱۳/۱	۲۷	۵۸۱۹۵/۸	۲۶	۵۷۵۷۴/۹	۱۵	۵۷۲۵۲/۸
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۵	۴۹۷۹۴/۹	۱۰	۴۳۴۷۲/۲	۱۰	۴۱۸۵۹	۶	۴۲۴۰۷/۷	۵	۵۹۳۷۷/۲	۱۴	۵۱۶۲۷/۹	۱۳	۴۹۵۴۲/۵	۷	۵۰۱۴۱/۷
بیماری‌های مزمن تنفسی	۷	۱۳۶۸۴/۳	۱۲	۱۳۱۶۴/۹	۱۳	۱۳۱۸۵/۸	۱۶	۱۴۲۱۸	۶	۱۷۲۹۶/۸	۸	۱۷۳۹۸/۵	۹	۱۷۰۴۲/۳	۹	۱۷۲۷۴/۲
بیماری‌های گوارشی	۱۰	۶۶۶۹۶/۲	۹	۶۳۵۰۰/۳	۶	۶۰۲۸۳/۶	۳	۵۸۴۱۳/۵	۱۰	۵۳۳۶۹/۹	۱۰	۵۱۴۹۵/۱	۸	۴۸۲۳۲/۴	۶	۴۷۲۱۷/۷
سوانح حمل و نقل	۸	۹۷۱۹/۵	۱۵	۱۱۴۹۲/۷	۱۵	۱۱۷۲۷	۱۹	۱۱۸۷۹	۸	۶۳۰۱/۴	۲۳	۶۸۸۰/۲	۱۶	۶۹۱۶/۴	۱۴	۷۴۷۴/۳
سوانح غیرعمدی	۱۱	۳۰۵۳۲/۴	۱۶	۳۱۸۱۴/۶	۱۶	۲۹۲۰۶/۹	۱۶	۳۲۶۲۹	۲۰	۲۱۷۶۰/۲	۲۳	۲۰۵۷۵/۵	۲۱	۱۹۳۴۵/۶	۲۰	۲۲۳۶۴/۹

میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی و **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سال ۲۰۱۷ در سطح ملی و استان




^۲ علل براساس میزان استاندارد شده سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ و هر دو جنسیت در سطح ملی مرتب شده‌اند.


^۳ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی مرگ به تفکیک علت، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.

^۴ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی شیوع به تفکیک مشکل سلامتی، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.







جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۹۰۸	۱۴۳۸/۱	۱۲۶۰/۷	۱۴۵۴/۶
زنان	۱۹۱۳/۷	۱۴۵۰/۸	۱۲۱۲/۹	۱۴۸۴/۱
مردان	۱۸۶۳/۶	۱۴۰۸/۶	۱۳۱۶	۱۴۳۴/۹




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۹۹۰/۲	۶۸۴/۶	۵۴۳/۳	۵۷۱/۷
زنان	۱۰۸۸/۲	۷۵۵/۶	۵۵۵/۲	۶۱۰/۹
مردان	۸۶۹/۷	۶۱۵/۲	۵۳۷/۶	۵۳۶/۹




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۷۷/۸	۲۲۰/۸	۳۰۸/۸	۳۹۲/۱
زنان	۳۰۴/۴	۲۵۴/۲	۳۷۲/۴	۴۳۴/۱
مردان	۲۳۹	۱۸۵	۲۵۲/۶	۳۵۵/۴



جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۹/۸	۲۱/۹	۳۲/۴	۴۹/۵
زنان	۲۰/۷	۲۴/۴	۳۲/۸	۵۶/۵
مردان	۱۸/۹	۱۹/۸	۳۲/۲	۴۲/۶




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۶۹/۱	۱۲۶/۷	۱۳۵	۱۵۷/۲
زنان	۱۷۷/۴	۱۳۳/۱	۱۳۱/۸	۱۵۶/۹
مردان	۱۵۶/۹	۱۱۹/۱	۱۳۸/۴	۱۵۸/۱




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۳۵/۳	۳۰/۱	۲۸/۳	۲۸/۳
زنان	۳۱/۷	۲۷/۷	۲۶/۱	۲۶/۳
مردان	۳۷/۴	۳۱/۶	۳۰/۹	۳۰/۷




Ischemic heart disease




Stroke




Alzheimer's disease and other dementias




Diabetes mellitus type 2




Lower respiratory infections




Falls







اختلالات افسردگی				اختلالات اضطرابی				جنسیت
۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	
۶۳۴۸/۲	۶۲۳۵/۴	۶۰۳۸/۲	۶۱۱۲/۳	۶۵۱۳/۵	۶۶۴۶/۵	۶۳۳۱/۱	۶۴۰۷/۷	هر دو
۷۳۸۰/۱	۷۲۸۸/۷	۷۱۲۸/۲	۷۱۶۴/۶	۸۲۰۴/۷	۸۳۹۳/۷	۸۲۵۲/۸	۸۲۷۱/۴	زنان
۵۲۳۷/۴	۵۱۳۱/۴	۵۱۲۶	۵۱۹۴/۹	۴۷۱۷/۷	۴۸۴۴	۴۷۲۳	۴۷۵۲/۷	مردان




۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۱۱۳۵۳/۴	۱۲۰۲۷/۱	۱۱۸۵۴/۹	۱۱۶۰۰/۸	هر دو
۱۱۰۸۲/۱	۱۱۶۹۹/۳	۱۱۴۸۴/۴	۱۱۲۶۶/۵	زنان
۱۱۶۳۱/۳	۱۲۳۴۷/۶	۱۲۱۷۱/۲	۱۱۹۱۵/۷	مردان




۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۹۰۵۲/۶	۹۴۸۶/۴	۸۴۰۴/۷	۹۳۳۵/۴	هر دو
۷۷۰۱/۳	۷۵۶۶/۴	۶۷۸۲/۱	۷۵۶۳/۷	زنان
۱۰۴۷۳/۴	۱۱۴۳۱/۶	۹۷۵۹/۲	۱۰۹۲۳/۵	مردان



۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۸۸۷/۳	۸۰۶۳/۲	۷۲۹۵/۹	۷۱۵۰/۴	هر دو
۹۹۲۳/۴	۹۳۹۷/۹	۸۵۱۸/۹	۸۱۴۹	زنان
۷۸۲۱/۶	۶۷۷۷/۹	۶۲۸۲/۸	۶۲۲۶/۹	مردان









۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۲۶۱/۷	۷۱۲۵/۸	۷۱۰۶/۱	۸۲۴۰/۸	هر دو
۹۲۹۵/۶	۷۷۰۵/۵	۸۱۰۹/۴	۹۶۲۱/۶	زنان
۷۲۱۲/۸	۶۵۶۹	۶۲۵۸/۴	۶۹۰۱/۳	مردان



۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۵۲۹۶/۳	۵۳۶۳/۲	۵۵۲۴/۹	۵۶۳۷/۳	هر دو
۵۵۵۴/۸	۵۶۳۰/۵	۵۷۷۹/۸	۵۸۴۱/۵	زنان
۵۰۵۵/۲	۵۱۲۶/۸	۵۳۰۵/۸	۵۴۱۰	مردان



وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
آدریس سلامت استان



سیمای سلامت سالمندان

استان خوزستان

میزان مرگ و شیوع بیماری ها



سیمای سلامت سالمندان

استان خوزستان

(میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها در کل جمعیت، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (کمتر از ۶۰ سال) ساکن در استان خوزستان و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس و گروه‌های سنی بیان شده است. به منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی حاوی: اطلاعات مقایسه‌ای با شاخص کل کشور و مقایسه با استان‌های مجاور استان خوزستان شامل: استان‌های بوشهر، چهارمحال و بختیاری، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان نیز تدوین و ترسیم شده است.

آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر این مطلب است که شایع‌ترین علل مرگ در سالمندان ساکن استان خوزستان (هر دو جنس) و براساس میزان در سال ۲۰۱۷، به ترتیب بیماری‌های غیرواگیر، بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای و سوانح و حوادث است. این شاخص در افراد غیر سالمند ساکن استان خوزستان به ترتیب، بیماری‌های غیرواگیر، سوانح و حوادث و بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای است و دارای الگوی متفاوت با سالمندان است.

روند زمانی تعداد مرگ به علت هر سه دسته اصلی بیماری‌ها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ در حال افزایش است. سالمندان ساکن در استان خوزستان و در سال ۲۰۱۷ از لحاظ میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای و بیماری‌های غیرواگیر از میانگین کشوری بالاتر و از لحاظ سوانح و حوادث پایین‌تر هستند.

سالمندان ساکن استان خوزستان از بین علل مختلف مرگ در بیماری‌های قلبی-عروقی (مردان در سال ۲۰۱۰)، اختلالات عصبی (مردان در سال ۲۰۱۰)، دیابت و بیماری‌های کلیوی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) و سوانح غیرعمدی (زنان و مردان در سال ۲۰۱۷) واجد رتبه‌ی ده و کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

از نظر شیوع مشکلات سلامتی مختلف در سالمندان ساکن استان خوزستان، این گروه جمعیتی در بیماری‌های قلبی-عروقی (زنان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷ و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، سرطان‌ها (زنان در سال ۲۰۱۰)، اختلالات عصبی (مردان در سال ۲۰۱۷)، دیابت و بیماری‌های کلیوی (زنان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷ و مردان در سال‌های ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) و سوانح غیرعمدی (زنان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) واجد رتبه‌ی ده و کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، سکته، عفونت‌های تنفسی تحتانی و افتادن کاهشی و برای بیماری آلزایمر و دیابت نوع دو افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری آلزایمر، دیابت نوع دو و عفونت‌های تنفسی تحتانی در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان خوزستان نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ بیشتر است. میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت افتادن در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان خوزستان نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر و به علت سکته بیشتر است.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع به علت مشکلات سلامتی در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، بیماری مزمن انسدادی ریه، سکته و بیماری آلزایمر کاهشی و برای اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی و افتادن افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع برای مشکلات سلامتی اختلالات روانی و افتادن در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان خوزستان نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر و برای بیماری مزمن انسدادی ریه و بیماری ایسکمیک قلب، بیشتر بوده است.




تعداد و میزان^۱ مرگ به تفکیک گروه سنی در سال ۲۰۱۷ در استان

گروه سنی	جنسیت	همه علل		بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای		بیماری‌های غیرواگیر		سوانح و حوادث	
		تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان
همه سنین	هر دو	۲۰۵۰۶	۴۲۰/۲	۱۵۷۷	۳۲/۳	۱۶۲۴۲	۳۳۲/۸	۲۶۸۷	۵۵/۱
	زنان	۸۶۶۵	۳۶۰/۲	۶۷۳	۲۸	۷۳۱۸	۳۰۴/۲	۶۷۵	۲۸/۱
	مردان	۱۱۸۴۱	۴۷۸/۴	۹۰۵	۳۶/۵	۸۹۲۴	۳۶۰/۵	۲۰۱۲	۸۱/۳
کمتر از ۶۰ سال	هر دو	۷۷۸۱	۱۷۲/۶	۱۱۱۲	۲۴/۷	۴۳۶۸	۹۶/۹	۲۳۰۱	۵۱
	زنان	۲۶۷۹	۱۲۰/۹	۴۷۲	۲۱/۳	۱۶۶۹	۷۵/۳	۵۳۸	۲۴/۳
	مردان	۵۱۰۲	۲۲۲/۵	۶۴۰	۲۷/۹	۲۶۹۹	۱۱۷/۷	۱۷۶۳	۷۶/۹
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۲۷۲۵	۳۴۲۴/۳	۴۶۵	۱۲۵/۱	۱۱۸۷۴	۳۱۹۵/۳	۳۸۶	۱۰۴
	زنان	۵۹۸۶	۳۱۶۷/۹	۲۰۰	۱۰۶	۵۶۴۹	۲۹۸۹/۵	۱۳۷	۷۲/۴
	مردان	۶۷۳۹	۳۶۸۹/۶	۲۶۵	۱۴۴/۹	۶۲۲۵	۳۴۰۸/۱	۲۴۹	۱۳۶/۶
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۱۶۲۷	۱۱۸۴	۵۴	۳۹/۱	۱۴۷۴	۱۰۷۳/۲	۹۹	۷۱/۸
	زنان	۶۶۹	۹۸۹/۸	۲۲	۳۱/۹	۶۱۸	۹۱۴/۹	۲۹	۴۳
	مردان	۹۵۸	۱۳۷۱/۹	۳۲	۴۶	۸۵۶	۱۲۲۶/۳	۷۰	۹۹/۶
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۱۵۸۱	۱۹۴۲/۴	۵۱	۶۳/۲	۱۴۵۹	۱۷۹۲/۶	۷۱	۸۶/۶
	زنان	۷۲۹	۱۶۶۷/۳	۲۲	۵۱/۱	۶۸۲	۱۵۶۰/۶	۲۴	۵۵/۶
	مردان	۸۵۳	۲۲۶۱/۵	۲۹	۷۷/۲	۷۷۷	۲۰۶۱/۶	۴۶	۱۲۲/۶
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۱۵۵۴	۲۶۶۵/۹	۵۵	۹۴/۶	۱۴۴۵	۲۴۷۹/۲	۵۴	۹۲/۲
	زنان	۷۶۳	۲۴۰۷/۲	۲۵	۷۸/۵	۷۱۷	۲۲۶۱/۹	۲۱	۶۶/۸
	مردان	۷۹۱	۲۹۷۳/۹	۳۰	۱۱۳/۶	۷۲۹	۲۷۳۷/۹	۳۳	۱۲۲/۴
۷۵ تا ۷۹ سال	هر دو	۲۰۰۱	۴۷۸۹/۱	۷۰	۱۶۶/۷	۱۸۷۹	۴۴۹۵/۸	۵۳	۱۲۶/۷
	زنان	۹۷۷	۴۶۳۴/۸	۳۲	۱۴۹/۷	۹۲۵	۴۳۸۹	۲۰	۹۶/۱
	مردان	۱۰۲۴	۴۹۴۶/۲	۳۸	۱۸۴/۱	۹۵۴	۴۶۰۴/۴	۳۳	۱۵۷/۷
۸۰ سال و بالاتر	هر دو	۵۹۶۲	۱۱۳۰۴/۲	۲۳۵	۴۴۵/۵	۵۶۱۷	۱۰۶۴۹	۱۱۱	۲۰۹/۶
	زنان	۲۸۴۹	۱۱۴۲۸/۸	۱۰۰	۴۰۰/۹	۲۷۰۷	۱۰۸۵۸/۸	۴۲	۱۶۹/۱
	مردان	۳۱۱۳	۱۱۱۹۲/۶	۱۳۵	۴۸۵/۵	۲۹۰۹	۱۰۴۶۱	۶۸	۲۴۶

امید زندگی (سال) در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ در استان

جنسیت	بدو تولد		۶۰ تا ۶۴ سال		۶۵ تا ۶۹ سال		۷۰ تا ۷۴ سال		۷۵ تا ۷۹ سال		۸۰ سال و بالاتر	
	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰
زنان	۷۱/۹	۷۸/۱	۱۷/۴	۲۱/۸	۱۳/۶	۱۷/۷	۱۰/۳	۱۳/۹	۷/۵	۱۰/۴	۵/۷	۷/۵
مردان	۶۷/۷	۷۳/۳	۱۶/۱	۲۰/۱	۱۲/۵	۱۶/۵	۹/۳	۱۳	۶/۶	۱۰/۲	۴/۵	۷/۶

روند زمانی تعداد در مقابل میزان استاندارد شده سنی مرگ در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سطح ملی و استان



^۱ در این گزارش تمامی میزان‌ها در ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت گزارش شده‌اند.




میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

علت ^۲	مردان								زنان							
	۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰		۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰	
	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه ^۳	میزان
بیماری‌های قلبی-عروقی	۱۲	۲۱۹۸/۵	۵	۲۳۶۶/۷	۱۱	۲۶۳۶/۵	۱۲	۳۰۸۷/۵	۱۱	۲۱۲۵/۸	۱۱	۲۲۶۱/۸	۱۲	۲۵۵۰/۱	۱۱	۳۰۱۲/۶
سرطان‌ها	۲۵	۵۶۱/۱	۲۴	۵۴۲/۶	۲۷	۴۲۵/۹	۲۹	۴۹۱/۸	۲۰	۳۷۲/۳	۱۹	۳۷۲/۲	۲۳	۲۸۷/۵	۲۷	۳۰۵/۵
اختلالات عصبی	۱۲	۳۳۵/۳	۸	۳۰۱/۴	۱۷	۲۱۸/۲	۱۹	۲۵۲/۵	۱۱	۳۸۸/۲	۱۲	۳۶۵	۱۴	۲۷۶/۹	۱۸	۲۸۸/۶
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۲	۳۷۵/۵	۲	۳۴۲/۸	۶	۲۰۷/۷	۷	۲۱۴/۲	۲	۴۱۹/۷	۲	۳۶۸/۶	۹	۲۲۰/۷	۱۰	۲۲۱/۳
بیماری‌های مزمن تنفسی	۲۲	۱۶۱	۲۰	۱۸۰/۲	۱۹	۱۸۷/۲	۲۳	۲۲۴	۲۳	۱۰۴/۱	۲۳	۱۲۴	۱۹	۱۳۳/۴	۲۰	۱۳۶/۶
بیماری‌های گوارشی	۲۰	۹۸/۹	۱۸	۱۰۰/۴	۱۶	۹۶/۶	۱۹	۱۲۶	۱۷	۷۸/۷	۱۸	۸۴/۶	۱۲	۸۲/۳	۱۷	۱۰۱/۵
سوانح حمل و نقل	۲۷	۶۴	۲۶	۷۶/۶	۲۷	۸۸	۲۸	۹۹/۱	۲۹	۲۷/۵	۲۸	۳۳/۴	۲۹	۳۳/۷	۲۷	۳۵/۹
سوانح غیرعمدی	۷	۶۳/۹	۱۱	۵۸/۹	۱۸	۶۲/۱	۲۰	۷۸	۸	۴۲/۳	۲۰	۳۷/۹	۲۰	۳۹	۱۸	۵۱

میزان استاندارد شده سنی **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

مشکل سلامتی	مردان								زنان							
	۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰		۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰	
	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه ^۴	میزان
بیماری‌های قلبی-عروقی	۶	۳۲۲۶۶/۳	۵	۳۲۷۴۳/۱	۹	۳۲۰۰۴	۷	۳۲۲۸۹/۶	۶	۳۳۳۸۱/۷	۶	۳۲۸۳۲/۴	۱۱	۳۲۵۴۳/۴	۱۰	۳۳۲۹۴/۶
سرطان‌ها	۲۶	۳۲۹۶	۲۴	۲۸۱۵/۴	۲۱	۱۸۹۸/۴	۲۸	۱۵۷۵/۵	۱۴	۲۳۳۷	۱۰	۲۱۱۸/۴	۱۴	۱۳۸۰/۱	۲۲	۱۱۹۴/۳
اختلالات عصبی	۹	۵۲۱۴۷/۲	۱۱	۵۲۱۵۵/۷	۱۱	۵۲۰۰۰/۳	۱۲	۵۱۲۸۵	۱۵	۵۸۲۱۵/۱	۲۰	۵۸۲۰۵/۳	۱۱	۵۷۶۰۵/۴	۱۷	۵۷۲۵۲
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۴	۵۰۷۸۸/۸	۴	۴۵۵۷۲/۶	۹	۴۲۳۸۰/۴	۱۱	۴۱۰۹۶/۱	۲	۶۱۶۵۴/۸	۵	۵۴۷۳۴/۱	۸	۵۰۴۴۴/۹	۹	۴۹۵۶۳/۱
بیماری‌های مزمن تنفسی	۲۳	۱۲۳۴۱/۶	۱۹	۱۲۴۰۸	۱۵	۱۲۶۰۴/۶	۱۲	۱۴۴۴۳/۲	۳۰	۱۴۲۲۶/۳	۲۱	۱۵۴۱۸/۷	۱۹	۱۴۹۶۳/۲	۱۵	۱۶۱۳۸/۴
بیماری‌های گوارشی	۲۵	۶۶۳۵۵/۳	۲۳	۶۳۱۴۵/۶	۱۷	۵۹۶۶۷/۳	۱۹	۵۷۶۰۸/۲	۲۴	۵۲۹۴۵/۵	۲۱	۵۱۰۷۳/۴	۱۵	۴۷۷۶۲/۵	۱۵	۴۶۵۹۸/۴
سوانح حمل و نقل	۲۱	۹۲۱۹/۷	۲۷	۱۰۵۸۵/۶	۲۸	۱۰۵۶۲/۹	۲۶	۱۱۱۹۱/۳	۲۷	۵۷۷۹/۲	۲۷	۶۵۶۹/۴	۲۹	۶۰۷۸/۲	۲۸	۶۶۱۹/۳
سوانح غیرعمدی	۷	۳۱۷۳۸/۹	۴	۳۴۷۲۶/۳	۷	۳۲۰۹۳/۲	۳	۳۶۷۹۰/۹	۱۱	۲۲۱۳۵/۱	۱۱	۲۱۸۴۷/۸	۱۰	۲۰۷۹۳/۸	۲	۲۵۰۱۸/۲

میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی و **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سال ۲۰۱۷ در سطح ملی و استان




^۲ علل براساس میزان استاندارد شده سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ و هر دو جنسیت در سطح ملی مرتب شده‌اند.


^۳ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی مرگ به تفکیک علت، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.

^۴ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی شیوع به تفکیک مشکل سلامتی، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.







جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۹۱۳/۴	۱۶۵۸/۳	۱۳۲۴	۱۳۱۴/۵
زنان	۱۸۱۲/۹	۱۵۶۴/۸	۱۲۴۱/۴	۱۲۶۱/۱
مردان	۲۰۰۲/۷	۱۷۳۱/۴	۱۴۰۳/۷	۱۳۷۵/۲




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۷۸۲/۴	۶۲۸/۷	۶۱۱/۱	۵۲۷/۵
زنان	۸۰۹/۳	۶۴۲/۱	۶۲۰	۵۳۸/۶
مردان	۷۴۵/۸	۶۱۱/۴	۶۰۱/۱	۵۱۸/۲




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۳۹/۹	۲۲۱/۴	۲۹۳/۸	۳۲۱/۵
زنان	۲۶۲/۶	۲۵۲/۲	۳۳۳/۹	۳۵۶/۷
مردان	۲۱۱/۸	۱۸۱/۵	۲۵۵	۲۸۷/۲



جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۵۳/۳	۶۵	۱۴۳	۱۸۹/۹
زنان	۵۲/۲	۶۷/۷	۱۵۱/۷	۲۰۹/۳
مردان	۵۴/۸	۶۳/۲	۱۳۴/۸	۱۷۰/۶











جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۱۶/۳	۹۹/۸	۱۱۲/۲	۱۰۶/۹
زنان	۱۰۵/۱	۸۹/۳	۹۸/۷	۹۳/۹
مردان	۱۲۹/۵	۱۱۰/۳	۱۲۴/۹	۱۲۰



جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۳/۲	۱۱/۵	۱۲/۳	۱۱/۸
زنان	۷/۹	۶/۸	۷/۶	۷/۴
مردان	۱۹	۱۶/۱	۱۶/۷	۱۶/۳











اختلالات افسردگی				اختلالات اضطرابی				جنسیت
۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	
۶۳۴۰/۶	۶۲۲۵/۳	۶۰۴۹/۴	۶۱۵۲/۸	۶۴۹۹/۲	۶۶۳۳/۵	۶۳۶۷	۶۴۷۷/۳	هر دو
۷۳۹۲	۷۲۸۸/۲	۷۱۳۸/۱	۷۱۷۱/۵	۸۲۰۴/۷	۸۳۹۳/۷	۸۲۵۲/۸	۸۲۷۱/۴	زنان
۵۲۳۸/۸	۵۱۳۲/۳	۵۱۰۴/۷	۵۱۹۱	۴۷۱۷/۷	۴۸۴۴	۴۷۲۳	۴۷۵۲/۷	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۱۰۸۹۳	۱۱۶۱۱	۱۱۴۱۹/۶	۱۱۰۳۱/۲	هر دو
۱۰۶۲۶/۴	۱۱۲۰۱/۷	۱۰۹۳۷/۳	۱۰۶۳۳/۱	زنان
۱۱۱۶۷/۱	۱۲۰۰۹/۳	۱۱۸۴۶/۵	۱۱۴۳۵/۳	مردان



۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۰۶۹	۷۸۹۰/۱	۶۶۱۴/۸	۷۵۷۲	هر دو
۷۰۰۸/۸	۶۱۳۷/۸	۵۱۵۹/۹	۵۸۵۷/۱	زنان
۹۱۷۰/۲	۹۶۳۱/۹	۷۹۱۲/۶	۹۲۹۰/۳	مردان







۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۳۸۷/۴	۸۴۹۸	۷۹۳۹/۸	۸۴۱۲/۵	هر دو
۹۱۵۳/۵	۹۷۵۰/۹	۹۰۷۱	۹۲۶۸/۱	زنان
۷۵۸۸/۴	۷۲۷۹	۶۹۶۰/۹	۷۵۶۴/۴	مردان



۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۲۷۳/۶	۷۸۶۶/۳	۷۳۵۹/۵	۸۳۴۰	هر دو
۹۰۵۳/۴	۸۲۳۴/۴	۷۹۷۲/۵	۹۲۸۷/۴	زنان
۷۴۷۴/۵	۷۴۹۹/۴	۶۸۰۱/۷	۷۳۳۲/۶	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۵۳۳۷/۱	۵۳۹۰/۷	۵۵۵۷/۴	۵۶۴۲/۱	هر دو
۵۵۹۸/۹	۵۶۵۹/۸	۵۸۱۵	۵۸۵۲/۲	زنان
۵۰۷۵/۳	۵۱۴۰/۷	۵۳۰۸/۱	۵۳۹۵/۷	مردان





سیمای سلامت سالمندان

استان زنجان

میزان مرگ و شیوع بیماری ها



سیمای سلامت سالمندان

استان زنجان

(میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها در کل جمعیت، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (کمتر از ۶۰ سال) ساکن در استان زنجان و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس و گروه‌های سنی بیان شده است. به منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی حاوی: اطلاعات مقایسه‌ای با شاخص کل کشور و مقایسه با استان‌های مجاور استان زنجان شامل: استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، همدان، کردستان و قزوین نیز تدوین و ترسیم شده است.

آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر این مطلب است که شایع‌ترین علل مرگ در سالمندان ساکن استان زنجان (هر دو جنس) براساس میزان در سال ۲۰۱۷، به ترتیب بیماری‌های غیرواگیر، سوانح و حوادث و بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای است. این شاخص در افراد غیر سالمند ساکن استان زنجان دارای الگویی مشابه سالمندان است.

روند زمانی تعداد مرگ به علت هر سه دسته اصلی بیماری‌ها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ در حال افزایش است. سالمندان ساکن در استان زنجان و در سال ۲۰۱۷ از لحاظ میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای و بیماری‌های غیرواگیر از میانگین کشوری پایین‌تر و به علت سوانح و حوادث از میانگین کشوری بالاتر هستند.

سالمندان ساکن استان زنجان، از بین علل مختلف مرگ در بیماری‌های قلبی-عروقی (مردان در سال‌های ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، بیماری‌های مزمن تنفسی (زنان در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ و مردان در سال ۲۰۱۷)، بیماری‌های گوارشی (مردان در سال ۲۰۱۷)، سوانح حمل و نقل (زنان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ و مردان در سال‌های ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) و سوانح غیرعمدی (زنان در سال ۲۰۱۰ و مردان در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) واجد رتبه‌ی ده و یا کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

از نظر شیوع مشکلات سلامتی در سالمندان ساکن استان زنجان، این گروه جمعیتی در بیماری‌های مزمن تنفسی (زنان و مردان در سال ۱۹۹۰)، بیماری‌های گوارشی (مردان در سال ۲۰۱۷)، سوانح حمل و نقل (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰) و سوانح غیر عمدی (زنان و مردان در سال ۱۹۹۰) یکی از ده استان دارای بالاترین شیوع در کل کشور بوده‌اند.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، سکته و افتادن کاهشی و برای بیماری آلزایمر، دیابت نوع دو و عفونت‌های تنفسی تحتانی افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت دیابت نوع دو در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان زنجان، نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر بوده است.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع به علت مشکلات سلامتی در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، افتادن، بیماری مزمن انسدادی ریه، سکته و بیماری آلزایمر کاهشی و برای اختلالات اضطرابی و اختلالات افسردگی افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع برای بیماری ایسکمیک قلب در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان زنجان در سال ۲۰۱۷ نسبت به تمام استان‌های مجاور کمتر بوده است.




تعداد و میزان^۱ مرگ به تفکیک گروه سنی در سال ۲۰۱۷ در استان

گروه سنی	جنسیت	همه علل		بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای		بیماری‌های غیرواگیر		سوانح و حوادث	
		تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان
همه سنین	هر دو	۵۰۶۵	۴۶۹/۷	۳۵۶	۳۳/۱	۴۱۳۷	۳۸۳/۶	۵۷۲	۵۳
	زنان	۲۲۳۴	۴۱۸/۳	۱۵۵	۲۹/۱	۱۹۳۹	۳۶۳	۱۴۰	۲۶/۲
	مردان	۲۸۳۱	۵۲۰/۲	۲۰۱	۳۷	۲۱۹۸	۴۰۳/۹	۴۳۲	۷۹/۳
کمتر از ۶۰ سال	هر دو	۱۴۵۸	۱۵۰	۲۴۶	۲۵/۳	۷۷۰	۷۹/۲	۴۴۲	۴۵/۵
	زنان	۴۸۱	۱۰۱	۱۰۵	۲۲	۲۸۳	۵۹/۴	۹۳	۱۹/۶
	مردان	۹۷۷	۱۹۷/۲	۱۴۲	۲۸/۶	۴۸۷	۹۸/۲	۳۴۹	۷۰/۴
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۳۶۰۷	۳۳۸۱/۶	۱۱۰	۱۰۳/۵	۳۳۶۷	۳۱۵۶/۴	۱۳۰	۱۲۱/۷
	زنان	۱۷۵۴	۳۰۱۹/۴	۵۱	۸۷/۱	۱۶۵۶	۲۸۵۱/۵	۴۷	۸۰/۷
	مردان	۱۸۵۴	۳۸۱۴/۵	۶۰	۱۲۳	۱۷۱۱	۳۵۲۰/۸	۸۳	۱۷۰/۶
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۳۱۴	۹۰۴/۷	۹	۲۶	۲۷۹	۸۰۴	۲۶	۷۴/۷
	زنان	۱۳۸	۷۴۵/۴	۴	۲۲/۴	۱۲۵	۶۷۹/۲	۸	۴۳/۷
	مردان	۱۷۶	۱۰۸۵/۸	۵	۳۰	۱۵۴	۹۴۵/۸	۱۸	۱۰۹/۹
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۳۳۹	۱۴۰۷/۷	۹	۳۹/۳	۳۰۹	۱۲۸۲	۲۱	۸۶/۴
	زنان	۱۵۵	۱۱۶۱	۴	۳۳/۴	۱۴۳	۱۰۷۴/۱	۷	۵۳/۴
	مردان	۱۸۴	۱۷۱۳/۹	۵	۴۶/۶	۱۶۵	۱۵۳۹/۹	۱۴	۱۲۷/۵
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۴۳۷	۲۴۱۳/۹	۱۳	۷۰/۹	۴۰۵	۲۲۳۴/۳	۲۰	۱۰۸/۷
	زنان	۲۰۲	۱۹۶۰/۹	۶	۵۴/۸	۱۹۰	۱۸۴۱/۹	۷	۶۴/۲
	مردان	۲۳۵	۳۰۱۳/۱	۷	۹۲/۲	۲۱۵	۲۷۵۳/۴	۱۳	۱۶۷/۵
۷۵ تا ۷۹ سال	هر دو	۶۳۸	۴۵۹۷/۳	۱۹	۱۳۵/۴	۵۹۸	۴۳۰۸/۹	۲۱	۱۵۳/۱
	زنان	۲۸۸	۳۸۹۷/۵	۸	۱۰۳/۶	۲۷۳	۳۶۹۷/۳	۷	۹۶/۶
	مردان	۳۵۰	۵۳۹۳/۵	۱۱	۱۷۱/۵	۳۲۵	۵۰۰۴/۶	۱۴	۲۱۷/۴
۸۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۸۷۹	۱۱۸۱۸/۷	۶۰	۳۷۹/۱	۱۷۷۷	۱۱۱۷۴/۵	۴۲	۲۶۵/۱
	زنان	۹۷۱	۱۱۳۰۷/۹	۲۹	۳۳۴/۳	۹۲۵	۱۰۷۶۴/۶	۱۸	۲۰۹
	مردان	۹۰۸	۱۲۴۱۸/۸	۳۲	۴۳۱/۸	۸۵۲	۱۱۶۵۶	۲۴	۳۳۰/۹

امید زندگی (سال) در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ در استان

جنسیت	بدو تولد		۶۰ تا ۶۴ سال		۶۵ تا ۶۹ سال		۷۰ تا ۷۴ سال		۷۵ تا ۷۹ سال		۸۰ سال و بالاتر	
	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰
زنان	۵۹/۵	۸۴/۷	۱۳/۱	۲۷	۹/۹	۲۲/۵	۷	۱۸/۲	۴/۷	۱۴/۲	۴/۴	۱۰/۷
مردان	۵۶/۶	۷۸/۵	۱۱/۸	۲۴/۱	۸/۴	۲۰/۲	۶/۲	۱۶/۲	۳/۹	۱۲/۶	۳/۶	۹/۳

روند زمانی تعداد در مقابل میزان استاندارد شده سنی مرگ در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سطح ملی و استان



^۱ در این گزارش تمامی میزان‌ها در ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت گزارش شده‌اند.




میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

علت ^۲	زنان								مردان							
	۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷		۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷	
	میزان	رتبه ^۳	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه
بیماری‌های قلبی-عروقی	۲۷۶۹/۲	۲۲	۲۵۱۹	۱۳	۲۱۷۲/۵	۱۳	۲۰۵۳/۴	۱۴	۳۰۹۸/۳	۱۱	۲۷۲۵/۵	۹	۲۳۷۹/۹	۴	۲۳۱۱/۹	۶
سرطان‌ها	۳۳۴/۹	۲۱	۳۱۱/۶	۱۹	۳۶۵	۲۱	۳۶۹/۸	۲۲	۶۳۳/۴	۱۴	۵۵۳/۸	۱۱	۶۰۴/۶	۱۱	۶۴۲/۹	۱۷
اختلالات عصبی	۲۴۶/۴	۲۶	۲۲۴/۱	۲۱	۳۰۸/۸	۲۳	۳۵۲/۴	۲۱	۲۳۶	۲۲	۲۰۹/۸	۲۱	۲۴۸/۴	۱۹	۳۳۳/۱	۱۵
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۱۱۶/۸	۲۹	۱۲۱/۵	۲۵	۱۳۴/۳	۲۹	۱۴۶/۱	۲۹	۱۳۰/۳	۲۸	۱۲۶/۱	۲۴	۱۴۶/۱	۲۷	۱۵۷/۶	۲۹
بیماری‌های مزمن تنفسی	۱۹۷/۱	۱۴	۱۹۹/۵	۱۰	۱۷۶/۷	۱۰	۱۵۷/۸	۱۱	۳۰۰/۸	۱۴	۲۵۹	۱۲	۲۴۱/۶	۱۱	۲۲۱/۲	۱۰
بیماری‌های گوارشی	۹۱/۲	۲۲	۶۹/۹	۲۰	۸۴/۳	۱۹	۸۴/۲	۱۴	۱۳۰/۴	۱۶	۹۶/۹	۱۵	۱۰۲/۱	۱۷	۱۱۴/۶	۱۰
سوانح حمل و نقل	۵۸/۷	۱۰	۵۸	۴	۴۹/۷	۹	۴۰/۹	۱۲	۱۶۹/۶	۱۳	۱۵۹/۶	۱۰	۱۲۹/۷	۵	۱۰۴/۵	۸
سوانح غیرعمدی	۵۱/۷	۱۷	۴۲/۳	۱۴	۴۳/۲	۱۰	۳۹/۳	۱۱	۸۳/۳	۱۴	۶۹/۴	۱۰	۶۲/۹	۶	۶۰	۸

میزان استاندارد شده سنی **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

مشکل سلامتی	زنان								مردان							
	۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷		۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷	
	میزان	رتبه ^۴	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه
بیماری‌های قلبی-عروقی	۳۲۱۷۶/۹	۲۱	۳۱۴۱۴/۵	۲۴	۳۱۵۱۳/۶	۲۳	۳۱۷۲۶	۲۶	۳۱۰۴۳/۹	۱۹	۳۰۵۷۴/۴	۲۶	۳۱۱۰۳/۹	۲۲	۳۰۶۶۵/۲	۲۳
سرطان‌ها	۱۰۷۸/۳	۳۰	۱۱۵۷/۳	۲۶	۱۶۷۴/۸	۲۸	۱۸۸۲	۳۰	۱۶۳۱	۲۷	۱۷۹۶/۸	۲۵	۲۴۳۸/۵	۳۰	۲۹۹۹/۱	۳۱
اختلالات عصبی	۵۷۲۴۵/۳	۲۲	۵۷۶۰۰	۱۵	۵۸۱۹۹/۵	۲۳	۵۸۱۹۹/۲	۲۶	۵۱۲۷۳/۳	۱۷	۵۱۹۸۹/۵	۱۷	۵۲۱۴۲/۹	۱۷	۵۲۱۳۴/۲	۱۹
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۴۵۸۱۱/۹	۲۹	۴۶۵۹۰/۹	۲۶	۴۸۸۳۸/۶	۲۸	۵۴۹۶۱/۳	۳۰	۳۶۹۵۹/۳	۲۹	۳۸۰۶۱/۹	۲۷	۳۹۵۹۲	۲۶	۴۴۰۵۳/۵	۲۸
بیماری‌های مزمن تنفسی	۱۷۴۲۷/۸	۸	۱۵۹۸۹/۱	۱۳	۱۶۴۷۷	۱۲	۱۵۴۳۱/۳	۱۲	۱۵۰۰۷/۱	۹	۱۲۹۵۳/۵	۱۴	۱۲۹۶۶/۷	۱۴	۱۲۸۶۴/۳	۱۴
بیماری‌های گوارشی	۴۶۲۶۴/۳	۲۴	۴۷۴۳۷/۷	۲۵	۵۱۱۳۱/۱	۱۹	۵۳۱۳۳/۷	۱۸	۵۷۳۶۶/۱	۲۳	۵۹۴۹۸/۴	۲۴	۶۳۲۱۳/۲	۲۱	۶۶۷۱۲	۹
سوانح حمل و نقل	۸۴۷۳/۱	۳	۷۶۵۸/۹	۴	۷۶۲۶/۷	۳	۶۱۶۲/۹	۱۴	۱۳۱۴۹/۸	۵	۱۲۵۳۱/۴	۵	۱۲۰۳۸/۶	۴	۹۳۵۰/۷	۱۸
سوانح غیرعمدی	۲۳۹۲۸/۲	۹	۱۹۷۶۶/۵	۱۶	۲۱۰۴۳/۳	۱۹	۲۱۸۷۸/۴	۱۶	۳۴۳۷۳/۷	۸	۲۹۳۵۱/۹	۱۳	۳۲۱۴۶/۸	۱۴	۲۹۱۵۳/۷	۲۱

میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی و **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سال ۲۰۱۷ در سطح ملی و استان




^۲ علل براساس میزان استاندارد شده سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ و هر دو جنسیت در سطح ملی مرتب شده‌اند.


^۳ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی مرگ به تفکیک علت، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.

^۴ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی شیوع به تفکیک مشکل سلامتی، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.







جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۹۴۷/۵	۱۸۰۰/۳	۱۳۱۷/۳	۱۳۳۳/۲
زنان	۱۷۷۰/۲	۱۶۵۷/۹	۱۲۱۶/۷	۱۲۳۷
مردان	۲۱۳۳/۹	۱۹۰۴/۵	۱۴۱۰/۷	۱۴۴۶/۲




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۷۸۲/۱	۶۶۷/۸	۵۵۷/۶	۴۹۵/۷
زنان	۷۷۱/۸	۶۶۳/۹	۵۴۱/۱	۴۷۴/۲
مردان	۷۸۷	۶۵۹/۳	۵۶۹/۵	۵۲۰/۵




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۱۶/۷	۱۹۲/۶	۲۴۸/۱	۳۰۶/۲
زنان	۲۲۶/۱	۲۰۴	۲۸۲/۴	۳۲۴/۷
مردان	۱۹۸/۴	۱۷۵	۲۰۵/۲	۲۸۳/۵



جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۱/۳	۲۷/۳	۳۴/۳	۴۳/۴
زنان	۲۱/۴	۲۹/۲	۳۴/۵	۴۵/۵
مردان	۲۱/۵	۲۵/۳	۳۴	۴۰/۹




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۷۹/۶	۷۱/۸	۸۲/۴	۸۵/۲
زنان	۷۲/۱	۶۴/۷	۷۱/۷	۷۲/۵
مردان	۸۹/۸	۷۸/۶	۹۳	۱۰۰/۳




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۸/۲	۲۵/۴	۲۵/۹	۲۴
زنان	۲۰/۳	۱۸/۲	۲۱/۸	۲۰/۱
مردان	۳۶/۹	۳۲/۱	۳۰/۳	۲۸/۸




Ischemic heart disease




Stroke




Alzheimer's disease and other dementias




Diabetes mellitus type 2





Lower respiratory infections





Falls







اختلالات افسردگی				اختلالات اضطرابی				جنسیت
۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	
۶۴۱۶/۴	۶۲۸۷/۸	۶۰۶۴/۷	۶۱۲۳/۳	۶۶۱۸/۳	۶۷۳۵/۳	۶۳۹۶/۲	۶۴۳۵/۸	هر دو
۷۳۸۹/۲	۷۲۹۱/۳	۷۱۲۶/۷	۷۱۶۰	۸۲۰۴/۷	۸۳۹۳/۷	۸۲۵۲/۸	۸۲۷۱/۴	زنان
۵۲۵۱/۴	۵۱۳۶/۹	۵۱۱۱/۸	۵۱۹۶/۷	۴۷۱۷/۷	۴۸۴۴	۴۷۲۳	۴۷۵۲/۷	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۱۰۲۸۳/۲	۱۱۰۱۸/۹	۱۰۸۵۰/۵	۱۰۷۳۳/۹	هر دو
۱۰۱۰۴	۱۰۷۵۶/۶	۱۰۵۳۲/۹	۱۰۴۲۹/۳	زنان
۱۰۴۹۷/۴	۱۱۳۱۴/۷	۱۱۱۴۷/۹	۱۱۰۴۲/۴	مردان



۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۸۸۳	۹۷۳۲/۴	۸۷۶۵/۹	۱۰۲۲۴/۲	هر دو
۷۶۸۱/۹	۷۷۴۱/۴	۶۹۶۲/۷	۸۱۶۳/۹	زنان
۱۰۳۲۴/۴	۱۱۹۸۴/۸	۱۰۴۱۱/۸	۱۲۱۷۳/۵	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۲۷۶/۴	۸۵۹۹/۹	۷۹۸۹	۸۵۱۵/۷	هر دو
۹۰۶۸/۸	۹۸۰۵/۲	۹۲۰۵/۷	۹۶۲۹/۸	زنان
۷۳۲۶/۲	۷۲۶۰/۶	۶۸۸۴/۱	۷۴۳۹/۴	مردان




۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۷۳۹۴/۹	۷۱۲۳/۲	۶۹۶۴/۹	۷۸۰۶/۵	هر دو
۷۹۶۱/۳	۷۵۵۱/۷	۷۵۹۹/۹	۸۷۳۸/۸	زنان
۶۷۱۰/۸	۶۶۳۶/۶	۶۳۵۳	۶۸۵۲/۲	مردان


۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۵۳۳۵/۵	۵۳۹۲/۲	۵۵۵۲	۵۶۲۹/۳	هر دو
۵۵۶۶/۶	۵۶۳۳/۶	۵۸۰۰/۴	۵۸۳۳/۱	زنان
۵۰۵۸/۲	۵۱۲۵/۶	۵۳۰۲/۵	۵۳۷۳/۶	مردان




Mental disorders
Female Male




Ischemic heart disease
Female Male




Falls
Female Male




Chronic obstructive pulmonary disease
Female Male



Stroke
Female Male



Alzheimer's disease and other dementias
Female Male



سیمای سلامت سالمندان

استان سمنان

میزان مرگ و شیوع بیماری ها



سیمای سلامت سالمندان

استان سمنان

(میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها در کل جمعیت، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (کمتر از ۶۰ سال) ساکن در استان سمنان و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس و گروه‌های سنی بیان شده است. به منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی حاوی: اطلاعات مقایسه‌ای با شاخص کل کشور و مقایسه با استان‌های مجاور استان سمنان شامل: استان‌های گلستان، اصفهان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، مازندران، قم و تهران نیز تدوین و ترسیم شده است.

آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر این مطلب است که شایع‌ترین علل مرگ در سالمند ساکن استان سمنان (هر دو جنس) براساس میزان در سال ۲۰۱۷، به ترتیب بیماری‌های غیرواگیر، بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای و سوانح و حوادث است. این شاخص در افراد غیر سالمند ساکن استان سمنان به ترتیب بیماری‌های غیرواگیر، سوانح و حوادث و بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای است و دارای الگوی متفاوت با سالمندان است.

روند زمانی تعداد مرگ به علت هر سه دسته اصلی بیماری‌ها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ در حال افزایش است. سالمندان ساکن در استان سمنان و در سال ۲۰۱۷ از لحاظ میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای و سوانح و حوادث از میانگین کشوری بالاتر و به علت بیماری‌های غیرواگیر پایین‌تر بوده‌اند.

سالمندان ساکن استان سمنان، از بین علل مختلف مرگ در سرطان‌ها (مردان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰)، دیابت و بیماری‌های کلیوی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، بیماری‌های مزمن تنفسی (مردان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰)، سوانح حمل و نقل (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ و زنان در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) و سوانح غیر عمدی (مردان در سال ۲۰۰۰) واجد رتبه‌ی ده و یا کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

از نظر شیوع مشکلات سلامتی در سالمندان ساکن استان سمنان، این گروه جمعیتی در سرطان‌ها (زنان در سال ۲۰۰۰ و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۷)، اختلالات عصبی (زنان در سال ۲۰۱۷)، دیابت و بیماری‌های کلیوی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، بیماری‌های مزمن تنفسی (مردان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰)، بیماری‌های گوارشی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ و مردان در سال ۲۰۱۰) و سوانح حمل و نقل (زنان در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۷ و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰) یکی از ده استان دارای بالاترین شیوع در کل کشور بوده‌اند.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، سکته، عفونت‌های تنفسی تحتانی و افتادن کاهشی و برای بیماری آلزایمر و دیابت نوع دو افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان سمنان در سال ۲۰۱۷ در هیچ یک از علل نسبت به استان‌های مجاور، بیشترین یا کمترین نبوده است.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع به علت مشکلات سلامتی در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای اختلالات اضطرابی، بیماری ایسکمیک قلب، افتادن، سکته و بیماری آلزایمر کاهشی و برای اختلالات افسردگی و بیماری مزمن انسدادی ریه افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع هیچ یک از مشکلات سلامتی در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان سمنان در سال ۲۰۱۷ نسبت به استان‌های مجاور، بیشترین یا کمترین نبوده است.




تعداد و میزان^۱ مرگ به تفکیک گروه سنی در سال ۲۰۱۷ در استان

گروه سنی	جنسیت	همه علل		بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای		بیماری‌های غیرواگیر		سوانح و حوادث	
		تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان
همه سنین	هر دو	۳۴۵۲	۴۷۲/۵	۲۰۸	۲۸/۴	۲۸۹۸	۳۹۶/۶	۳۴۷	۴۷/۵
	زنان	۱۵۶۰	۴۳۴/۶	۹۶	۲۶/۸	۱۳۷۳	۳۸۲/۵	۹۱	۲۵/۴
	مردان	۱۸۹۲	۵۰۹/۱	۱۱۲	۳۰	۱۵۲۴	۴۱۰/۲	۲۵۶	۶۸/۹
کمتر از ۶۰ سال	هر دو	۸۹۵	۱۳۶/۵	۱۱۱	۱۶/۹	۵۲۴	۷۹/۹	۲۶۰	۳۹/۷
	زنان	۳۱۰	۹۶/۶	۴۹	۱۵/۳	۲۰۲	۶۲/۹	۵۹	۱۸/۵
	مردان	۵۸۵	۱۷۴/۶	۶۱	۱۸/۳	۳۲۲	۹۶/۲	۲۰۱	۶۰/۱
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۲۵۵۸	۳۴۰۷/۱	۹۷	۱۲۹/۵	۲۳۷۴	۳۱۶۲/۳	۸۷	۱۱۵/۳
	زنان	۱۲۵۱	۳۲۵۷/۶	۴۷	۱۲۲/۴	۱۱۷۲	۳۰۵۱/۸	۳۲	۸۳/۴
	مردان	۱۳۰۷	۳۵۶۳/۷	۵۰	۱۳۷	۱۲۰۲	۳۲۷۷/۸	۵۵	۱۴۸/۸
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۲۱۵	۹۰۱/۴	۷	۲۷/۵	۱۹۲	۸۰۲/۹	۱۷	۷۰/۹
	زنان	۸۰	۶۷۲	۳	۲۱/۳	۷۳	۶۱۱/۵	۵	۳۹/۳
	مردان	۱۳۵	۱۱۳۱/۲	۴	۳۳/۸	۱۱۹	۹۹۴/۷	۱۲	۱۰۲/۷
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۲۴۶	۱۳۹۸/۷	۷	۴۱/۹	۲۲۴	۱۲۷۳/۲	۱۵	۸۳/۶
	زنان	۱۰۹	۱۲۰۰/۷	۳	۳۷/۴	۱۰۱	۱۱۰۹/۴	۵	۵۳/۹
	مردان	۱۳۷	۱۶۱۱/۷	۴	۴۶/۷	۱۲۳	۱۴۴۹/۴	۱۰	۱۱۵/۶
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۲۷۶	۲۲۶۷/۳	۹	۷۳/۷	۲۵۵	۲۰۹۶/۳	۱۲	۹۷/۳
	زنان	۱۲۶	۲۰۳۰/۵	۴	۶۷/۲	۱۱۸	۱۸۹۵/۴	۴	۶۷/۹
	مردان	۱۵۰	۲۵۱۴/۴	۵	۸۰/۴	۱۳۷	۲۳۰۶/۱	۸	۱۲۸
۷۵ تا ۷۹ سال	هر دو	۳۷۶	۴۲۴۴/۳	۱۳	۱۵۰/۶	۳۵۰	۳۹۵۸/۷	۱۲	۱۳۵/۱
	زنان	۱۷۷	۴۰۲۶/۳	۶	۱۴۱/۶	۱۶۷	۳۷۸۱/۲	۵	۱۰۳/۵
	مردان	۱۹۸	۴۴۶۰/۵	۷	۱۵۹/۵	۱۸۴	۴۱۳۴/۷	۷	۱۶۶/۳
۸۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۴۴۵	۱۱۴۹۰/۲	۶۱	۴۸۵/۱	۱۳۵۳	۱۰۷۵۷/۴	۳۱	۲۴۷/۷
	زنان	۷۵۷	۱۱۳۰۲/۹	۳۱	۴۵۶/۹	۷۱۳	۱۰۶۴۲/۷	۱۴	۲۰۳/۳
	مردان	۶۸۸	۱۱۷۰۳/۷	۳۰	۵۱۷/۳	۶۴۰	۱۰۸۸۸/۱	۱۸	۲۹۸/۳

امید زندگی (سال) در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ در استان

جنسیت	بدو تولد		۶۰ تا ۶۴ سال		۶۵ تا ۶۹ سال		۷۰ تا ۷۴ سال		۷۵ تا ۷۹ سال		۸۰ سال و بالاتر	
	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰
زنان	۶۷/۴	۷۹/۴	۱۶/۶	۲۳/۱	۱۲/۷	۱۸/۹	۹/۶	۱۵/۱	۶/۶	۱۱/۵	۴/۸	۸/۵
مردان	۶۷	۷۴/۳	۱۶/۴	۲۰/۶	۱۲/۶	۱۷/۲	۹/۶	۱۳/۷	۶/۸	۱۰/۷	۴/۷	۸/۸

روند زمانی تعداد در مقابل میزان استاندارد شده سنی مرگ در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سطح ملی و استان



^۱ در این گزارش تمامی میزان‌ها در ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت گزارش شده‌اند.




میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

علت ^۲	مردان								زنان							
	۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰		۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰	
	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه ^۳	میزان
بیماری‌های قلبی-عروقی	۲۵	۱۸۳۷	۱۹	۱۹۶۵/۹	۱۳	۲۶۰۰	۱۳	۳۰۴۴	۲۶	۱۷۴۶/۶	۱۹	۱۹۷۵/۸	۱۷	۲۳۶۴/۹	۲۴	۲۶۳۰/۳
سرطان‌ها	۲۰	۶۰۰/۹	۱۸	۵۷۷	۵	۶۱۷/۷	۱۰	۷۱۹/۴	۲۳	۳۶۷/۷	۱۸	۳۷۷/۲	۱۲	۳۳۴/۶	۱۶	۳۷۳/۵
اختلالات عصبی	۱۹	۳۱۰	۲۱	۲۴۶/۱	۱۱	۲۵۰/۵	۱۴	۲۷۲/۸	۱۹	۳۵۶	۱۹	۳۴۲/۹	۱۳	۲۷۹/۱	۱۳	۳۱۲/۵
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۱۰	۲۷۸/۶	۶	۲۶۵/۱	۴	۲۵۲/۱	۴	۲۶۴/۱	۸	۳۰۷/۸	۶	۲۸۹/۴	۵	۲۴۰	۵	۲۳۸/۲
بیماری‌های مزمن تنفسی	۱۳	۲۰۶	۱۳	۲۲۵/۹	۹	۳۱۱/۳	۹	۳۷۷/۲	۱۲	۱۴۳/۴	۱۳	۱۶۵/۸	۱۳	۱۹۳/۷	۱۳	۲۰۱/۱
بیماری‌های گوارشی	۱۸	۱۰۱/۸	۲۱	۹۳/۷	۱۳	۱۰۴/۴	۱۴	۱۴۳/۸	۲۱	۷۶/۵	۲۱	۸۱/۸	۱۸	۷۲/۸	۱۶	۱۰۳/۶
سوانح حمل و نقل	۱۹	۸۸/۶	۱۲	۱۱۷/۵	۴	۱۷۰/۲	۷	۱۹۶/۸	۸	۴۳/۷	۷	۵۱/۹	۸	۵۶	۹	۶۰/۷
سوانح غیرعمدی	۲۲	۵۱	۱۵	۵۶/۹	۹	۷۰/۶	۱۲	۸۴/۸	۱۹	۳۵/۱	۱۶	۴۰/۹	۱۹	۳۹/۲	۲۳	۴۷/۵

میزان استاندارد شده سنی **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

مشکل سلامتی	مردان								زنان							
	۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰		۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰	
	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه ^۴	میزان
بیماری‌های قلبی-عروقی	۲۲	۳۰۷۳۷/۳	۲۳	۳۱۰۴۹/۲	۲۱	۳۰۷۸۹/۹	۱۸	۳۱۱۷۲/۶	۱۶	۳۲۴۰۴/۹	۱۷	۳۱۹۸۲/۶	۱۶	۳۱۹۶۴	۱۸	۳۲۴۵۹/۳
سرطان‌ها	۱۰	۳۷۲۲/۶	۱۱	۳۱۳۷/۲	۶	۲۴۵۵/۴	۸	۲۱۰۴/۴	۱۸	۲۱۹۲/۷	۱۴	۲۰۴۵/۱	۱۰	۱۴۴۵/۱	۱۲	۱۳۰۹/۶
اختلالات عصبی	۱۶	۵۲۱۳۶/۹	۱۹	۵۲۱۴۰/۲	۲۴	۵۱۹۷۶/۴	۲۴	۵۱۲۶۲/۱	۱۰	۵۸۲۲۱/۴	۱۵	۵۸۲۱۳/۶	۱۴	۵۷۶۰۲/۵	۲۷	۵۷۲۲۶/۷
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۹	۴۸۴۶۴/۲	۶	۴۴۹۴۹/۶	۴	۴۳۸۸۲/۸	۴	۴۳۰۱۱/۲	۳	۶۰۵۷۷/۲	۲	۵۵۵۳۰	۲	۵۲۸۲۷/۱	۲	۵۱۷۴۰/۸
بیماری‌های مزمن تنفسی	۱۳	۱۲۸۷۶/۶	۱۱	۱۳۲۴۷/۲	۱۰	۱۳۸۷۵	۱۰	۱۴۸۵۰/۸	۱۱	۱۵۵۹۳/۸	۱۱	۱۶۸۰۱	۱۱	۱۶۳۹۹/۴	۱۳	۱۶۴۰۴/۸
بیماری‌های گوارشی	۱۲	۶۶۶۶۸/۲	۱۰	۶۳۴۹۱	۴	۶۰۳۵۶/۱	۵	۵۸۳۶۳/۹	۱۷	۵۳۱۷۸/۷	۱۳	۵۱۳۵۴/۶	۹	۴۸۱۶۲/۵	۸	۴۷۰۵۲/۹
سوانح حمل و نقل	۱۷	۹۴۲۷/۱	۹	۱۱۶۷۲/۴	۷	۱۲۳۸۵/۴	۷	۱۲۵۴۴/۷	۷	۶۳۲۰/۳	۱۱	۷۳۸۳/۹	۸	۷۳۰۴/۹	۱۱	۷۷۲۰
سوانح غیرعمدی	۲۴	۲۸۹۸۰/۲	۲۳	۳۰۸۶۱/۹	۱۵	۲۹۲۵۴	۱۵	۳۲۶۹۴/۵	۱۵	۲۱۹۰۹/۸	۲۵	۲۰۴۸۶/۹	۲۷	۱۸۸۶۹/۴	۲۴	۲۱۷۹۲/۲

میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی و **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سال ۲۰۱۷ در سطح ملی و استان




^۲ علل براساس میزان استاندارد شده سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ و هر دو جنسیت در سطح ملی مرتب شده‌اند.


^۳ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی مرگ به تفکیک علت، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.

^۴ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی شیوع به تفکیک مشکل سلامتی، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.







جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۷۷۱/۲	۱۶۰۰/۶	۱۰۲۲/۴	۹۶۹/۹
زنان	۱۵۳۲	۱۴۲۲/۳	۹۴۸/۱	۸۹۹/۲
مردان	۲۰۰۴/۹	۱۷۲۸/۶	۱۰۸۱/۸	۱۰۴۱/۶




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۸۳۶/۶	۷۱۴/۴	۵۵۶/۶	۴۶۲
زنان	۸۱۴/۳	۷۰۸/۵	۵۷۰/۷	۴۶۶/۵
مردان	۸۴۹/۶	۷۰۲/۴	۵۳۱/۶	۴۵۶/۱




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۶۸/۸	۲۳۹/۸	۲۶۴/۶	۲۹۶/۵
زنان	۲۸۷/۱	۲۵۵/۴	۳۱۳/۸	۳۲۶/۹
مردان	۲۲۸/۵	۲۰۸/۳	۲۰۲/۷	۲۶۲/۶



جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۹۰/۱	۱۰۵/۳	۱۴۰/۸	۱۵۴/۵
زنان	۸۶/۱	۱۰۶/۱	۱۵۳/۱	۱۷۲/۸
مردان	۹۵/۱	۱۰۳/۶	۱۲۶/۶	۱۳۵




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۲۰/۲	۱۱۰/۷	۱۱۲/۳	۱۰۵/۲
زنان	۱۰۴/۸	۹۶/۹	۱۰۶/۶	۹۸/۵
مردان	۱۳۸/۷	۱۲۲/۶	۱۱۵/۷	۱۱۲/۳




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۴/۶	۲۳/۱	۲۲/۴	۲۰/۴
زنان	۱۷	۱۶/۱	۱۹/۲	۱۷/۲
مردان	۳۳/۴	۳۰	۲۵/۶	۲۳/۷




Ischemic heart disease




Stroke




Alzheimer's disease and other dementias




Diabetes mellitus type 2





Lower respiratory infections





Falls







اختلالات افسردگی				اختلالات اضطرابی				جنسیت
۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	
۶۳۴۳/۱	۶۲۴۶	۶۱۱۹/۶	۶۱۹۰	۶۴۹۸/۶	۶۶۷۱/۵	۶۴۷۵/۹	۶۵۴۱/۴	هر دو
۷۳۹۸/۵	۷۲۸۹	۷۱۳۹	۷۱۷۰/۹	۸۲۰۴/۷	۸۳۹۳/۷	۸۲۵۲/۸	۸۲۷۱/۴	زنان
۵۲۴۴/۵	۵۱۳۸/۸	۵۱۱۳/۶	۵۱۹۴/۲	۴۷۱۷/۷	۴۸۴۴	۴۷۲۳	۴۷۵۲/۷	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۱۱۰۷۷	۱۱۶۰۵/۸	۱۱۴۶۷/۱	۱۱۳۴۶/۴	هر دو
۱۰۸۶۵	۱۱۳۶۱/۴	۱۱۱۶۴/۸	۱۱۰۵۶/۸	زنان
۱۱۳۰۰/۶	۱۱۸۶۶/۶	۱۱۷۷۳/۳	۱۱۶۶۹/۴	مردان



۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۶۰۲/۶	۹۰۱۰/۶	۷۹۷۰/۴	۸۸۷۸/۱	هر دو
۷۴۸۵/۴	۷۲۴۸	۶۳۶۲/۶	۷۱۲۵/۶	زنان
۹۷۷۱/۶	۱۰۸۷۸/۵	۹۵۶۲/۹	۱۰۷۲۵	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۳۲۱/۶	۸۳۹۵/۹	۷۹۶۰	۷۷۴۶	هر دو
۸۹۲۶/۷	۹۳۸۹/۴	۸۶۹۲/۶	۸۲۵۵	زنان
۷۴۸۱/۹	۷۳۵۰/۲	۷۲۴۱	۷۱۸۴/۹	مردان




۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۷۵۹۴/۲	۷۲۶۷/۸	۷۳۳۹/۳	۸۱۵۹	هر دو
۸۲۸۲/۸	۷۶۶۸/۹	۷۸۱۴/۵	۸۸۳۷/۶	زنان
۶۸۶۴/۲	۶۸۲۵/۸	۶۸۳۰/۳	۷۳۹۵/۱	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۵۲۹۷/۵	۵۳۴۵/۲	۵۴۹۰/۸	۵۵۶۹/۴	هر دو
۵۵۵۴/۵	۵۶۱۳/۷	۵۷۴۷/۱	۵۷۶۸/۶	زنان
۵۰۲۱/۴	۵۰۷۷/۷	۵۲۲۶/۸	۵۳۱۹/۱	مردان




Mental disorders

Female Male




Ischemic heart disease

Female Male




Falls

Female Male




Chronic obstructive pulmonary disease

Female Male




Stroke

Female Male



Alzheimer's disease and other dementias

Female Male



سیمای سلامت سالمندان

استان سیستان و بلوچستان

میزان مرگ و شیوع بیماری ها



سیمای سلامت سالمندان

استان سیستان و بلوچستان

(میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها در کل جمعیت، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (کمتر از ۶۰ سال) ساکن در استان سیستان و بلوچستان و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس و گروه‌های سنی بیان شده است. به منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی حاوی: اطلاعات مقایسه‌ای با شاخص کل کشور و مقایسه با استان‌های مجاور استان سیستان و بلوچستان شامل: استان‌های هرمزگان، کرمان و خراسان جنوبی نیز تدوین و ترسیم شده است.

آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر این مطلب است که شایع‌ترین علل مرگ در سالمندان ساکن استان سیستان و بلوچستان (هر دو جنس) براساس میزان در سال ۲۰۱۷، به ترتیب بیماری‌های غیرواگیر، بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای و سوانح و حوادث بوده است. این شاخص در افراد غیر سالمند ساکن استان سیستان و بلوچستان به ترتیب بیماری‌های غیرواگیر، سوانح و حوادث و بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای است و دارای الگویی متفاوت با سالمندان است.

روند زمانی تعداد مرگ به علت هر سه دسته اصلی بیماری‌ها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ در حال افزایش است. سالمندان ساکن در استان سیستان و بلوچستان و در سال ۲۰۱۷ از لحاظ میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت هر سه دسته اصلی بیماری‌ها از میانگین کشوری بالاتر هستند.

سالمندان ساکن استان سیستان و بلوچستان، از بین علل مختلف مرگ در بیماری‌های قلبی-عروقی (مردان در سال ۲۰۱۷)، سرطان‌ها (زنان و مردان در سال ۲۰۱۷)، دیابت و بیماری‌های کلیوی (مردان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷)، اختلالات عصبی (زنان در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷ و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، بیماری‌های مزمن تنفسی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، بیماری‌های گوارشی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، سوانح حمل و نقل (زنان و مردان در سال ۲۰۱۷) و سوانح غیر عمدی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷ و مردان در سال ۲۰۰۰) واجد رتبه‌ی ده و یا کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

از نظر شیوع مشکلات سلامتی در سالمندان ساکن استان سیستان و بلوچستان، این گروه جمعیتی در سرطان‌ها (زنان در سال ۲۰۱۷)، اختلالات عصبی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، بیماری‌های مزمن تنفسی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، بیماری‌های گوارشی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، سوانح حمل و نقل (زنان در سال‌های ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷ و مردان در سال ۲۰۱۷) و سوانح غیر عمدی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) یکی از ده استان دارای بالاترین شیوع در کل کشور بوده‌اند.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، سکته و عفونت‌های تنفسی تحتانی کاهشی و برای بیماری آلزایمر، دیابت نوع دو و افتادن افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری آلزایمر و افتادن در زنان و مردان و به علت سکته در مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان سیستان و بلوچستان نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ بیشتر بوده است.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع به علت مشکلات سلامتی در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب و بیماری آلزایمر کاهشی و برای اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی، افتادن، بیماری مزمن انسدادی ریه و سکته افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع برای مشکلات سلامتی بیماری ایسکمیک قلب در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان سیستان و بلوچستان در سال ۲۰۱۷ نسبت به تمام استان‌های مجاور کمتر و به علت اختلالات روانی و بیماری آلزایمر بیشتر بوده است.




تعداد و میزان^۱ مرگ به تفکیک گروه سنی در سال ۲۰۱۷ در استان

گروه سنی	جنسیت	همه علل		بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای		بیماری‌های غیرواگیر		سوانح و حوادث	
		تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان
همه سنین	هر دو	۱۲۹۱۳	۴۵۰/۷	۱۵۹۷	۵۵/۷	۸۴۴۴	۲۹۴/۷	۲۸۷۲	۱۰۰/۲
	زنان	۵۵۲۱	۳۸۹/۸	۷۷۰	۵۴/۴	۳۸۱۹	۲۶۹/۶	۹۳۲	۶۵/۸
	مردان	۷۳۹۲	۵۱۰/۲	۸۲۷	۵۷/۱	۴۶۲۵	۳۱۹/۲	۱۹۴۰	۱۳۳/۹
کمتر از ۶۰ سال	هر دو	۷۴۵۷	۲۷۳/۴	۱۳۵۱	۴۹/۵	۳۴۳۵	۱۲۵/۹	۲۶۷۲	۹۷/۹
	زنان	۳۱۹۴	۲۳۶/۸	۶۶۴	۴۹/۲	۱۶۶۰	۱۲۳/۱	۸۷۰	۶۴/۵
	مردان	۴۲۶۴	۳۰۹/۱	۶۸۷	۴۹/۸	۱۷۷۴	۱۲۸/۷	۱۸۰۲	۱۳۰/۶
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۵۴۵۶	۳۹۷۴/۲	۲۴۶	۱۷۸/۹	۵۰۱۰	۳۶۴۹/۳	۲۰۰	۱۴۶
	زنان	۲۳۲۸	۳۴۳۴/۲	۱۰۶	۱۵۶/۷	۲۱۵۹	۳۱۸۵/۷	۶۲	۹۱/۹
	مردان	۳۱۲۸	۴۵۰۰/۸	۱۳۹	۲۰۰/۵	۲۸۵۰	۴۱۰۱/۵	۱۳۸	۱۹۸/۸
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۶۱۴	۱۲۴۸/۹	۲۶	۵۳/۶	۵۳۹	۱۰۹۶/۵	۴۹	۹۸/۷
	زنان	۲۵۰	۱۰۱۳/۳	۱۱	۴۵/۵	۲۲۵	۹۱۴/۲	۱۳	۵۳/۶
	مردان	۳۶۴	۱۴۸۵/۳	۱۵	۶۱/۸	۳۱۴	۱۲۷۹/۵	۳۵	۱۴۴
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۶۸۷	۱۹۷۴/۳	۲۹	۸۳/۷	۶۱۸	۱۷۷۸/۴	۳۹	۱۱۲/۱
	زنان	۲۸۵	۱۶۳۱/۶	۱۳	۷۲/۶	۲۶۱	۱۴۹۲/۴	۱۲	۶۶/۷
	مردان	۴۰۱	۲۳۲۱/۱	۱۶	۹۵	۳۵۷	۲۰۶۸	۲۷	۱۵۸/۱
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۶۴۲	۳۲۳۷/۶	۲۶	۱۳۲/۴	۵۸۹	۲۹۶۸/۶	۲۷	۱۳۶/۶
	زنان	۲۵۸	۲۶۵۱/۲	۱۱	۱۱۴/۷	۲۳۹	۲۴۵۲/۷	۸	۸۳/۹
	مردان	۳۸۴	۳۸۰۳/۳	۱۵	۱۴۹/۶	۳۵۰	۳۴۶۶/۲	۱۹	۱۸۷/۴
۷۵ تا ۷۹ سال	هر دو	۷۹۶	۵۵۸۰/۱	۳۳	۲۳۲/۷	۷۳۷	۵۱۶۶/۸	۲۶	۱۸۰/۷
	زنان	۳۱۳	۴۷۳۹/۴	۱۳	۲۰۱/۲	۲۹۲	۴۴۲۲/۱	۸	۱۱۶/۱
	مردان	۴۸۲	۶۳۰۷	۲۰	۲۵۹/۹	۴۴۴	۵۸۱۰/۶	۱۸	۲۳۶/۵
۸۰ سال و بالاتر	هر دو	۲۷۱۸	۱۴۱۱۶/۷	۱۳۱	۶۷۸/۸	۲۵۲۷	۱۳۱۲۶/۱	۶۰	۳۱۱/۷
	زنان	۱۲۲۱	۱۳۱۱۹/۳	۵۸	۶۲۱/۵	۱۱۴۲	۱۲۲۶۶/۴	۲۲	۲۳۱/۴
	مردان	۱۴۹۶	۱۵۰۵۰/۷	۷۳	۷۳۲/۵	۱۳۸۵	۱۳۹۳۱/۲	۳۸	۳۸۷

امید زندگی (سال) در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ در استان

جنسیت	بدو تولد		۶۰ تا ۶۴ سال		۶۵ تا ۶۹ سال		۷۰ تا ۷۴ سال		۷۵ تا ۷۹ سال		۸۰ سال و بالاتر	
	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰
زنان	۶۲/۲	۸۲/۹	۱۴/۲	۲۷/۴	۱۰/۹	۲۳/۴	۸/۶	۲۰	۷/۱	۱۶/۹	۷/۲	۱۴/۶
مردان	۶۱	۷۴/۶	۱۶/۳	۲۳/۱	۱۳/۲	۱۹/۴	۱۱	۱۶/۴	۱۰/۳	۱۳/۷	۱۰/۷	۱۱/۵

روند زمانی تعداد در مقابل میزان استاندارد شده سنی مرگ در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سطح ملی و استان



^۱ در این گزارش تمامی میزان‌ها در ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت گزارش شده‌اند.




میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

علت ^۲	مردان								زنان							
	۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰		۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰	
	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه ^۳	میزان
بیماری‌های قلبی-عروقی	۷	۲۳۰۴/۷	۲۱	۱۹۴۹/۵	۲۸	۲۰۴۱/۴	۲۶	۲۷۳۵/۶	۲۰	۱۸۹۹/۲	۲۸	۱۷۳۳/۸	۲۹	۱۷۲۲/۸	۲۹	۲۲۷۰/۶
سرطان‌ها	۷	۷۶۷/۸	۱۲	۵۹۹/۱	۲۱	۴۵۳/۹	۲۲	۵۷۰/۱	۴	۵۰۴/۵	۱۱	۳۹۹/۸	۲۸	۲۵۵/۱	۲۴	۳۲۰/۳
اختلالات عصبی	۱	۵۴۲/۲	۲	۴۰۴/۸	۶	۲۶۷/۱	۷	۳۲۳/۴	۱	۵۲۹/۶	۴	۴۱۷/۹	۱۹	۲۳۳/۳	۱۷	۲۹۵
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۴	۲۹۸/۲	۱۳	۲۱۳/۳	۱۶	۱۶۴/۶	۱۰	۱۹۹/۸	۱۵	۲۵۵/۲	۱۹	۱۸۴/۸	۲۲	۱۴۵/۵	۱۹	۱۶۸/۲
بیماری‌های مزمن تنفسی	۲	۳۸۱/۷	۲	۳۷۹/۶	۱	۴۵۷/۳	۱	۶۲۰/۸	۲	۲۷۶/۱	۲	۲۸۰/۸	۱	۳۲۵/۷	۱	۳۸۴
بیماری‌های گوارشی	۱	۲۰۱/۶	۱	۱۸۸	۲	۱۶۵/۹	۳	۲۳۷/۲	۱	۱۵۶/۸	۲	۱۴۳/۸	۵	۹۸/۲	۴	۱۵۲/۵
سوانح حمل و نقل	۷	۱۰۸/۷	۱۸	۱۰۴/۳	۱۷	۱۲۱/۶	۱۴	۱۵۵/۷	۶	۴۴/۳	۲۰	۴۱/۶	۲۱	۴۱/۱	۱۷	۴۹/۶
سوانح غیرعمدی	۲	۷۵/۱	۴	۶۸/۹	۸	۷۰/۸	۶	۹۳/۵	۳	۴۸/۳	۷	۴۶	۱۱	۴۲/۸	۹	۵۷/۸

میزان استاندارد شده سنی **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

مشکل سلامتی	مردان								زنان							
	۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰		۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰	
	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه ^۴	میزان
بیماری‌های قلبی-عروقی	۱۶	۳۱۱۱۵/۶	۲۱	۳۱۱۶۹/۵	۱۷	۳۱۰۰۳	۲۰	۳۱۰۲۰/۸	۲۷	۳۱۶۸۵/۸	۲۸	۳۱۰۱۰/۵	۲۶	۳۱۳۳۹/۶	۲۷	۳۱۵۶۹
سرطان‌ها	۲۸	۳۱۳۶/۹	۳۱	۲۳۶۵	۳۱	۱۵۶۲/۴	۳۰	۱۵۰۹/۱	۱۰	۲۴۰۸/۷	۲۲	۱۸۶۷/۶	۳۰	۱۰۸۷/۷	۲۴	۱۱۳۴/۳
اختلالات عصبی	۶	۵۲۱۶۱/۹	۸	۵۲۱۶۲/۸	۶	۵۲۰۳۰/۲	۶	۵۱۳۱۱	۵	۵۸۲۳۲/۶	۴	۵۸۲۳۳/۷	۸	۵۷۶۱۴/۹	۳	۵۷۲۷۸
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۲۱	۴۶۰۵۳/۴	۲۳	۴۰۱۸۶/۳	۲۴	۳۸۶۲۸/۵	۲۱	۳۸۱۳۵/۹	۲۳	۵۶۰۹۶/۴	۲۵	۴۹۰۱۱/۴	۲۵	۴۶۶۵۹	۲۶	۴۶۳۵۷/۶
بیماری‌های مزمن تنفسی	۲	۱۴۸۱۴/۶	۱	۱۵۳۱۱/۹	۱	۱۶۶۰۴/۲	۱	۱۸۰۱۴/۴	۱	۱۷۶۰۸/۳	۱	۱۹۳۸۵/۹	۱	۲۰۰۵۴/۷	۱	۲۰۳۳۸/۹
بیماری‌های گوارشی	۱	۷۱۰۸۵/۴	۱	۷۰۲۲۶/۳	۱	۶۲۱۳۷	۱	۶۱۷۶۸/۸	۲	۵۶۴۱۹/۴	۲	۵۵۴۵۸	۱	۵۹۹۹۶/۵	۱	۶۰۴۳۳/۶
سوانح حمل و نقل	۴	۹۸۵۱/۸	۱۹	۱۱۱۸۶/۸	۱۷	۱۱۶۱۴/۵	۲۱	۱۱۶۴۸/۵	۲	۶۸۰۵	۵	۷۵۷۰/۹	۱۰	۷۲۳۱/۳	۱۷	۷۲۹۲/۶
سوانح غیرعمدی	۶	۳۲۳۰۵/۴	۷	۳۳۶۳۶/۲	۵	۳۲۲۹۱/۵	۶	۳۵۷۱۸/۷	۵	۳۳۲۰۷/۹	۵	۲۳۰۴۹/۲	۵	۲۱۷۵۱/۴	۷	۲۴۱۵۶/۳

میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی و **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سال ۲۰۱۷ در سطح ملی و استان




^۲ علل براساس میزان استاندارد شده سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ و هر دو جنسیت در سطح ملی مرتب شده‌اند.


^۳ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی مرگ به تفکیک علت، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.

^۴ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی شیوع به تفکیک مشکل سلامتی، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.







جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۴۸۹/۸	۱۱۴۵/۶	۱۰۶۰/۲	۱۱۹۷/۲
زنان	۱۲۷۹/۵	۹۹۹/۴	۹۵۳/۶	۱۰۴۰/۴
مردان	۱۶۶۴/۱	۱۲۴۹/۱	۱۱۴۴/۷	۱۳۴۵




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۶۶۰/۳	۴۸۲/۵	۴۰۸/۵	۴۶۵
زنان	۶۰۶/۵	۴۴۲/۷	۳۸۷/۹	۴۲۳/۳
مردان	۷۰۰/۹	۵۰۵/۷	۴۲۰/۶	۵۰۳/۹




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۷۶/۸	۲۲۴/۴	۳۷۴/۷	۴۸۶/۷
زنان	۲۷۱/۸	۲۱۴/۲	۳۸۹/۵	۴۹۴/۱
مردان	۲۸۱/۶	۲۳۱/۶	۳۵۷/۵	۴۷۹/۷



جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۲/۳	۲۴	۳۲/۸	۵۲/۶
زنان	۱۸/۵	۲۱/۹	۲۸/۳	۴۶/۲
مردان	۲۵/۷	۲۵/۶	۳۶/۷	۵۸/۵




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۲۷/۹	۹۹/۶	۱۰۰	۱۱۷/۶
زنان	۱۱۵/۲	۸۹/۲	۹۲/۷	۱۰۴/۹
مردان	۱۳۹/۸	۱۰۷/۴	۱۰۵/۴	۱۲۹/۵




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۶/۹	۱۴/۹	۱۶	۱۷/۳
زنان	۱۰/۱	۹/۱	۱۰/۹	۱۱/۸
مردان	۲۲/۸	۱۹/۴	۲۰/۴	۲۲/۵




Ischemic heart disease
Female Male




Stroke
Female Male




Alzheimer's disease and other dementias
Female Male




Diabetes mellitus type 2
Female Male





Lower respiratory infections
Female Male



Falls
Female Male





وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
آمار و اطلاعات بهداشت





اختلالات افسردگی				اختلالات اضطرابی				جنسیت
۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	
۶۸۵۳/۸	۶۸۰۶/۵	۶۶۰۸/۳	۶۶۸۶/۳	۶۴۳۶/۸	۶۵۵۹	۶۲۳۶/۶	۶۲۶۰/۹	هر دو
۸۲۵۵/۴	۸۲۱۰/۲	۸۱۰۹/۹	۸۱۹۰/۱	۸۲۰۴/۷	۸۳۹۳/۷	۸۲۵۲/۸	۸۲۷۱/۴	زنان
۵۴۸۴/۹	۵۴۸۶/۹	۵۴۸۱/۸	۵۵۷۱/۹	۴۷۱۷/۷	۴۸۴۴	۴۷۲۳	۴۷۵۲/۷	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۷۹۴/۲	۹۶۶۸/۶	۹۷۳۲/۱	۹۴۴۷/۱	هر دو
۸۶۰۲/۹	۹۴۱۹/۶	۹۴۳۱/۹	۹۱۵۴	زنان
۸۹۷۹/۴	۹۸۹۷/۱	۹۹۶۵/۴	۹۶۷۸/۹	مردان



۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۳۷۴/۱	۸۳۲۹/۸	۷۱۶۲/۶	۷۸۲۹/۸	هر دو
۷۰۱۶/۲	۶۳۹۷/۹	۵۳۸۷/۶	۵۸۰۲/۴	زنان
۹۶۸۶/۴	۱۰۱۱۲/۳	۸۵۱۵/۲	۹۴۱۱/۸	مردان







۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۹۵۰۱/۵	۹۵۹۰	۹۴۶۳/۹	۹۴۲۲/۸	هر دو
۱۰۳۶۶/۸	۱۱۰۵۹/۵	۱۰۸۴۵/۸	۱۰۴۵۶/۱	زنان
۸۶۶۸/۶	۸۲۶۶/۸	۸۴۵۳/۴	۸۶۴۴/۸	مردان



۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۶۵۸۲/۸	۵۷۱۲/۹	۵۷۶۳/۱	۶۳۲۹/۸	هر دو
۷۱۳۶/۱	۵۹۹۳/۸	۶۲۵۴/۳	۷۰۴۶/۸	زنان
۶۰۵۱/۴	۵۴۳۸/۵	۵۲۷۴/۹	۵۷۳۸/۸	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۵۴۳۱/۸	۵۵۰۱	۵۶۶۷/۳	۵۷۶۴/۹	هر دو
۵۷۱۹/۲	۵۷۹۶/۱	۵۹۶۱/۱	۶۰۲۸/۷	زنان
۵۱۶۱/۹	۵۲۳۸/۳	۵۴۲۷/۹	۵۵۱۷/۷	مردان





سیمای سلامت سالمندان

استان فارس

میزان مرگ و شیوع بیماری ها



سیمای سلامت سالمندان

استان فارس

(میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها سرطان در کل جمعیت، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (کمتر از ۶۰ سال) ساکن در استان فارس و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس و گروه‌های سنی بیان شده است. به منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی حاوی: اطلاعات مقایسه‌ای با شاخص کل کشور و مقایسه با استان‌های مجاور استان فارس شامل: استان‌های بوشهر، هرمزگان، اصفهان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و یزد نیز تدوین و ترسیم شده است.

آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر این مطلب است که شایع‌ترین علل مرگ در سالمندان ساکن استان فارس (هر دو جنس) براساس میزان در سال ۲۰۱۷، به ترتیب بیماری‌های غیرواگیر، سوانح و حوادث و بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای است. این شاخص در افراد غیر سالمند ساکن استان فارس دارای الگوی مشابه سالمندان است.

روند زمانی تعداد مرگ به علت هر سه دسته اصلی بیماری‌ها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ در حال افزایش است. سالمندان ساکن در استان فارس و در سال ۲۰۱۷ از لحاظ میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای و بیماری‌های غیرواگیر از میانگین کشوری پایین‌تر و به علت سوانح و حوادث از میانگین کشوری بالاتر هستند.

سالمندان ساکن استان فارس، از بین علل مختلف مرگ در بیماری‌های قلبی-عروقی (زنان در سال ۲۰۱۰ و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰)، اختلالات عصبی (زنان در سال ۲۰۱۰ و مردان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰)، بیماری‌های گوارشی (مردان در سال ۲۰۰۰) و سوانح حمل و نقل (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) واجد رتبه‌ی ده و کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند. از نظر شیوع مشکلات سلامتی در سالمندان ساکن استان فارس، این گروه جمعیتی در بیماری‌های قلبی-عروقی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، اختلالات عصبی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) و سوانح حمل و نقل (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) واجد رتبه‌ی ده و کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، سکته، عفونت‌های تنفسی تحتانی و افتادن کاهشی و برای بیماری آلزایمر و دیابت نوع دو افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ برای هیچ کدام از شش علت بررسی شده در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان فارس نسبت به استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر و یا بیشتر نبوده است.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع به علت مشکلات سلامتی در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، افتادن، سکته و بیماری آلزایمر کاهشی و برای اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی و بیماری مزمن انسدادی ریه افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع برای مشکلات سلامتی اختلالات روانی در مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان فارس نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ بیشتر بوده است.




تعداد و میزان^۱ مرگ به تفکیک گروه سنی در سال ۲۰۱۷ در استان

گروه سنی	جنسیت	همه علل		بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای		بیماری‌های غیرواگیر		سوانح و حوادث	
		تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان
همه سنین	هر دو	۲۲۴۰۶	۴۵۱/۶	۱۴۹۳	۳۰/۱	۱۷۶۱۲	۳۵۵	۳۳۰۲	۶۶/۶
	زنان	۹۰۸۰	۳۷۲/۲	۶۱۳	۲۵/۱	۷۶۷۲	۳۱۴/۵	۷۹۴	۳۲/۶
	مردان	۱۳۳۲۷	۵۲۸/۴	۸۷۹	۳۴/۹	۹۹۴۰	۳۹۴/۱	۲۵۰۷	۹۹/۴
کمتر از ۶۰ سال	هر دو	۷۸۷۵	۱۷۵/۹	۱۰۴۶	۲۳/۴	۴۱۳۵	۹۲/۴	۲۶۹۴	۶۰/۲
	زنان	۲۵۵۸	۱۱۶/۶	۴۲۵	۱۹/۴	۱۵۲۷	۶۹/۶	۶۰۶	۲۷/۶
	مردان	۵۳۱۷	۲۳۲/۹	۶۲۱	۲۷/۲	۲۶۰۸	۱۱۴/۲	۲۰۸۸	۹۱/۵
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۴۵۳۱	۲۹۹۷/۸	۴۴۶	۹۲	۱۳۴۷۷	۲۷۸۰/۴	۶۰۸	۱۲۵/۴
	زنان	۶۵۲۱	۲۶۵۵/۵	۱۸۸	۷۶/۴	۶۱۴۵	۲۵۰۲/۴	۱۸۸	۷۶/۷
	مردان	۸۰۱۰	۳۳۴۹/۳	۲۵۸	۱۰۸/۱	۷۳۳۲	۳۰۶۵/۹	۴۱۹	۱۷۵/۳
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۱۵۴۸	۹۱۱/۴	۴۵	۲۶/۴	۱۳۵۳	۷۹۶/۵	۱۵۰	۸۸/۵
	زنان	۵۷۰	۶۵۹/۷	۱۷	۱۹/۲	۵۱۴	۵۹۵/۳	۳۹	۴۵/۲
	مردان	۹۷۸	۱۱۷۱/۷	۲۸	۳۳/۸	۸۳۸	۱۰۰۴/۶	۱۱۱	۱۳۳/۳
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۱۵۷۲	۱۳۰۳/۷	۴۴	۳۶/۳	۱۴۱۵	۱۱۷۳/۵	۱۱۳	۹۴
	زنان	۶۳۸	۱۰۰۵/۸	۱۸	۲۸/۲	۵۸۸	۹۲۷/۳	۳۲	۵۰/۳
	مردان	۹۳۴	۱۶۳۴/۵	۲۶	۴۵/۲	۸۲۷	۱۴۴۶/۸	۸۱	۱۴۲/۵
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۱۴۴۶	۲۰۲۳/۱	۴۰	۵۵/۷	۱۳۲۹	۱۸۶۰/۶	۷۶	۱۰۶/۸
	زنان	۶۶۰	۱۸۰۱/۶	۱۸	۴۷/۸	۶۱۷	۱۶۸۵/۹	۲۵	۶۷/۹
	مردان	۷۸۶	۲۲۵۶/۱	۲۲	۶۴/۱	۷۱۲	۲۰۴۴/۲	۵۱	۱۴۷/۸
۷۵ تا ۷۹ سال	هر دو	۱۸۷۶	۳۸۱۷/۹	۵۲	۱۰۵/۵	۱۷۴۹	۳۵۵۹/۷	۷۵	۱۵۲/۷
	زنان	۸۴۰	۳۴۲۱/۸	۲۲	۸۸/۷	۷۹۵	۳۲۳۵/۴	۲۴	۹۷/۷
	مردان	۱۰۳۶	۴۲۱۳/۷	۳۰	۱۲۲/۳	۹۵۴	۳۸۸۳/۸	۵۱	۲۰۷/۷
۸۰ سال و بالاتر	هر دو	۸۰۹۰	۱۰۹۷۲/۴	۲۶۶	۳۶۰/۸	۷۶۳۱	۱۰۳۵۰/۴	۱۹۳	۲۶۱/۲
	زنان	۳۸۱۳	۱۱۰۲۵/۷	۱۱۴	۳۲۹/۴	۳۶۳۱	۱۰۴۹۷/۹	۶۹	۱۹۸/۴
	مردان	۴۲۷۶	۱۰۹۲۵/۳	۱۵۲	۳۸۸/۵	۴۰۰۰	۱۰۲۲۰/۱	۱۲۴	۳۱۶/۶

امید زندگی (سال) در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ در استان

جنسیت	بدو تولد		۶۰ تا ۶۴ سال		۶۵ تا ۶۹ سال		۷۰ تا ۷۴ سال		۷۵ تا ۷۹ سال		۸۰ سال و بالاتر	
	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰
زنان	۶۹/۹	۷۹/۲	۱۶/۷	۲۳/۵	۱۲/۹	۱۹/۳	۹/۶	۱۵/۴	۷	۱۱/۸	۵/۸	۸/۷
مردان	۶۵/۷	۷۳	۱۵/۸	۲۱/۳	۱۲/۲	۱۷/۶	۹/۱	۱۴/۴	۶/۶	۱۱/۴	۵/۳	۹/۲

روند زمانی تعداد در مقابل میزان استاندارد شده سنی مرگ در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سطح ملی و استان



^۱ در این گزارش تمامی میزان‌ها در ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت گزارش شده‌اند.




میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

علت ^۲	مردان								زنان							
	۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰		۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰	
	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه ^۳	میزان
بیماری‌های قلبی-عروقی	۱۹	۱۹۹۴	۶	۲۳۵۹/۷	۵	۳۰۰۱/۷	۷	۳۴۱۹	۲۳	۱۸۷۸	۱	۲۴۷۳/۶	۱۴	۲۵۰۸/۱	۱۵	۲۹۵۷/۴
سرطان‌ها	۳۱	۴۸۲/۷	۳۰	۴۹۷/۵	۲۲	۴۴۹	۲۷	۵۴۸/۱	۳۱	۲۸۵/۳	۲۹	۳۴۲	۳۱	۲۳۱/۴	۳۰	۲۷۲/۸
اختلالات عصبی	۲۶	۲۸۶/۸	۱۲	۲۷۹/۸	۴	۲۷۲/۸	۹	۳۰۴/۸	۲۷	۳۳۷/۹	۹	۳۷۱/۵	۱۶	۲۶۷/۹	۱۵	۳۰۴/۸
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۲۵	۱۷۸/۶	۲۲	۱۷۵/۲	۱۹	۱۴۷/۹	۲۱	۱۵۳/۷	۲۷	۱۷۱/۵	۲۰	۱۸۴/۵	۲۴	۱۲۴/۸	۲۶	۱۳۰/۳
بیماری‌های مزمن تنفسی	۲۴	۱۵۶/۸	۲۱	۱۸۰	۱۷	۱۹۵	۲۱	۲۳۳/۷	۲۱	۱۱۰/۴	۱۷	۱۴۸/۲	۲۶	۱۱۳/۲	۲۶	۱۲۲/۶
بیماری‌های گوارشی	۲۱	۹۸/۱	۱۴	۱۰۶/۶	۹	۱۱۶/۹	۱۲	۱۶۱/۸	۲۰	۷۷	۱۱	۹۸/۱	۱۶	۷۷	۱۴	۱۰۶/۱
سوانح حمل و نقل	۴	۱۱۶/۲	۲	۱۴۷/۱	۳	۱۸۴/۵	۳	۲۰۵/۷	۹	۴۳/۶	۱	۶۶	۵	۵۷/۹	۷	۶۲/۹
سوانح غیرعمدی	۲۶	۴۸/۶	۱۹	۵۵/۸	۱۵	۶۶/۲	۱۶	۸۰/۸	۲۳	۳۲/۷	۱۲	۴۲/۵	۲۵	۳۵/۶	۲۴	۴۵/۷

میزان استاندارد شده سنی **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

مشکل سلامتی	مردان								زنان							
	۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰		۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰	
	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه ^۴	میزان
بیماری‌های قلبی-عروقی	۷	۳۱۷۹۲/۸	۸	۳۲۳۴۱/۵	۸	۳۲۰۱۱/۷	۹	۳۲۰۹۶/۹	۴	۳۴۰۹۴/۹	۱	۳۳۸۱۱/۵	۲	۳۳۷۳۲/۵	۴	۳۴۰۴۹/۹
سرطان‌ها	۱۹	۳۴۴۱/۳	۱۴	۳۰۴۱/۴	۱۶	۲۰۲۴/۵	۱۸	۱۸۳۴/۱	۲۸	۱۹۲۸/۱	۱۵	۲۰۲۷/۶	۲۴	۱۱۷۲/۴	۲۷	۱۱۱۰/۷
اختلالات عصبی	۲	۵۳۵۴۸/۷	۲	۵۳۵۶۳/۵	۲	۵۳۴۸۹	۲	۵۲۷۷۸/۸	۱	۶۰۹۵۹/۴	۱	۶۰۹۵۴/۵	۱	۶۰۶۱۸/۸	۱	۵۹۷۱۷/۴
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۳۱	۴۲۶۹۶/۷	۲۹	۳۹۳۲۲/۳	۱۹	۳۹۳۴۰/۱	۱۸	۳۸۹۴۴/۵	۲۹	۵۵۰۵۲/۷	۱۲	۵۱۷۸۳/۵	۱۶	۴۸۸۷۳/۷	۱۷	۴۸۵۷۵/۲
بیماری‌های مزمن تنفسی	۲۱	۱۲۴۹۵/۱	۲۲	۱۱۹۲۳/۸	۱۹	۱۲۱۷۴/۲	۲۰	۱۳۳۴۱/۹	۲۳	۱۴۷۶۸/۲	۲۰	۱۵۴۸۴	۲۴	۱۴۵۵۱/۹	۲۴	۱۴۸۵۲/۹
بیماری‌های گوارشی	۳۱	۶۰۷۶۱/۹	۳۱	۵۷۸۸۴/۷	۳۱	۵۴۷۷۰/۹	۳۱	۵۲۷۸۵/۲	۳۱	۵۰۹۶۲/۹	۳۱	۴۹۱۰۰/۵	۳۱	۴۵۵۳۰/۲	۳۱	۴۴۶۴۱/۴
سوانح حمل و نقل	۱	۱۰۸۹۵	۱	۱۳۲۹۸/۱	۱	۱۳۷۵۲/۹	۱	۱۳۹۲۹/۶	۱	۷۰۰۶/۳	۱	۸۶۰۳/۴	۲	۸۰۸۰/۴	۴	۸۴۷۰/۶
سوانح غیرعمدی	۲۹	۲۸۵۱۳	۲۶	۳۰۰۵۷/۶	۲۶	۲۷۱۰۳/۵	۲۶	۲۹۹۰۵/۴	۲۸	۲۱۴۰۵/۵	۱۳	۲۱۳۴۶/۸	۲۲	۱۹۱۶۷/۴	۲۵	۲۱۶۱۳/۷

میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی و **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سال ۲۰۱۷ در سطح ملی و استان




^۲ علل براساس میزان استاندارد شده سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ و هر دو جنسیت در سطح ملی مرتب شده‌اند.


^۳ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی مرگ به تفکیک علت، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.

^۴ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی شیوع به تفکیک مشکل سلامتی، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.







جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۲۲۲/۶	۱۹۶۸	۱۴۶۰/۲	۱۱۴۵/۶
زنان	۱۹۹۸/۳	۱۷۴۲/۷	۱۴۴۰/۸	۱۰۸۱/۶
مردان	۲۴۶۸/۴	۲۱۹۸/۲	۱۴۷۳/۲	۱۲۱۵/۸




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۷۵۲/۹	۶۱۲/۶	۵۴۳/۷	۴۵۱/۲
زنان	۷۴۴/۴	۵۹۰/۴	۵۷۵/۳	۴۵۰/۷
مردان	۷۵۹/۳	۶۳۴/۲	۵۱۱	۴۵۳/۴




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۷۲/۶	۲۴۱/۳	۲۸۸/۶	۲۷۸/۱
زنان	۲۸۱/۲	۲۴۶/۹	۳۴۱/۳	۳۱۲/۶
مردان	۲۶۱	۲۳۲/۵	۲۳۷/۱	۲۴۶



جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۴۴/۴	۵۰/۱	۸۱/۶	۸۰/۵
زنان	۴۳/۴	۵۰	۸۹	۸۵
مردان	۴۵/۸	۵۰/۶	۷۴/۳	۷۶/۱











جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۹۶/۴	۸۴/۹	۹۴/۴	۷۶/۸
زنان	۷۷/۱	۶۵/۵	۸۷/۴	۶۷/۶
مردان	۱۲۱/۸	۱۰۷/۹	۱۰۰/۵	۸۵/۷



جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۰/۶	۱۹/۱	۲۱/۲	۱۸/۵
زنان	۱۲/۵	۱۱/۳	۱۷/۲	۱۴/۱
مردان	۲۹/۹	۲۷/۲	۲۵/۲	۲۲/۸











اختلالات افسردگی				اختلالات اضطرابی				جنسیت
۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	
۶۴۷۲/۷	۶۴۷۱/۸	۶۳۵۴/۱	۶۴۱۳/۵	۶۴۸۶/۶	۶۶۴۱/۱	۶۳۸۹/۶	۶۴۷۶/۶	هر دو
۷۲۶۴/۹	۷۲۳۲/۷	۷۱۱۶/۴	۷۱۶۹	۸۲۰۴/۷	۸۳۹۳/۷	۸۲۵۲/۸	۸۲۷۱/۴	زنان
۵۶۴۹/۹	۵۶۸۰/۹	۵۶۷۸/۷	۵۷۱۰	۴۷۱۷/۷	۴۸۴۴	۴۷۲۳	۴۷۵۲/۷	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۱۰۳۵۵	۱۱۱۹۶/۳	۱۱۳۲۲/۴	۱۱۰۹۷/۶	هر دو
۱۰۱۱۴	۱۰۸۵۱/۲	۱۰۸۵۶/۷	۱۰۶۵۹/۶	زنان
۱۰۵۹۸/۳	۱۱۵۳۴/۹	۱۱۷۵۰/۱	۱۱۵۵۴/۸	مردان



۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۷۲۰/۳	۹۳۱۹/۶	۸۱۸۲/۵	۹۱۳۶/۷	هر دو
۷۲۹۲/۶	۷۱۷۵/۴	۶۱۰۵/۸	۶۸۷۷	زنان
۱۰۱۸۱/۲	۱۱۴۸۶/۷	۱۰۰۷۶/۵	۱۱۳۸۲/۶	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۷۸۱۷/۴	۷۸۸۱	۷۰۸۷/۹	۷۰۳۵/۳	هر دو
۸۵۴۰/۳	۹۰۹۸/۱	۸۰۰۱/۱	۷۶۲۶/۷	زنان
۷۰۸۵/۶	۶۶۹۳/۳	۶۲۸۷/۷	۶۴۶۶/۸	مردان




۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۷۴۲۷/۷	۷۲۰۰/۶	۶۸۵۹/۱	۷۴۸۱	هر دو
۸۱۳۳/۶	۷۵۹۴/۲	۷۳۵۰/۶	۸۲۴۹/۴	زنان
۶۷۲۳/۵	۶۷۸۷/۷	۶۴۰۲/۲	۶۶۵۸/۸	مردان


۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۵۲۹۴/۲	۵۳۴۸/۳	۵۵۰۹/۷	۵۵۸۶/۶	هر دو
۵۵۵۷/۵	۵۶۱۳/۸	۵۷۵۵/۹	۵۷۸۶/۲	زنان
۵۰۳۹/۲	۵۰۹۷/۸	۵۲۶۲/۸	۵۳۴۹/۹	مردان




Mental disorders




Ischemic heart disease




Falls




Chronic obstructive pulmonary disease



Stroke



Alzheimer's disease and other dementias



سیمای سلامت سالمندان

استان قزوین

میزان مرگ و شیوع بیماری ها



سیمای سلامت سالمندان

استان قزوین

(میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها در کل جمعیت، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (کمتر از ۶۰ سال) ساکن در استان قزوین و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس و گروه‌های سنی بیان شده است. به منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی حاوی: اطلاعات مقایسه‌ای با شاخص کل کشور و مقایسه با استان‌های مجاور استان قزوین شامل: استان‌های البرز، گیلان، همدان، مرکزی، مازندران و زنجان نیز تدوین و ترسیم شده است.

آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر این مطلب است که شایع‌ترین علل مرگ در سالمندان ساکن استان قزوین (هر دو جنس) براساس میزان در سال ۲۰۱۷، به ترتیب بیماری‌های غیرواگیر، سوانح و حوادث و بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای است. این شاخص در افراد غیر سالمند ساکن استان قزوین دارای الگویی مشابه با سالمندان است.

روند زمانی تعداد مرگ به علت هر سه دسته اصلی بیماری‌ها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ در حال افزایش است. سالمندان ساکن در استان قزوین و در سال ۲۰۱۷ از لحاظ میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای و غیرواگیر از میانگین کشوری پایین‌تر و به علت سوانح و حوادث بالاتر بوده‌اند.

سالمندان ساکن استان قزوین، از بین علل مختلف مرگ در بیماری‌های قلبی-عروقی (زنان در سال ۱۹۹۰)، سرطان‌ها (مردان در سال ۲۰۱۰)، بیماری‌های گوارشی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، سوانح حمل و نقل (زنان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، سوانح حمل و نقل (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) و سوانح غیر عمدی (زنان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷ و مردان در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) یکی از ده استان دارای بالاترین شیوع در کل کشور بوده‌اند.

از نظر شیوع مشکلات سلامتی در سالمندان ساکن استان قزوین، این گروه جمعیتی در سرطان‌ها (زنان در سال ۱۹۹۰ و مردان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰)، بیماری‌های گوارشی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، سوانح حمل و نقل (زنان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، سوانح حمل و نقل (زنان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰) یکی از ده استان دارای بالاترین شیوع در کل کشور بوده‌اند.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، سکته، عفونت‌های تنفسی تحتانی و افتادن کاهشی و برای بیماری آلزایمر و دیابت نوع دو افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت افتادن در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان قزوین نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ بیشتر بوده است.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع به علت مشکلات سلامتی در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، افتادن و بیماری آلزایمر کاهشی و برای اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی، سکته و بیماری مزمن انسدادی ریه افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع به علت بیماری مزمن انسدادی ریه و بیماری آلزایمر در مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان قزوین در سال ۲۰۱۷ نسبت به تمام استان‌های مجاور بیشتر بوده است. میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع برای افتادن در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان قزوین در سال ۲۰۱۷ نسبت به تمام استان‌های مجاور بیشتر بوده است. میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع برای سکته در مردان و زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان قزوین در سال ۲۰۱۷ نسبت به تمام استان‌های مجاور کمتر بوده است.




تعداد و میزان^۱ مرگ به تفکیک گروه سنی در سال ۲۰۱۷ در استان

گروه سنی	جنسیت	همه علل		بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای		بیماری‌های غیرواگیر		سوانح و حوادث	
		تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان
همه سنین	هر دو	۵۷۱۰	۴۳۶/۷	۳۱۵	۲۴/۱	۴۷۲۱	۳۶۱	۶۷۵	۵۱/۶
	زنان	۲۴۱۰	۳۷۷	۱۳۳	۲۰/۸	۲۱۱۱	۳۳۰/۲	۱۶۶	۲۵/۹
	مردان	۳۳۰۰	۴۹۳/۷	۱۸۲	۲۷/۲	۲۶۱۰	۳۹۰/۴	۵۰۹	۷۶/۱
کمتر از ۶۰ سال	هر دو	۱۷۸۰	۱۴۹/۸	۲۰۷	۱۷/۴	۱۰۴۸	۸۸/۲	۵۲۴	۴۴/۱
	زنان	۵۷۶	۹۹/۶	۸۶	۱۴/۹	۳۷۸	۶۵/۴	۱۱۱	۱۹/۳
	مردان	۱۲۰۴	۱۹۷/۳	۱۲۱	۱۹/۸	۶۷۰	۱۰۹/۸	۴۱۳	۶۷/۷
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۳۹۳۱	۳۲۹۱/۷	۱۰۸	۹۰/۲	۳۶۷۲	۳۰۷۵/۳	۱۵۱	۱۲۶/۲
	زنان	۱۸۳۵	۲۹۹۲/۹	۴۷	۷۶/۷	۱۷۳۳	۲۸۲۷/۲	۵۵	۸۹
	مردان	۲۰۹۶	۳۶۰۶/۸	۶۱	۱۰۴/۵	۱۹۳۹	۳۳۳۷	۹۶	۱۶۵/۳
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۳۸۸	۹۷۸/۵	۱۰	۲۴/۳	۳۴۷	۸۷۶/۲	۳۱	۷۸/۱
	زنان	۱۵۲	۷۴۷	۴	۱۸/۴	۱۳۹	۶۸۴/۵	۹	۴۴/۱
	مردان	۲۳۶	۱۲۲۲/۲	۶	۳۰/۴	۲۰۸	۱۰۷۷/۹	۲۲	۱۱۳/۹
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۴۰۶	۱۴۹۵	۱۰	۳۵/۹	۳۷۱	۱۳۶۷/۴	۲۵	۹۱/۷
	زنان	۱۷۲	۱۱۸۲/۲	۴	۲۷/۶	۱۶۰	۱۰۹۸/۵	۸	۵۶/۱
	مردان	۲۳۴	۱۸۵۶	۶	۴۵/۴	۲۱۲	۱۶۷۷/۸	۱۷	۱۳۲/۷
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۴۹۰	۲۴۵۵/۳	۱۲	۵۹/۵	۴۵۵	۲۲۸۲/۹	۲۳	۱۱۲/۹
	زنان	۲۲۸	۲۲۱۰/۹	۵	۵۱/۳	۲۱۴	۲۰۷۹/۵	۸	۸۰
	مردان	۲۶۲	۲۷۱۶/۴	۷	۶۸/۳	۲۴۱	۲۵۰۰/۱	۱۴	۱۴۸/۱
۷۵ تا ۷۹ سال	هر دو	۶۳۴	۴۳۲۸/۶	۱۶	۱۰۸/۲	۵۹۵	۴۰۶۵/۸	۲۳	۱۵۴/۶
	زنان	۲۹۶	۴۰۵۸/۶	۷	۹۶/۱	۲۸۱	۳۸۴۸/۸	۸	۱۱۳/۷
	مردان	۳۳۷	۴۵۹۷/۴	۹	۱۲۰/۲	۳۱۴	۴۲۸۱/۹	۱۴	۱۹۵/۳
۸۰ سال و بالاتر	هر دو	۲۰۱۴	۱۱۱۴۶/۶	۶۱	۳۳۵/۸	۱۹۰۴	۱۰۵۳۵/۸	۵۰	۲۷۴/۹
	زنان	۹۸۷	۱۱۱۷۲/۲	۲۷	۳۰۴/۹	۹۳۹	۱۰۶۳۰/۶	۲۱	۲۳۶/۷
	مردان	۱۰۲۷	۱۱۱۲۲	۳۴	۳۶۵/۴	۹۶۵	۱۰۴۴۵/۱	۲۹	۳۱۱/۵

امید زندگی (سال) در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ در استان

جنسیت	بدو تولد		۶۰ تا ۶۴ سال		۶۵ تا ۶۹ سال		۷۰ تا ۷۴ سال		۷۵ تا ۷۹ سال		۸۰ سال و بالاتر	
	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰
زنان	۶۵/۶	۸۰/۷	۲۴/۱	۱۶/۵	۱۲/۶	۱۹/۹	۹/۷	۱۶	۶/۷	۱۲/۷	۴/۶	۱۰/۱
مردان	۶۱/۸	۷۶/۶	۲۲/۷	۱۵/۶	۱۲/۳	۱۸/۹	۹/۵	۱۵/۴	۶/۹	۱۲/۳	۵	۱۰/۳

روند زمانی تعداد در مقابل میزان استاندارد شده سنی مرگ در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سطح ملی و استان



^۱ در این گزارش تمامی میزان‌ها در ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت گزارش شده‌اند.




میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

علت ^۲	مردان								زنان							
	۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰		۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰	
	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه ^۳	میزان
بیماری‌های قلبی-عروقی	۲۱	۱۹۶۴/۱	۲۴	۱۹۳۷/۲	۲۵	۲۱۲۱/۷	۱۴	۳۰۳۵/۲	۱۹	۱۹۲۹/۲	۲۲	۱۹۴۴/۲	۲۳	۲۲۴۳/۸	۹	۳۱۴۴/۵
سرطان‌ها	۱۶	۶۴۵/۶	۱۰	۶۰۶/۱	۱۶	۴۹۲/۵	۱۲	۶۷۴/۳	۱۹	۳۸۴/۱	۱۲	۳۹۹/۳	۱۷	۳۱۴/۴	۱۲	۴۰۲/۸
اختلالات عصبی	۲۰	۳۰۹/۳	۲۳	۲۳۶/۳	۲۴	۱۸۹/۱	۱۳	۲۸۰/۲	۱۸	۳۶۲/۶	۲۲	۳۲۳/۱	۲۳	۲۲۰/۷	۱۶	۲۹۵/۳
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۲۴	۱۹۸/۶	۲۱	۱۷۵/۶	۲۶	۱۱۹/۵	۲۲	۱۵۳/۱	۱۷	۲۲۷/۷	۱۵	۱۹۸/۶	۲۰	۱۵۳/۸	۱۶	۱۸۷/۸
بیماری‌های مزمن تنفسی	۱۵	۱۹۵/۴	۱۷	۲۰۲/۷	۲۱	۱۸۴/۳	۱۵	۲۸۳	۱۳	۱۳۸/۳	۱۵	۱۵۴/۸	۱۶	۱۵۵/۶	۱۱	۲۰۵/۱
بیماری‌های گوارشی	۲	۱۷۱/۱	۲	۱۸۱	۱	۱۸۱/۲	۱	۳۲۷/۴	۲	۱۵۲/۳	۱	۱۷۴/۷	۲	۱۳۲/۳	۲	۲۱۲/۷
سوانح حمل و نقل	۹	۹۹/۳	۹	۱۲۱/۷	۸	۱۶۲/۵	۴	۱۹۹/۷	۷	۴۳/۹	۶	۵۲/۷	۳	۵۸/۹	۴	۷۱/۸
سوانح غیرعمدی	۹	۵۸/۲	۹	۶۰/۲	۱۹	۶۰/۶	۱۸	۷۹/۱	۴	۴۷/۲	۳	۵۱/۹	۵	۴۹/۵	۶	۶۱/۷

میزان استاندارد شده سنی **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

مشکل سلامتی	مردان								زنان							
	۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰		۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰	
	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه ^۴	میزان
بیماری‌های قلبی-عروقی	۱۹	۳۱۰۰۵/۹	۲۰	۳۱۱۸۰/۸	۲۵	۳۰۵۹۵/۳	۲۸	۳۰۲۵۷/۳	۲۵	۳۱۷۴۲	۲۴	۳۱۲۸۵/۵	۲۸	۳۱۰۳۵	۳۱	۳۱۰۷۱/۹
سرطان‌ها	۱۵	۳۶۰۰/۹	۱۲	۳۰۷۰/۵	۹	۲۲۴۹/۹	۴	۲۲۱۸/۳	۲۱	۲۱۵۸/۱	۱۲	۲۰۶۶/۱	۱۱	۱۴۲۵/۲	۶	۱۴۱۴/۱
اختلالات عصبی	۱۳	۵۲۱۴۲/۹	۱۲	۵۲۱۵۳	۱۶	۵۱۹۹۰/۳	۲۱	۵۱۲۶۵/۴	۱۷	۵۸۲۱۳/۸	۱۹	۵۸۲۰۸/۷	۱۷	۵۷۵۹۳/۶	۲۶	۵۷۲۳۲/۷
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۲۳	۴۵۷۴۱/۳	۲۲	۴۰۶۲۴/۸	۲۳	۳۸۷۴۰/۶	۲۰	۳۸۳۲۶/۵	۲۰	۵۷۰۶۷/۸	۲۱	۵۰۲۹۷/۸	۲۰	۴۷۹۶۱/۷	۱۸	۴۸۱۷۶/۴
بیماری‌های مزمن تنفسی	۱۵	۱۲۸۲۸/۱	۱۷	۱۲۶۳۹/۴	۲۰	۱۲۰۱۳/۱	۲۷	۱۲۲۹۱/۳	۱۳	۱۵۳۸۷/۶	۱۴	۱۶۳۱۰	۱۵	۱۵۴۲۳	۲۳	۱۴۹۸۴/۸
بیماری‌های گوارشی	۳	۶۷۰۱۷	۴	۶۳۸۰۹/۵	۱۰	۶۰۰۲۴/۶	۱۰	۵۷۹۹۹/۶	۴	۵۳۷۶۱/۳	۴	۵۱۹۶۷/۹	۷	۴۸۲۹۰/۳	۷	۴۷۱۱۷/۲
سوانح حمل و نقل	۱۴	۹۵۰۷/۷	۷	۱۱۸۹۶	۸	۱۲۳۶۹/۹	۱۴	۱۲۱۱۸/۵	۱۶	۶۰۹۵/۵	۸	۷۴۹۴/۹	۵	۷۶۰۳/۷	۷	۷۹۹۱/۹
سوانح غیرعمدی	۱۶	۲۹۶۵۸/۲	۲۲	۳۰۹۵۴/۳	۲۷	۲۶۸۰۶/۲	۲۷	۲۹۴۸۴	۸	۲۲۳۲۶/۹	۱۲	۲۱۵۷۳/۱	۱۸	۱۹۶۱۰/۳	۲۱	۲۲۱۶۲/۳

میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی و **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سال ۲۰۱۷ در سطح ملی و استان




^۲ علل براساس میزان استاندارد شده سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ و هر دو جنسیت در سطح ملی مرتب شده‌اند.


^۳ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی مرگ به تفکیک علت، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.

^۴ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی شیوع به تفکیک مشکل سلامتی، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.







جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۹۲۷/۳	۱۴۰۱/۹	۱۰۹۶/۷	۱۱۲۵/۱
زنان	۱۸۶۸/۷	۱۳۷۷/۴	۱۰۴۶/۹	۱۰۷۱/۵
مردان	۲۰۱۰/۷	۱۴۲۸/۳	۱۱۵۸/۶	۱۱۸۸/۲




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۸۰۱/۱	۵۳۴/۱	۵۱۸/۳	۵۱۱
زنان	۸۷۱/۷	۵۹۳/۵	۵۴۳/۱	۵۳۰/۴
مردان	۷۳۲/۶	۴۸۵/۴	۵۰۱	۴۹۴/۷




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۵۴/۷	۱۷۷/۷	۲۴۲/۱	۲۹۷/۳
زنان	۲۶۸/۳	۱۹۹/۴	۲۹۴/۲	۳۳۳
مردان	۲۴۰/۱	۱۵۸/۵	۱۹۶/۳	۲۶۳/۹



جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۳۹/۱	۳۷/۶	۵۷	۷۷/۹
زنان	۴۵/۳	۴۵/۹	۶۴/۹	۹۱/۹
مردان	۳۳/۱	۳۰/۶	۴۹/۸	۶۳/۹




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۸۷/۶	۶۳/۲	۷۰/۲	۷۲/۴
زنان	۸۰/۷	۵۸	۶۲/۸	۶۲/۹
مردان	۹۷/۷	۶۸	۷۷/۵	۸۱/۹




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۳۱/۷	۲۸/۱	۳۰/۶	۲۹/۳
زنان	۲۹/۵	۲۶/۹	۳۰/۳	۲۸/۳
مردان	۳۳	۲۹/۲	۳۱/۶	۳۰/۷




Ischemic heart disease




Stroke




Alzheimer's disease and other dementias




Diabetes mellitus type 2





Lower respiratory infections





Falls







اختلالات افسردگی				اختلالات اضطرابی				جنسیت
۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	
۶۳۴۳/۶	۶۲۱۹/۲	۶۰۵۴	۶۱۳۷/۲	۶۵۰۹/۹	۶۶۲۹/۶	۶۳۶۳/۴	۶۴۴۴/۳	هر دو
۷۳۸۶/۹	۷۲۸۱/۳	۷۱۳۷/۴	۷۱۷۸/۳	۸۲۰۴/۷	۸۳۹۳/۷	۸۲۵۲/۸	۸۲۷۱/۴	زنان
۵۲۳۴/۶	۵۱۳۶	۵۱۱۱/۳	۵۱۹۰/۲	۴۷۱۷/۷	۴۸۴۴	۴۷۲۳	۴۷۵۲/۷	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۱۰۴۴۷/۹	۱۱۱۳۸/۱	۱۱۰۰۹/۳	۱۰۶۶۶/۷	هر دو
۱۰۲۰۶/۷	۱۰۸۱۵/۱	۱۰۶۶۱/۶	۱۰۳۷۰/۸	زنان
۱۰۶۹۸/۴	۱۱۴۵۲/۷	۱۱۳۱۰/۹	۱۰۹۵۴/۶	مردان



۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۹۲۳۲/۶	۱۰۱۴۷	۸۹۲۹/۷	۹۸۳۶/۶	هر دو
۸۰۱۱/۱	۸۴۶۲/۷	۷۷۱۷/۴	۸۵۲۹/۱	زنان
۱۰۵۲۵/۲	۱۱۸۴۶/۲	۹۹۷۶/۵	۱۱۰۳۹	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۱۱۱/۵	۸۰۱۱/۳	۷۰۴۵/۳	۶۵۶۱/۷	هر دو
۸۷۸۱/۸	۹۱۰۸/۳	۸۰۹۲/۶	۷۳۵۵/۸	زنان
۷۴۰۸/۷	۶۹۳۴/۸	۶۱۵۷	۵۸۲۸/۸	مردان




۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۶۶۲۴/۲	۶۰۱۹/۳	۵۷۲۲	۶۱۷۴/۱	هر دو
۷۳۰۴/۸	۶۵۸۸	۶۴۳۲/۴	۷۱۵۳/۳	زنان
۵۹۲۴/۹	۵۴۷۳/۶	۵۱۱۲/۷	۵۲۱۶/۴	مردان


۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۵۳۲۴/۹	۵۳۶۰/۳	۵۵۱۰/۶	۵۶۰۸/۹	هر دو
۵۵۶۹/۴	۵۶۲۱/۳	۵۷۶۷/۷	۵۸۱۲/۵	زنان
۵۰۸۰/۴	۵۱۲۱/۲	۵۲۸۸/۹	۵۳۸۰/۷	مردان




Mental disorders




Ischemic heart disease




Falls




Chronic obstructive pulmonary disease



Stroke



Alzheimer's disease and other dementias



سیمای سلامت سالمندان

استان قم

میزان مرگ و شیوع بیماری ها



سیمای سلامت سالمندان

استان قم

(میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها در کل جمعیت، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (کمتر از ۶۰ سال) ساکن در استان قم و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس و گروه‌های سنی بیان شده است. به منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی حاوی: اطلاعات مقایسه‌ای با شاخص کل کشور و مقایسه با استان‌های مجاور استان قم شامل: استان‌های اصفهان، مرکزی، سمنان و تهران نیز تدوین و ترسیم شده است.

آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر این مطلب است که شایع‌ترین علل مرگ در سالمندان ساکن استان قم (هر دو جنس) براساس میزان در سال ۲۰۱۷، به ترتیب بیماری‌های غیرواگیر، بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای و سوانح و حوادث است. این شاخص در افراد غیر سالمند ساکن استان قم به ترتیب بیماری‌های غیرواگیر، سوانح و حوادث و بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای است و دارای الگوی متفاوت با سالمندان است.

روند زمانی تعداد مرگ به علت هر سه دسته اصلی بیماری‌ها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ در حال افزایش است. سالمندان ساکن در استان قم و در سال ۲۰۱۷ از لحاظ میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای و بیماری‌های غیرواگیر از میانگین کشوری بالاتر و به علت سوانح و حوادث از میانگین کشوری پایین‌تر هستند.

سالمندان ساکن استان قم، از بین علل مختلف مرگ در بیماری‌های قلبی-عروقی (زنان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، سرطان‌ها (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، اختلالات عصبی (زنان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷ و مردان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰)، دیابت و بیماری‌های کلیوی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، بیماری‌های مزمن تنفسی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ و زنان در سال ۲۰۱۷)، بیماری‌های گوارشی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ و زنان در سال ۲۰۱۷) و سوانح غیر عمدی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) واجد رتبه‌ی ده و یا کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

از نظر شیوع مشکلات سلامتی در سالمندان ساکن استان قم، این گروه جمعیتی در سرطان‌ها (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، اختلالات عصبی (زنان و مردان در سال‌های ۲۰۱۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۷)، دیابت و مشکلات کلیوی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، بیماری‌های مزمن تنفسی (زنان و مردان در سال‌های ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷ و زنان در سال ۱۹۹۰)، بیماری‌های گوارشی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ و زنان در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) و سوانح غیر عمدی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) یکی از ده استان دارای بالاترین شیوع در کل کشور بوده‌اند.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، سکته، بیماری آلزایمر، عفونت‌های تنفسی تحتانی و افتادن کاهشی و برای دیابت نوع دو افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری ایسکمیک قلب و عفونت‌های تنفسی تحتانی در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان قم، نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ بیشتر بوده است. در زنان سالمند استان قم میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت سکته و بیماری آلزایمر نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ بیشتر و به علت افتادن کمتر بوده است.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع به علت مشکلات سلامتی در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری اختلالات اضطرابی، افتادن، سکته و بیماری آلزایمر کاهشی و برای اختلالات افسردگی، بیماری ایسکمیک قلب و بیماری مزمن انسدادی ریه افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع برای اختلالات روانی و افتادن در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان قم در سال ۲۰۱۷ نسبت به تمام استان‌های مجاور کمتر و به علت بیماری مزمن انسدادی ریه و بیماری آلزایمر بیشتر بوده است.




تعداد و میزان^۱ مرگ به تفکیک گروه سنی در سال ۲۰۱۷ در استان

گروه سنی	جنسیت	همه علل		بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای		بیماری‌های غیرواگیر		سوانح و حوادث	
		تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان
همه سنین	هر دو	۵۳۵۴	۴۰/۲	۴۰۵	۳۰/۳	۴۴۱۵	۳۳۰/۸	۵۳۵	۴۰/۱
	زنان	۳۱۹۵	۳۳۵/۸	۱۶۹	۲۵/۹	۱۹۱۹	۲۹۳/۶	۱۰۷	۱۶/۴
	مردان	۳۱۵۹	۴۶۴	۲۳۵	۳۴/۵	۲۴۹۶	۳۶۶/۵	۴۲۸	۶۲/۹
کمتر از ۶۰ سال	هر دو	۱۷۵۹	۱۴۳/۲	۲۴۷	۲۰/۱	۱۰۸۳	۸۸/۲	۴۲۹	۳۴/۹
	زنان	۵۴۵	۹۰/۶	۹۹	۱۶/۴	۳۷۴	۶۲/۲	۷۲	۱۲
	مردان	۱۲۱۴	۱۹۳/۶	۱۴۸	۲۳/۷	۷۰۹	۱۱۳/۱	۳۵۷	۵۶/۹
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۳۵۹۵	۳۳۹۱/۳	۱۵۸	۱۴۸/۶	۳۳۳۲	۳۱۴۲/۵	۱۰۶	۱۰۰/۳
	زنان	۱۶۵۰	۳۱۷۶	۷۱	۱۳۵/۹	۱۵۴۴	۲۹۷۲/۸	۳۵	۶۷/۲
	مردان	۱۹۴۵	۳۵۹۸/۳	۸۷	۱۶۰/۸	۱۷۸۷	۳۳۰۵/۵	۷۱	۱۳۲
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۴۳۴	۱۱۶۰/۴	۱۸	۴۹/۱	۳۹۱	۱۰۴۶/۶	۲۴	۶۴/۷
	زنان	۱۵۹	۸۷۰/۱	۷	۳۷/۹	۱۴۶	۷۹۸/۳	۶	۳۳/۹
	مردان	۲۷۴	۱۴۳۹/۵	۱۱	۵۹/۸	۲۴۵	۱۲۸۵/۳	۱۸	۹۴/۴
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۴۰۲	۱۵۹۶/۲	۱۶	۶۳/۱	۳۶۸	۱۴۶۲/۴	۱۸	۷۰/۷
	زنان	۱۶۸	۱۳۰/۳	۷	۵۴/۶	۱۵۵	۱۲۰۶/۹	۵	۴۱/۵
	مردان	۲۳۴	۱۹۰۲/۷	۹	۷۱/۹	۲۱۳	۱۷۲۹/۵	۱۲	۱۰۱/۳
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۴۵۰	۲۶۷۲/۵	۱۸	۱۰۵/۵	۴۱۷	۲۴۷۴/۸	۱۶	۹۲/۱
	زنان	۲۱۷	۲۵۸۱/۲	۹	۱۰۲	۲۰۳	۲۴۱۵/۲	۵	۶۴
	مردان	۲۳۳	۲۷۶۳/۵	۹	۱۰۹/۱	۲۱۴	۲۵۳۴/۳	۱۰	۱۲۰/۱
۷۵ تا ۷۹ سال	هر دو	۵۴۳	۴۷۰۸/۷	۲۲	۱۹۳/۸	۵۰۶	۴۳۹۰/۲	۱۴	۱۲۴/۶
	زنان	۲۶۱	۴۶۱۰/۵	۱۰	۱۸۴/۹	۲۴۶	۴۳۳۴/۸	۵	۹۰/۹
	مردان	۲۸۲	۴۸۰۳/۵	۱۲	۲۰۲/۵	۲۶۱	۴۴۴۳/۸	۹	۱۵۷/۳
۸۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۷۶۶	۱۱۷۳۳	۸۳	۵۵۲/۵	۱۶۴۹	۱۰۹۵۲/۳	۳۴	۲۲۸/۳
	زنان	۸۴۴	۱۲۶۴۸/۵	۳۸	۵۶۲/۹	۷۹۴	۱۱۸۹۳/۴	۱۳	۱۹۲/۲
	مردان	۹۲۲	۱۱۰۰۳/۳	۴۶	۵۴۴/۲	۸۵۵	۱۰۲۰۲/۱	۲۲	۲۵۷

امید زندگی (سال) در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ در استان

جنسیت	بدو تولد		۶۰ تا ۶۴ سال		۶۵ تا ۶۹ سال		۷۰ تا ۷۴ سال		۷۵ تا ۷۹ سال		۸۰ سال و بالاتر	
	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰
زنان	۷۱/۲	۷۹/۷	۱۶/۶	۲۲/۷	۱۲/۶	۱۸/۵	۹/۴	۱۴/۵	۶/۸	۱۰/۹	۵/۳	۷/۹
مردان	۶۴/۴	۷۸/۲	۱۵	۲۲/۹	۱۱/۵	۱۹/۱	۸/۲	۱۵/۶	۵/۶	۱۲/۴	۴/۶	۹/۹

روند زمانی تعداد در مقابل میزان استاندارد شده سنی مرگ در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سطح ملی و استان



^۱ در این گزارش تمامی میزان‌ها در ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت گزارش شده‌اند.




میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

علت ^۲	زنان								مردان							
	۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷		۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷	
	میزان	رتبه ^۳	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه
بیماری‌های قلبی-عروقی	۳۳۷۵/۷	۸	۲۷۴۰/۳	۶	۲۳۰۲/۴	۸	۲۱۴۴/۷	۱۰	۲۸۹۱	۱۹	۲۳۲۰/۶	۱۹	۱۹۴۳/۴	۲۲	۱۸۶۷/۸	۲۳
سرطان‌ها	۵۹۷/۱	۱	۴۶۳/۷	۱	۵۱۷/۴	۱	۵۰۳/۶	۵	۸۶۵/۹	۲	۶۵۹/۵	۴	۷۰۷/۴	۸	۷۳۵/۷	۹
اختلالات عصبی	۵۴۶/۹	۱	۴۱۰/۲	۲	۴۱۰/۴	۵	۴۵۲/۸	۵	۳۴۳/۶	۳	۲۶۴/۸	۸	۲۵۷/۵	۱۷	۳۰۳/۴	۲۲
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۳۶۹	۲	۳۵۰/۷	۲	۳۵۲/۸	۳	۳۲۳/۹	۵	۲۹۰	۳	۲۶۵/۱	۳	۳۰۶/۵	۴	۲۹۱/۸	۷
بیماری‌های مزمن تنفسی	۳۲۱/۱	۳	۲۶۸/۳	۵	۲۱۷/۵	۶	۱۸۳/۴	۸	۴۲۳/۹	۷	۳۱۹/۳	۸	۲۶۰/۹	۸	۲۲۰/۲	۱۱
بیماری‌های گوارشی	۲۵۷/۸	۱	۱۵۱/۴	۱	۱۲۴	۴	۱۱۴/۹	۴	۲۸۱/۱	۲	۱۶۵/۵	۳	۱۱۵/۹	۹	۱۱۴/۵	۱۱
سوانح حمل و نقل	۴۹/۴	۱۸	۴۳/۹	۱۸	۳۴/۷	۲۶	۲۷/۹	۲۷	۱۱۸/۱	۲۵	۱۰۰/۵	۲۶	۶۶/۱	۲۸	۵۳/۱	۲۹
سوانح غیرعمدی	۸۲	۲	۶۱/۴	۲	۵۱/۲	۵	۴۵/۷	۶	۱۱۸/۸	۲	۹۳/۶	۲	۸۳/۳	۱	۷۰/۵	۴

میزان استاندارد شده سنی **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

مشکل سلامتی	زنان								مردان							
	۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷		۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷	
	میزان	رتبه ^۴	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه
بیماری‌های قلبی-عروقی	۳۱۴۵۳/۸	۲۸	۳۱۴۰۸/۶	۲۵	۳۱۱۷۲	۲۷	۳۱۱۵۳/۸	۳۰	۳۰۰۱۴	۳۱	۳۰۴۱۷/۱	۲۷	۳۰۷۱۰/۱	۲۷	۳۰۰۷۰/۶	۳۱
سرطان‌ها	۱۸۹۳/۴	۳	۱۸۸۲	۳	۲۵۶۷/۹	۲	۲۷۰۷/۱	۲	۲۷۱۲/۲	۲	۲۸۹۶/۶	۱	۳۵۹۴/۴	۳	۴۱۰۶/۵	۵
اختلالات عصبی	۵۷۲۵۲/۸	۱۶	۵۷۶۳۰/۱	۳	۵۸۲۳۲/۹	۵	۵۸۲۲۲/۳	۹	۵۱۲۶۹	۱۹	۵۲۰۱۶/۶	۷	۵۲۱۶۹/۵	۵	۵۲۱۴۷/۴	۸
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۵۱۶۱۵/۹	۳	۵۲۳۸۶/۲	۴	۵۴۷۷۹/۸	۴	۵۹۳۵۰/۱	۶	۴۲۱۹۳/۷	۸	۴۳۰۸۶/۹	۷	۴۴۷۸۰/۳	۷	۴۸۳۷۴/۱	۱۰
بیماری‌های مزمن تنفسی	۱۷۴۹۳/۹	۷	۱۸۳۰۵/۲	۶	۱۸۲۶۹/۸	۵	۱۶۶۶۳	۷	۱۴۴۳۰/۳	۱۳	۱۴۲۵۵/۲	۸	۱۳۷۶۸/۴	۷	۱۳۳۷۷/۹	۱۰
بیماری‌های گوارشی	۴۷۴۴۸/۲	۴	۴۸۶۳۷/۱	۴	۵۱۷۰۳/۲	۶	۵۳۴۰۳/۸	۷	۵۸۲۵۶/۳	۷	۶۰۱۸۸	۸	۶۳۳۹۶/۳	۱۳	۶۶۵۳۸/۳	۱۸
سوانح حمل و نقل	۶۵۳۶/۲	۲۹	۶۳۲۷/۴	۲۷	۶۲۳۷/۹	۲۹	۵۲۸۷/۵	۳۰	۱۰۷۴۹/۸	۲۸	۱۱۰۳۲	۲۲	۱۰۰۱۵/۵	۲۸	۸۲۷۹/۲	۲۹
سوانح غیرعمدی	۲۴۸۴۳/۷	۳	۲۱۴۴۱/۳	۷	۲۱۹۸۷/۸	۸	۲۲۵۳۴/۶	۶	۳۷۳۱۴/۴	۲	۳۵۸۶۰/۷	۲	۳۹۳۲۷/۵	۳	۳۳۸۶۸/۷	۵

میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی و **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سال ۲۰۱۷ در سطح ملی و استان




^۲ علل براساس میزان استاندارد شده سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ و هر دو جنسیت در سطح ملی مرتب شده‌اند.


^۳ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی مرگ به تفکیک علت، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.

^۴ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی شیوع به تفکیک مشکل سلامتی، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.







جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۶۱۳	۱۳۳۷/۵	۱۲۳۵/۱	۱۲۹۸/۱
زنان	۱۶۲۹/۴	۱۳۸۴/۵	۱۳۱۵	۱۳۸۳/۸
مردان	۱۵۸۷/۳	۱۲۸۸/۲	۱۱۹۰/۲	۱۲۵۸/۱




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۰۶۹/۵	۸۴۶	۵۹۷/۴	۴۵۱/۲
زنان	۱۱۵۱/۹	۹۲۶/۳	۶۷۰/۱	۴۹۱/۲
مردان	۹۸۲/۴	۷۷۰	۵۴۲/۶	۴۲۳/۹




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۴۰۳/۱	۲۹۹/۶	۲۸۵/۶	۳۲۵/۸
زنان	۵۰۸/۲	۳۷۷/۹	۳۷۴/۶	۴۱۷/۶
مردان	۲۹۶/۳	۲۲۳/۸	۲۱۳/۵	۲۵۵/۷



جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۳۴/۶	۱۴۴/۷	۱۴۶/۲	۱۴۴/۲
زنان	۱۶۰/۶	۱۸۰/۱	۱۷۰/۲	۱۶۳/۴
مردان	۱۰۸/۱	۱۱۲/۲	۱۲۵/۷	۱۲۷/۸











جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۶۳/۱	۱۳۳/۸	۱۲۶/۵	۱۲۴/۱
زنان	۱۶۷/۸	۱۳۹	۱۳۲	۱۲۶/۲
مردان	۱۵۸/۴	۱۲۹	۱۲۳/۲	۱۲۴/۵



جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۳/۷	۲۲/۵	۱۹/۵	۱۷/۸
زنان	۲۱/۳	۲۰/۷	۱۷/۹	۱۵/۷
مردان	۲۵/۹	۲۴/۱	۲۱/۴	۲۰











اختلالات افسردگی				اختلالات اضطرابی				جنسیت
۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	
۶۳۰۵	۶۲۰۳/۳	۶۰۷۲	۶۱۵۵/۴	۶۴۲۷/۲	۶۵۹۱/۳	۶۳۸۶/۲	۶۴۷۴/۹	هر دو
۷۳۹۶/۴	۷۲۷۷	۷۱۴۳/۹	۷۱۷۴/۹	۸۲۰۴/۷	۸۳۹۳/۷	۸۲۵۲/۸	۸۲۷۱/۴	زنان
۵۲۴۸/۱	۵۱۵۱/۷	۵۱۱۹/۵	۵۱۸۷/۵	۴۷۱۷/۷	۴۸۴۴	۴۷۲۳	۴۷۵۲/۷	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۱۰۵۱۰/۵	۱۱۰۶۰/۷	۱۰۹۱۴/۸	۱۰۴۵۵	هر دو
۱۰۲۵۳/۶	۱۰۷۷۱/۶	۱۰۶۰۰/۸	۱۰۱۶۳/۷	زنان
۱۰۷۴۹/۹	۱۱۳۳۰/۴	۱۱۱۹۷/۸	۱۰۷۳۹	مردان



۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۵۳۰/۸	۸۷۰۱/۸	۷۷۸۳/۷	۸۵۵۲/۸	هر دو
۷۲۹۹/۶	۶۹۰۱/۴	۶۲۲۵/۴	۶۸۶۷/۴	زنان
۹۷۰۸/۶	۱۰۴۲۳/۴	۹۱۷۸/۱	۱۰۱۸۴/۹	مردان







۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۹۱۶/۲	۹۲۴۲/۴	۹۰۰۸	۸۲۹۹/۹	هر دو
۹۷۹۴/۳	۱۰۵۶۱/۲	۱۰۰۹۷/۲	۹۰۵۱/۹	زنان
۸۰۹۵/۲	۸۰۳۵/۶	۸۰۱۷/۶	۷۵۴۲	مردان



۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۶۴۹۰/۷	۶۷۷۴/۳	۶۹۴۴/۲	۷۳۶۰/۵	هر دو
۷۱۴۵/۴	۷۲۲۲/۳	۷۶۲۹/۶	۸۴۲۷/۱	زنان
۵۸۹۲/۵	۶۳۶۷/۱	۶۳۲۳/۳	۶۲۹۴	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۵۳۱۶/۶	۵۳۸۰/۶	۵۵۵۰/۳	۵۶۲۱	هر دو
۵۵۹۱/۱	۵۶۶۰/۵	۵۸۱۵/۶	۵۸۳۶/۲	زنان
۵۰۷۲/۹	۵۱۳۹/۴	۵۳۰۴/۶	۵۳۹۲/۷	مردان





سیمای سلامت سالمندان

استان کردستان

میزان مرگ و شیوع بیماری ها



سیمای سلامت سالمندان

استان کردستان

(میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها در کل جمعیت، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (کمتر از ۶۰ سال) ساکن در استان کردستان و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس و گروه‌های سنی بیان شده است. به منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی حاوی: اطلاعات مقایسه‌ای با شاخص کل کشور و مقایسه با استان‌های مجاور استان کردستان شامل: استان‌های آذربایجان غربی، همدان، کرمانشاه و زنجان نیز تدوین و ترسیم شده است.

آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر این مطلب است که شایع‌ترین علل مرگ در سالمندان ساکن استان کردستان (هر دو جنس) براساس میزان در سال ۲۰۱۷، به ترتیب بیماری‌های غیرواگیر، سوانح و حوادث و بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای است. این شاخص در افراد غیر سالمند ساکن استان کردستان دارای الگویی مشابه با سالمندان است.

روند زمانی تعداد مرگ به علت هر سه دسته اصلی بیماری‌ها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ در حال افزایش است. سالمندان ساکن در استان کردستان در سال ۲۰۱۷ از لحاظ میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای و بیماری‌های غیرواگیر از میانگین کشوری پایین‌تر و به علت سوانح و حوادث از میانگین کشوری بالاتر هستند.

سالمندان ساکن استان کردستان، از بین علل مختلف مرگ در بیماری‌های قلبی-عروقی (مردان در سال ۲۰۱۰) سرطان‌ها (زنان در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، اختلالات عصبی (مردان در سال ۲۰۱۰) و سوانح حمل و نقل (مردان در سال ۲۰۱۰) و سوانح غیر عمدی (مردان در سال ۲۰۱۰) واجد رتبه‌ی ده و یا کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

از نظر شیوع مشکلات سلامتی در سالمندان ساکن استان کردستان، این گروه جمعیتی در اختلالات عصبی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۰) سوانح حمل و نقل (زنان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) و سوانح غیر عمدی (زنان در سال ۲۰۱۰) یکی از ده استان دارای بالاترین شیوع در کل کشور بوده‌اند.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، سکته، عفونت‌های تنفسی تحتانی و افتادن کاهشی و برای بیماری آلزایمر و دیابت نوع دو افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری ایسکمیک قلب، سکته و عفونت‌های تنفسی تحتانی در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان کردستان نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر بوده است. میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری آلزایمر در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان کردستان نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر بوده است. میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت دیابت نوع دو در مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان کردستان نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ بیشتر بوده است.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع به علت مشکلات سلامتی در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، افتادن، سکته و بیماری آلزایمر کاهشی و برای اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی و بیماری مزمن انسدادی ریه افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع برای بیماری مزمن انسدادی ریه و سکته در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر، در سال ۲۰۱۷ نسبت به تمام استان‌های مجاور کمتر بوده است. میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع برای اختلالات روانی در مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان کردستان در سال ۲۰۱۷ نسبت به تمام استان‌های مجاور کمتر بوده است. میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع برای بیماری آلزایمر در مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان کردستان در سال ۲۰۱۷ نسبت به تمام استان‌های مجاور بیشتر بوده است.




تعداد و میزان^۱ مرگ به تفکیک گروه سنی در سال ۲۰۱۷ در استان

گروه سنی	جنسیت	همه علل		بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای		بیماری‌های غیرواگیر		سوانح و حوادث	
		تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان
همه سنین	هر دو	۷۴۰۸	۴۵۰/۳	۵۵۰	۳۳/۴	۵۹۳۳	۳۶۰/۶	۹۲۶	۵۶/۳
	زنان	۳۰۳۶	۳۷۵	۲۴۹	۳۰/۸	۲۵۳۴	۳۱۳	۲۵۳	۳۱/۲
	مردان	۴۳۷۲	۵۲۳/۳	۳۰۱	۳۶	۳۳۹۹	۴۰۶/۸	۶۷۳	۸۰/۵
کمتر از ۶۰ سال	هر دو	۲۴۴۳	۱۶۴/۲	۴۳۳	۲۹/۱	۱۲۶۱	۸۴/۸	۷۴۹	۵۰/۳
	زنان	۸۹۰	۱۲۱/۸	۲۰۰	۲۷/۴	۴۹۴	۶۷/۶	۱۹۶	۲۶/۸
	مردان	۱۵۵۴	۲۰۵	۲۳۲	۳۰/۷	۷۶۸	۱۰۱/۳	۵۵۴	۷۳
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۴۹۶۵	۳۱۶۶/۳	۱۱۷	۷۴/۹	۴۶۷۱	۲۹۷۸/۹	۱۷۶	۱۱۲/۵
	زنان	۲۱۴۷	۲۷۰۶	۴۹	۶۲	۲۰۴۰	۲۵۷۱/۶	۵۷	۷۲/۳
	مردان	۲۸۱۸	۳۶۳۷/۷	۶۸	۸۸	۲۶۳۱	۳۳۹۶	۱۱۹	۱۵۳/۷
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۵۵۳	۱۰۱۴/۴	۱۱	۲۰/۸	۴۹۹	۹۱۴	۴۳	۷۹/۵
	زنان	۲۱۲	۷۶۱/۸	۵	۱۶/۲	۱۹۶	۷۰۵/۶	۱۱	۳۹/۹
	مردان	۳۴۱	۱۲۷۷/۲	۷	۲۵/۵	۳۰۲	۱۱۳۱	۳۲	۱۲۰/۸
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۵۰۷	۱۳۲۶/۱	۱۰	۲۷	۴۶۸	۱۲۲۲/۷	۲۹	۷۶/۴
	زنان	۲۱۹	۱۱۰۱/۸	۵	۲۳/۲	۲۰۵	۱۰۳۱/۹	۹	۴۶/۷
	مردان	۲۸۸	۱۵۶۹/۴	۶	۳۱/۱	۲۶۲	۱۴۲۹/۶	۲۰	۱۰۸/۶
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۵۳۲	۲۲۱۳/۷	۱۱	۴۵/۹	۴۹۹	۲۰۷۵/۹	۲۲	۹۱/۹
	زنان	۲۳۶	۱۹۲۸/۹	۵	۳۹/۷	۲۲۴	۱۸۲۶/۷	۸	۶۲/۵
	مردان	۲۹۶	۲۵۰۸/۹	۶	۵۲/۳	۲۷۶	۲۳۳۴/۳	۱۴	۱۲۲/۳
۷۵ تا ۷۹ سال	هر دو	۶۷۹	۴۰۵۳/۴	۱۵	۸۹/۵	۶۴۲	۳۸۳۳/۹	۲۲	۱۳۰
	زنان	۳۰۲	۳۶۲۵/۹	۶	۷۶/۷	۲۸۸	۳۴۵۴/۶	۸	۹۴/۷
	مردان	۳۷۶	۴۴۷۷/۳	۹	۱۰۲/۳	۳۵۴	۴۲۱۰	۱۴	۱۶۵
۸۰ سال و بالاتر	هر دو	۲۶۹۴	۱۱۶۰۳/۴	۷۰	۳۰۰/۴	۲۵۶۴	۱۱۰۴۴/۸	۶۰	۲۵۸/۲
	زنان	۱۱۷۷	۱۰۶۷۲/۲	۲۹	۲۶۱/۴	۱۱۲۷	۱۰۲۱۶/۸	۲۱	۱۹۴
	مردان	۱۵۱۶	۱۲۴۴۶/۵	۴۱	۳۳۵/۷	۱۴۳۷	۱۱۷۹۴/۴	۳۹	۳۱۶/۴

امید زندگی (سال) در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ در استان

جنسیت	بدو تولد		۶۰ تا ۶۴ سال		۶۵ تا ۶۹ سال		۷۰ تا ۷۴ سال		۷۵ تا ۷۹ سال		۸۰ سال و بالاتر	
	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰
زنان	۶۴/۲	۸۱/۱	۱۴/۷	۲۴/۷	۱۱/۵	۲۰/۳	۹/۲	۱۶/۳	۷/۷	۱۲/۶	۸/۷	۹/۵
مردان	۶۰/۹	۷۵/۶	۱۳/۹	۲۱/۸	۱۰/۹	۱۷/۷	۸/۹	۱۴/۱	۸	۱۰/۶	۱۰/۶	۷/۶

روند زمانی تعداد در مقابل میزان استاندارد شده سنی مرگ در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سطح ملی و استان



^۱ در این گزارش تمامی میزان‌ها در ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت گزارش شده‌اند.




میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

علت ^۲	مردان								زنان							
	۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰		۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰	
	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه ^۳	میزان
بیماری‌های قلبی-عروقی	۲۰	۱۹۸۲	۱۰	۲۳۳۰/۹	۱۵	۲۴۲۶/۳	۲۳	۲۷۹۲/۷	۲۸	۱۷۳۶	۱۸	۱۹۹۶/۳	۲۴	۲۲۴۳/۱	۲۶	۲۵۴۷/۴
سرطان‌ها	۸	۷۵۷/۲	۲	۸۰۰/۲	۶	۶۱۷/۷	۸	۷۴۳/۱	۱۴	۴۰۶	۹	۴۲۰/۲	۱۰	۳۴۶/۳	۱۴	۳۹۲/۷
اختلالات عصبی	۱۱	۳۴۰/۸	۹	۲۹۴/۷	۱۴	۲۲۶/۲	۲۰	۲۵۲/۲	۲۳	۳۴۹/۱	۲۰	۳۲۷/۴	۱۷	۲۵۲/۳	۲۰	۲۶۵/۶
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۲۳	۲۰۳/۱	۱۶	۲۰۲/۲	۲۰	۱۴۵/۸	۲۳	۱۵۲/۲	۲۴	۱۹۳/۳	۲۱	۱۸۱/۴	۲۱	۱۴۹/۱	۲۳	۱۴۹/۷
بیماری‌های مزمن تنفسی	۱۸	۱۸۵	۱۴	۲۱۸/۶	۱۶	۲۲۰	۱۶	۲۶۰/۳	۱۹	۱۱۹/۹	۱۹	۱۳۹/۳	۱۷	۱۴۷/۱	۱۹	۱۴۹/۸
بیماری‌های گوارشی	۱۷	۱۰۳/۸	۱۵	۱۰۳/۸	۲۰	۸۸/۴	۲۴	۱۱۶	۱۹	۷۷/۴	۲۰	۸۲	۲۲	۶۸/۵	۲۴	۸۷/۶
سوانح حمل و نقل	۱۸	۸۹/۷	۱۰	۱۲۰/۴	۱۵	۱۳۳/۳	۱۵	۱۵۱/۴	۲۰	۳۵/۸	۱۶	۴۴/۳	۱۵	۴۵/۸	۱۹	۴۸/۹
سوانح غیرعمدی	۱۴	۵۴/۳	۷	۶۲/۶	۱۶	۶۴/۸	۱۷	۷۹/۳	۱۸	۳۵/۳	۱۵	۴۱/۲	۱۵	۴۲/۳	۱۵	۵۳

میزان استاندارد شده سنی **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

مشکل سلامتی	مردان								زنان							
	۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰		۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰	
	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه ^۴	میزان
بیماری‌های قلبی-عروقی	۲۰	۳۰۸۹۳/۲	۱۲	۳۱۷۱۰	۱۸	۳۰۹۹۲/۵	۱۷	۳۱۲۸۵/۵	۱۹	۳۲۲۴۵/۱	۱۵	۳۲۱۸۶/۳	۱۴	۳۲۰۴۷	۱۴	۳۲۷۲۸/۵
سرطان‌ها	۲۷	۳۱۶۵/۷	۲۳	۲۸۲۸/۲	۲۴	۱۸۵۰/۳	۲۰	۱۷۸۴/۶	۳۱	۱۸۱۸/۴	۲۹	۱۶۳۸/۸	۲۸	۱۱۳۸/۱	۲۵	۱۱۲۱
اختلالات عصبی	۱۵	۵۲۱۴۱	۹	۵۲۱۶۰/۹	۱۳	۵۱۹۹۹/۸	۸	۵۱۲۹۹/۷	۲۵	۵۸۱۹۹/۷	۱۰	۵۸۲۱۷/۸	۱۶	۵۷۵۹۴/۶	۷	۵۷۲۶۵/۶
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۲۴	۴۵۵۲۲/۹	۱۹	۴۱۱۰۴/۱	۲۱	۳۹۰۹۲/۹	۲۲	۳۸۱۳۲/۴	۲۶	۵۵۶۶۹/۴	۲۳	۴۹۷۴۵/۳	۲۳	۴۷۳۳۱/۲	۲۴	۴۶۷۲۹/۵
بیماری‌های مزمن تنفسی	۲۰	۱۲۵۳۶	۱۶	۱۲۶۹۸/۵	۱۷	۱۲۴۵۷/۶	۱۴	۱۴۳۷۹/۶	۲۲	۱۴۸۲۷/۱	۱۶	۱۵۸۴۵/۶	۱۷	۱۵۰۹۳	۱۴	۱۶۳۲۶/۵
بیماری‌های گوارشی	۱۶	۶۶۵۶۰/۵	۱۴	۶۳۳۶۵	۱۳	۵۹۸۶۸/۲	۱۱	۵۷۸۴۶/۷	۲۰	۵۳۰۲۲	۱۸	۵۱۱۳۸/۷	۱۶	۴۷۶۸۵/۳	۱۷	۴۶۵۷۸/۷
سوانح حمل و نقل	۶	۹۸۱۲/۱	۳	۱۲۱۸۸/۳	۱۰	۱۲۱۰۱/۹	۶	۱۲۸۶۶/۴	۱۱	۶۲۷۹/۱	۶	۷۵۵۹/۸	۹	۷۲۴۰/۸	۹	۷۹۵۰
سوانح غیرعمدی	۲۶	۲۸۹۲۴/۴	۱۸	۳۱۶۷۶/۶	۲۲	۲۷۹۱۶/۲	۱۷	۳۲۵۵۴/۲	۱۸	۲۱۸۵۱/۹	۹	۲۱۹۱۹/۲	۱۱	۲۰۳۰۸/۷	۱۱	۲۳۸۷۷

میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی و **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سال ۲۰۱۷ در سطح ملی و استان




^۲ علل براساس میزان استاندارد شده سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ و هر دو جنسیت در سطح ملی مرتب شده‌اند.


^۳ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی مرگ به تفکیک علت، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.

^۴ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی شیوع به تفکیک مشکل سلامتی، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.







جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۶۶۷/۲	۱۴۹۱/۹	۱۲۳۴/۹	۱۰۸۳/۲
زنان	۱۴۸۶/۷	۱۳۵۶/۷	۱۰۷۷/۹	۹۶۵
مردان	۱۸۰۹	۱۶۰۲/۳	۱۳۸۸	۱۲۰۱/۲




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۷۲۷/۸	۶۰۴/۸	۵۱۲/۵	۳۹۸/۵
زنان	۷۳۵/۴	۶۱۴/۳	۴۹۲/۸	۳۸۹/۵
مردان	۷۲۰/۲	۵۹۸/۲	۵۳۲/۷	۴۰۷/۶




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۲۸/۸	۲۰۹/۷	۲۷۲/۵	۳۰۷/۱
زنان	۲۴۳/۴	۲۳۰/۵	۲۹۹/۴	۳۲۱/۵
مردان	۲۱۵	۱۹۱	۲۴۸/۱	۲۹۳/۶



جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۳۱/۵	۳۷/۲	۶۱/۱	۷۱/۳
زنان	۳۳/۸	۴۲/۱	۶۳/۳	۷۷/۷
مردان	۲۹/۷	۳۳/۴	۵۹/۴	۶۵/۱




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۶۸/۲	۵۸/۷	۶۲/۷	۵۹
زنان	۶۰/۳	۵۲/۴	۵۴	۴۹/۹
مردان	۷۴/۵	۶۳/۸	۷۰/۷	۶۷/۷




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۸/۹	۲۵	۲۴/۹	۲۱/۸
زنان	۲۰/۳	۱۸	۱۹/۶	۱۷/۱
مردان	۳۵/۸	۳۰/۸	۳۰	۲۶/۴




Ischemic heart disease




Stroke




Alzheimer's disease and other dementias




Diabetes mellitus type 2




Lower respiratory infections




Falls







اختلالات افسردگی				اختلالات اضطرابی				جنسیت
۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	
۶۳۳۲/۵	۶۲۳۱/۴	۶۰۲۰/۷	۶۰۵۰/۹	۶۴۸۲/۸	۶۶۲۸	۶۳۱۱/۵	۶۲۸۹/۶	هر دو
۷۳۹۴/۱	۷۲۹۶	۷۱۳۶/۱	۷۱۶۵/۵	۸۲۰۴/۷	۸۳۹۳/۷	۸۲۵۲/۸	۸۲۷۱/۴	زنان
۵۲۳۸	۵۱۴۲/۵	۵۱۰۴/۲	۵۱۹۰/۴	۴۷۱۷/۷	۴۸۴۴	۴۷۲۳	۴۷۵۲/۷	مردان




۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۱۰۴۴۱/۱	۱۱۱۲۹/۱	۱۰۹۴۴/۴	۱۰۹۴۷/۵	هر دو
۱۰۲۱۴/۹	۱۰۸۱۱/۳	۱۰۵۹۸/۵	۱۰۵۹۸/۵	زنان
۱۰۶۶۹/۵	۱۱۴۳۱/۹	۱۱۲۲۱/۸	۱۱۲۲۴/۹	مردان




۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۹۲۳	۹۸۰۷/۶	۸۴۱۹/۶	۹۷۴۷/۵	هر دو
۷۶۰۸/۲	۷۷۱۴/۳	۶۶۹۵/۴	۷۷۴۵	زنان
۱۰۲۶۵/۶	۱۱۸۹۰/۳	۹۸۲۲/۲	۱۱۳۰۴/۸	مردان



۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۷۵۹۸/۱	۷۷۲۱/۵	۶۹۴۴/۵	۷۴۱۲/۲	هر دو
۸۲۷۷/۶	۸۷۲۸/۵	۷۸۸۰/۲	۸۱۹۶/۲	زنان
۶۹۰۶/۲	۶۷۵۰/۳	۶۲۰۲/۷	۶۸۰۷/۵	مردان




۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۶۶۷۲/۲	۶۸۴۱/۹	۶۵۳۸/۴	۷۱۳۳/۵	هر دو
۷۲۹۲/۱	۷۱۴۰/۱	۷۱۳۹/۳	۸۱۶۴/۵	زنان
۶۰۵۱/۸	۶۵۴۸/۹	۶۰۵۰/۹	۶۳۱۹/۹	مردان




۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۵۳۱۹/۳	۵۳۹۴/۴	۵۵۴۵	۵۶۴۱/۳	هر دو
۵۵۷۶/۱	۵۶۷۱/۶	۵۸۱۳/۷	۵۸۹۲	زنان
۵۰۶۹	۵۱۴۵	۵۲۳۳/۹	۵۴۳۵/۱	مردان




Mental disorders
Female Male




Ischemic heart disease
Female Male




Falls
Female Male




Chronic obstructive pulmonary disease
Female Male



Stroke
Female Male



Alzheimer's disease and other dementias
Female Male



سیمای سلامت سالمندان

استان کرمان

میزان مرگ و شیوع بیماری ها



سیمای سلامت سالمندان

استان کرمان

(میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها در کل جمعیت، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (کمتر از ۶۰ سال) ساکن در استان کرمان و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس و گروه‌های سنی بیان شده است. به منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی حاوی: اطلاعات مقایسه‌ای با شاخص کل کشور و مقایسه با استان‌های مجاور استان کرمان شامل: استان‌های فارس، هرمزگان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و یزد نیز تدوین و ترسیم شده است.

آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر این مطلب است که شایع‌ترین علل مرگ در سالمندان ساکن استان کرمان (هر دو جنس) براساس میزان در سال ۲۰۱۷، به ترتیب بیماری‌های غیرواگیر، بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای و سوانح و حوادث است. این شاخص در افراد غیر سالمند ساکن استان کرمان دارای الگویی متفاوت با سالمندان است.

روند زمانی تعداد مرگ به علت هر سه دسته اصلی بیماری‌ها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ در حال افزایش است. سالمندان ساکن در استان کرمان و در سال ۲۰۱۷ از لحاظ میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت هر سه دسته‌ی بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای، بیماری‌های غیرواگیر و سوانح و حوادث از میانگین کشوری بالاتر هستند. لازم به ذکر است تغییر ناگهانی که در تعداد و میزان مرگ به علت سوانح و حوادث اتفاق افتاده به علت زمین لرزه رخ داده در دی سال ۱۳۸۲ در این استان است.

سالمندان ساکن استان کرمان از بین علل مختلف مرگ در بیماری‌های قلبی-عروقی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ و زنان در سال ۲۰۱۷)، سرطان‌ها (زنان در سال ۲۰۰۰ و مردان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰)، اختلالات عصبی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۷)، دیابت و بیماری‌های کلیوی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰)، بیماری‌های مزمن تنفسی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، بیماری‌های گوارشی (زنان در سال ۲۰۰۰ و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۷)، سوانح حمل و نقل (زنان و مردان در سال‌های ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) و سوانح غیرعمدی (زنان در سال ۲۰۰۰ و مردان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰) واجد رتبه‌ی ده و کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

از نظر شیوع مشکلات سلامتی در سالمندان ساکن استان کرمان، این گروه جمعیتی در سرطان‌ها (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۷ و مردان در سال ۲۰۱۰)، اختلالات عصبی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، دیابت و بیماری‌های کلیوی (زنان در سال ۲۰۰۰)، بیماری‌های مزمن تنفسی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، سوانح حمل و نقل (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) و سوانح غیرعمدی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) واجد رتبه‌ی ده و کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، سکته، عفونت‌های تنفسی تحتانی و افتادن کاهشی و برای بیماری آلزایمر و دیابت نوع دو افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری ایسکمیک قلب در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان کرمان نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ بیشتر و به علت افتادن کمتر بوده است. در زنان سالمند استان کرمان میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت سکته نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ بیشتر بوده است.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع به علت مشکلات سلامتی در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، سکته و آلزایمر کاهشی و برای اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی، افتادن و بیماری مزمن انسدادی ریه افزایشی است. میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع برای مشکلات سلامتی افتادن در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان کرمان نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر و برای بیماری مزمن انسدادی ریه بیشتر بوده است. در مردان سالمند استان کرمان میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع سکته در نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر و برای بیماری ایسکمیک قلب بیشتر بوده است.




تعداد و میزان^۱ مرگ به تفکیک گروه سنی در سال ۲۰۱۷ در استان

گروه سنی	جنسیت	همه علل		بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای		بیماری‌های غیرواگیر		سوانح و حوادث	
		تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان
همه سنین	هر دو	۱۵۶۴۴	۴۷۷/۶	۱۲۵۵	۳۸/۳	۱۲۱۱۱	۳۶۹/۷	۲۲۷۸	۶۹/۵
	زنان	۶۵۶۲	۴۱۱/۱	۵۵۵	۳۴/۸	۵۴۰۷	۳۳۸/۷	۶۰۰	۳۷/۶
	مردان	۹۰۸۲	۵۴۰/۸	۷۰۰	۴۱/۷	۶۷۰۴	۳۹۹/۲	۱۶۷۸	۹۹/۹
کمتر از ۶۰ سال	هر دو	۵۹۰۵	۱۹۵/۸	۸۶۲	۲۸/۶	۳۱۲۰	۱۰۳/۵	۱۹۲۳	۶۳/۸
	زنان	۲۰۵۶	۱۴۰/۳	۳۷۶	۲۵/۷	۱۱۹۵	۸۱/۶	۴۸۵	۳۳/۱
	مردان	۳۸۴۸	۲۴۸/۳	۴۸۵	۳۱/۳	۱۹۲۵	۱۲۴/۲	۱۴۳۸	۹۲/۸
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۹۷۳۹	۳۷۴۱/۴	۳۹۳	۱۵۱/۱	۸۹۹۱	۳۴۵۳/۹	۳۵۵	۱۳۶/۴
	زنان	۴۵۰۶	۳۴۴۸/۳	۱۷۹	۱۳۷	۴۲۱۱	۳۲۲۳	۱۱۵	۸۸/۳
	مردان	۵۲۳۴	۴۰۳۶/۹	۲۱۴	۱۶۵/۲	۴۷۸۰	۳۶۸۶/۷	۲۴۰	۱۸۵
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۱۰۸۲	۱۱۳۱/۷	۳۹	۴۰/۷	۹۵۴	۹۹۷/۷	۸۹	۹۳/۳
	زنان	۳۹۲	۸۲۳/۲	۱۵	۳۱/۱	۳۵۴	۷۴۳/۳	۲۳	۴۸/۸
	مردان	۶۹۰	۱۴۳۷/۸	۲۴	۵۰/۳	۶۰۰	۱۲۵۰/۱	۶۶	۱۳۷/۴
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۱۰۳۶	۱۷۷۰/۳	۳۷	۶۳/۴	۹۳۶	۱۵۹۸/۶	۶۳	۱۰۸/۲
	زنان	۴۵۸	۱۴۸۷/۹	۱۷	۵۳/۹	۴۲۰	۱۳۶۵/۴	۲۱	۶۸/۶
	مردان	۵۷۹	۲۰۸۳	۲۱	۷۴	۵۱۶	۱۸۵۶/۹	۴۲	۱۵۲/۱
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۱۰۳۵	۲۸۴۹	۳۹	۱۰۶	۹۴۹	۲۶۱۲/۷	۴۷	۱۳۰/۳
	زنان	۴۷۳	۲۵۰۲/۸	۱۷	۹۰/۱	۴۴۰	۲۳۳۰/۴	۱۶	۸۲/۳
	مردان	۵۶۲	۳۲۲۴/۳	۲۱	۱۲۳/۳	۵۰۹	۲۹۱۸/۸	۳۲	۱۸۲/۲
۷۵ تا ۷۹ سال	هر دو	۱۴۹۱	۴۹۵۷/۴	۵۸	۱۹۲/۵	۱۳۸۲	۴۵۹۶/۷	۵۱	۱۶۸/۱
	زنان	۷۰۴	۴۸۱۷/۸	۲۶	۱۷۹/۵	۶۶۱	۴۵۲۲/۴	۱۷	۱۱۶
	مردان	۷۸۶	۵۰۸۹/۵	۳۲	۲۰۴/۹	۷۲۱	۴۶۶۷/۱	۳۴	۲۱۷/۵
۸۰ سال و بالاتر	هر دو	۵۰۹۵	۱۲۸۱۴/۸	۲۲۱	۵۵۵/۲	۴۷۷۰	۱۱۹۹۶/۲	۱۰۵	۲۶۳/۴
	زنان	۲۴۷۹	۱۳۲۰۵/۷	۱۰۴	۵۵۶/۴	۲۳۳۶	۱۲۴۴۴/۳	۳۸	۲۰۵/۱
	مردان	۲۶۱۷	۱۲۴۶۵/۳	۱۱۶	۵۵۴/۱	۲۴۳۴	۱۱۵۹۵/۶	۶۶	۳۱۵/۶

امید زندگی (سال) در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ در استان

جنسیت	بدو تولد		۶۰ تا ۶۴ سال		۶۵ تا ۶۹ سال		۷۰ تا ۷۴ سال		۷۵ تا ۷۹ سال		۸۰ سال و بالاتر	
	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰
زنان	۶۷/۷	۸۲/۱	۱۵/۵	۲۶	۱۱/۷	۲۱/۸	۸/۸	۱۸	۶/۱	۱۴/۶	۴/۷	۱۲
مردان	۶۲/۶	۷۶/۱	۱۵	۲۳/۱	۱۱/۵	۱۹/۳	۸/۶	۱۵/۷	۶/۶	۱۲/۵	۵/۶	۹/۸

روند زمانی تعداد در مقابل میزان استاندارد شده سنی مرگ در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سطح ملی و استان



^۱ در این گزارش تمامی میزان‌ها در ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت گزارش شده‌اند.




میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

علت ^۲	زنان								مردان							
	۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷		۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷	
	میزان	رتبه ^۳	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه
بیماری‌های قلبی-عروقی	۳۷۸۶/۵	۳	۳۲۳۸/۱	۱	۱۹۳۱/۲	۲۴	۲۱۶۵/۹	۸	۴۰۳۸/۶	۱	۳۲۲۸/۵	۱	۱۹۸۷/۹	۱۸	۲۱۴۰/۶	۱۴
سرطان‌ها	۴۰۴/۶	۱۱	۳۶۲/۸	۸	۳۵۷	۲۴	۴۲۵/۳	۱۱	۷۲۳/۵	۹	۵۹۴/۵	۷	۵۵۰/۱	۲۲	۶۳۷/۲	۱۸
اختلالات عصبی	۳۹۴/۱	۴	۳۵۹/۸	۳	۳۴۹/۶	۱۷	۴۵۳/۳	۴	۳۳۷/۷	۴	۲۸۱/۸	۳	۲۶۳/۹	۱۴	۳۷۵	۸
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۲۳۴/۴	۶	۲۲۶	۷	۲۱۱/۱	۱۳	۲۷۶/۹	۱۱	۲۲۵/۳	۶	۲۰۱/۱	۸	۲۰۵/۸	۱۵	۲۴۷/۸	۱۲
بیماری‌های مزمن تنفسی	۳۲۳	۲	۳۰۵/۸	۲	۲۹۳/۳	۱	۳۲۱/۲	۱	۵۶۰/۷	۲	۴۳۰/۳	۲	۴۲۳/۳	۱	۴۴۱/۱	۱
بیماری‌های گوارشی	۱۱۹/۷	۱۱	۸۹/۸	۸	۸۵/۳	۱۷	۹۶/۹	۱۱	۱۷۷/۷	۷	۱۲۷/۱	۶	۱۰۳/۴	۱۶	۱۱۸/۹	۷
سوانح حمل و نقل	۹۰/۱	۲	۸۲/۶	۲	۵۵/۹	۳	۵۴/۳	۲	۲۸۸/۸	۲	۲۵۳/۵	۲	۱۳۷/۳	۳	۱۲۰/۱	۲
سوانح غیرعمدی	۵۶/۹	۱۱	۴۶/۱	۶	۳۴	۲۷	۳۴/۵	۲۰	۹۴	۵	۷۴/۸	۳	۵۲/۸	۲۲	۵۴/۳	۱۳

میزان استاندارد شده سنی **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

مشکل سلامتی	زنان								مردان							
	۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷		۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷	
	میزان	رتبه ^۴	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه
بیماری‌های قلبی-عروقی	۳۲۵۸۹/۵	۱۷	۳۱۸۰۸/۲	۲۰	۳۱۲۴۵/۱	۲۶	۳۱۷۵۶	۲۳	۳۱۰۱۷/۲	۲۱	۳۰۸۵۳/۴	۱۹	۳۰۴۴۲/۲	۳۰	۳۰۱۳۷/۵	۲۹
سرطان‌ها	۱۴۰۶/۳	۷	۱۵۵۶/۲	۵	۲۰۸۱/۷	۱۱	۲۵۱۴/۳	۵	۲۱۹۷	۵	۲۵۰۰/۴	۵	۳۱۵۴/۱	۱۰	۳۹۳۲/۷	۸
اختلالات عصبی	۵۷۲۷۰/۲	۶	۵۷۶۲۸/۲	۴	۵۸۲۵۰/۱	۳	۵۸۳۳۷/۹	۴	۵۱۳۲۱/۱	۵	۵۲۰۴۶/۴	۵	۵۲۱۸۵	۳	۵۲۱۶۳/۷	۵
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۴۹۳۶۶/۱	۱۲	۴۹۸۸۰/۴	۱۰	۵۱۶۵۳/۲	۱۳	۵۸۳۸۴/۵	۱۲	۴۰۶۹۷/۵	۱۲	۴۱۱۶۷/۵	۱۲	۴۲۲۱۱/۴	۱۴	۴۷۶۱۸/۶	۱۳
بیماری‌های مزمن تنفسی	۱۸۳۸۹/۴	۴	۱۸۸۴۰/۸	۳	۱۸۸۵۶/۸	۲	۱۷۴۷۴/۶	۳	۱۶۷۷۱/۸	۴	۱۵۷۹۷/۵	۲	۱۵۳۰۱/۸	۲	۱۵۰۳۰	۱
بیماری‌های گوارشی	۴۶۵۷۵/۱	۱۸	۴۷۶۰۱/۷	۲۰	۵۰۹۷۰/۲	۲۴	۵۲۹۰۳/۸	۲۵	۵۷۷۶۶/۴	۱۴	۵۹۶۲۸	۲۱	۶۳۰۷۰/۲	۲۴	۶۶۳۶۰/۳	۲۴
سوانح حمل و نقل	۸۶۳۹/۶	۱	۸۲۴۷/۴	۱	۷۶۹۶/۸	۲	۶۴۷۳/۸	۳	۱۳۷۸۹/۷	۲	۱۳۶۱۱/۲	۲	۱۲۰۲۴/۶	۵	۹۶۴۲/۶	۹
سوانح غیرعمدی	۲۴۸۰۱/۹	۴	۲۲۰۲۷/۵	۳	۴۰۸۷۸	۱	۴۱۰۴۵/۹	۱	۳۶۲۱۸/۳	۵	۳۳۸۲۹/۳	۳	۵۸۰۵۱/۴	۱	۵۶۹۲۱/۱	۱

میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی و **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سال ۲۰۱۷ در سطح ملی و استان




^۲ علل براساس میزان استاندارد شده سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ و هر دو جنسیت در سطح ملی مرتب شده‌اند.


^۳ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی مرگ به تفکیک علت، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.

^۴ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی شیوع به تفکیک مشکل سلامتی، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.







جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۸۳۳/۶	۲۳۸۷/۹	۱۲۱۸/۷	۱۳۲۴/۹
زنان	۲۶۱۸/۷	۲۲۹۴/۴	۱۱۴۹/۷	۱۲۸۹/۶
مردان	۳۰۱۶/۱	۲۴۳۷/۴	۱۲۸۶/۳	۱۳۶۸/۴




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۸۷۲/۲	۶۷۷/۳	۴۰۳/۱	۴۳۳/۶
زنان	۹۲۱/۴	۷۳۶/۲	۴۲۰/۴	۴۶۳/۳
مردان	۸۰۶/۱	۶۱۲/۶	۳۸۸	۴۰۷/۹




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۳۲۸/۹	۲۸۶/۶	۲۶۹/۹	۳۶۸/۸
زنان	۳۶۱/۷	۳۲۹/۷	۳۲۰/۹	۴۱۸/۳
مردان	۲۸۴/۴	۲۳۴/۹	۲۲۱/۴	۳۲۳/۷



جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۵۳/۹	۵۸/۹	۵۰/۵	۷۹/۵
زنان	۵۷/۴	۶۶/۸	۵۵	۹۲/۴
مردان	۵۰/۱	۵۱/۴	۴۶/۴	۶۷




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۵۹/۷	۱۳۵/۶	۱۱۴/۵	۱۲۸/۴
زنان	۱۴۴	۱۲۶/۷	۱۰۶/۹	۱۲۱/۸
مردان	۱۷۵/۲	۱۴۲/۲	۱۲۱/۳	۱۳۵/۴




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۸/۲	۱۶/۵	۱۳/۹	۱۴
زنان	۱۱/۷	۱۰/۸	۱۰/۲	۱۰
مردان	۲۴/۶	۲۱/۷	۱۷/۵	۱۸




Ischemic heart disease




Stroke




Alzheimer's disease and other dementias




Diabetes mellitus type 2




Lower respiratory infections




Falls







اختلالات افسردگی				اختلالات اضطرابی				جنسیت
۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	
۶۳۲۰	۶۲۲۹/۴	۶۰۶۳/۳	۶۱۲۹/۹	۶۴۷۴/۲	۶۶۲۶	۶۳۷۶/۲	۶۴۳۸/۸	هر دو
۷۳۹۱/۱	۷۳۰۲	۷۱۴۷	۷۱۶۳/۸	۸۲۰۴/۷	۸۳۹۳/۷	۸۲۵۲/۸	۸۲۷۱/۴	زنان
۵۲۴۷/۶	۵۱۳۷/۳	۵۱۰۹/۴	۵۱۹۳/۲	۴۷۱۷/۷	۴۸۴۴	۴۷۲۳	۴۷۵۲/۷	مردان




۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۱۰۳۷۸/۷	۱۱۰۸۰	۱۱۳۳۱/۶	۱۱۰۹۱/۷	هر دو
۱۰۱۴۱/۴	۱۰۷۳۲/۵	۱۰۸۱۹/۸	۱۰۶۰۵/۳	زنان
۱۰۶۱۶/۱	۱۱۴۱۴/۲	۱۱۷۷۸/۸	۱۱۵۵۸/۹	مردان




۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۷۹۶۷/۵	۷۹۷۳/۴	۷۱۰۲/۱	۷۸۴۲/۲	هر دو
۶۹۱۱/۴	۶۲۵۱/۴	۵۴۲۰/۷	۵۹۶۹/۵	زنان
۹۰۳۲/۴	۹۶۷۶/۵	۸۵۹۱/۲	۹۶۱۰/۷	مردان



۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۱۰۵۶۰/۲	۱۰۵۴۴/۴	۹۷۸۷/۹	۹۱۸۸/۶	هر دو
۱۱۱۶۷/۹	۱۱۷۲۱/۵	۱۰۸۱۶/۶	۹۸۱۰/۹	زنان
۹۹۵۲/۸	۹۴۳۰/۹	۸۸۸۶/۶	۸۵۹۴/۷	مردان




۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۶۵۱۶	۵۹۸۵/۳	۶۴۸۵/۱	۷۴۷۰/۳	هر دو
۷۳۶۶/۸	۶۵۲۳/۹	۷۲۰۰/۸	۸۶۶۷/۴	زنان
۵۶۷۴/۵	۵۴۵۳/۲	۵۸۳۶/۲	۶۲۹۸/۸	مردان




۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۵۳۰۷/۲	۵۳۶۱/۷	۵۵۱۰/۹	۵۶۰۱/۱	هر دو
۵۵۸۰	۵۶۳۴/۷	۵۷۷۳/۱	۵۸۱۹/۹	زنان
۵۰۴۴/۶	۵۱۱۲/۴	۵۲۷۰/۵	۵۳۶۴/۸	مردان




Mental disorders
Female Male




Ischemic heart disease
Female Male




Falls
Female Male




Chronic obstructive pulmonary disease
Female Male



Stroke
Female Male



Alzheimer's disease and other dementias
Female Male



سیمای سلامت سالمندان

استان کرمانشاه

میزان مرگ و شیوع بیماری ها



سیمای سلامت سالمندان

استان کرمانشاه

(میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها در کل جمعیت، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (کمتر از ۶۰ سال) ساکن در استان کرمانشاه و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس و گروه‌های سنی بیان شده است. به منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی حاوی: اطلاعات مقایسه‌ای با شاخص کل کشور و مقایسه با استان‌های مجاور استان کرمانشاه شامل: استان‌های همدان، ایلام، کردستان و لرستان نیز تدوین و ترسیم شده است.

آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر این مطلب است که شایع‌ترین علل مرگ در سالمندان ساکن استان کرمانشاه (هر دو جنس) براساس میزان در سال ۲۰۱۷، به ترتیب بیماری‌های غیرواگیر، سوانح و حوادث و بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای است. این شاخص در افراد غیر سالمند ساکن استان کرمانشاه دارای الگوی مشابه سالمندان است.

روند زمانی تعداد مرگ به علت هر سه دسته اصلی بیماری‌ها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ در حال افزایش است. سالمندان ساکن در استان کرمانشاه و در سال ۲۰۱۷ از لحاظ میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری‌های غیرواگیر و سوانح و حوادث از میانگین کشوری بالاتر و از لحاظ بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای پایین‌تر هستند.

سالمندان ساکن استان کرمانشاه، از بین علل مختلف مرگ در بیماری‌های قلبی-عروقی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، سرطان‌ها (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰)، اختلالات عصبی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۷)، بیماری‌های مزمن تنفسی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ و زنان در سال ۲۰۱۷)، بیماری‌های گوارشی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰)، سوانح حمل و نقل (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ و مردان در سال ۲۰۱۰) و سوانح غیرعمدی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) واجد رتبه‌ی ده و کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

از نظر شیوع مشکلات سلامتی در سالمندان ساکن استان کرمانشاه، این گروه جمعیتی در سرطان‌ها (مردان در سال ۱۹۹۰)، بیماری‌های مزمن تنفسی (زنان و مردان در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷ و زنان در سال ۲۰۰۰) و سوانح غیرعمدی (زنان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) واجد رتبه‌ی ده و کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، سکته، عفونت‌های تنفسی تحتانی و افتادن کاهشی و برای بیماری آلزایمر و دیابت نوع دو افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت سکته، بیماری آلزایمر، دیابت نوع دو، عفونت‌های تنفسی تحتانی و افتادن در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان کرمانشاه نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ بیشتر بوده است. میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری ایسکمیک قلب، سکته، بیماری آلزایمر و عفونت‌های تنفسی تحتانی در مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان کرمانشاه نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ بیشتر بوده است.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع به علت مشکلات سلامتی در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، افتادن، سکته و بیماری آلزایمر کاهشی و برای اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی و بیماری مزمن انسدادی ریه افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع برای مشکلات سلامتی بیماری ایسکمیک قلب و بیماری مزمن انسدادی ریه در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان کرمانشاه نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ بیشتر بوده است. سکته در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان کرمانشاه نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ بیشتر بوده است. اختلالات روانی در مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان کرمانشاه نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ بیشتر و در بین زنان کمتر بوده است.




تعداد و میزان^۱ مرگ به تفکیک گروه سنی در سال ۲۰۱۷ در استان

گروه سنی	جنسیت	همه علل		بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای		بیماری‌های غیرواگیر		سوانح و حوادث	
		تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان
همه سنین	هر دو	۱۱۹۱۸	۵۹۹/۴	۸۷۱	۴۳/۸	۹۰۵۴	۴۵۵/۴	۱۹۹۲	۱۰۰/۲
	زنان	۴۹۴۳	۵۰۳/۵	۳۴۸	۳۵/۴	۳۹۹۰	۴۰۶/۳	۶۰۶	۶۱/۷
	مردان	۶۹۷۵	۶۹۳	۵۲۴	۵۲	۵۰۶۵	۵۰۳/۲	۱۳۸۶	۱۳۷/۸
کمتر از ۶۰ سال	هر دو	۴۳۱۰	۲۴۱/۹	۶۵۱	۳۶/۵	۲۰۴۸	۱۱۴/۹	۱۶۱۱	۹۰/۴
	زنان	۱۴۷۵	۱۶۸/۴	۲۵۴	۲۹	۷۶۱	۸۶/۹	۴۶۰	۵۲/۵
	مردان	۲۸۳۵	۳۱۲/۹	۳۹۷	۴۳/۸	۱۲۸۷	۱۴۲	۱۱۵۲	۱۲۷/۱
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۷۶۰۸	۳۶۰/۴	۲۲۰	۱۰۶/۹	۷۰۰۷	۳۳۹۸/۸	۳۸۱	۱۸۴/۸
	زنان	۳۴۶۸	۳۲۸/۵	۹۳	۸۸/۲	۳۲۲۹	۳۰۵۵	۱۴۶	۱۳۸/۳
	مردان	۴۱۴۰	۴۱۲۰/۶	۱۲۷	۱۲۶/۵	۳۷۷۸	۳۷۶۰/۵	۲۳۵	۲۳۳/۷
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۸۵۳	۱۱۶۹/۵	۲۶	۳۵/۶	۷۳۶	۱۰۰۹/۱	۹۱	۱۲۴/۸
	زنان	۳۴۶	۹۰۷/۶	۱۱	۲۷/۶	۳۰۵	۷۹۸/۸	۳۱	۸۱/۲
	مردان	۵۰۷	۱۴۵۶/۷	۱۵	۴۴/۴	۴۳۱	۱۲۳۹/۷	۶۰	۱۷۲/۶
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۹۷۱	۱۹۰۵/۹	۲۷	۵۳/۴	۸۷۲	۱۷۱۱/۲	۷۲	۱۴۱/۴
	زنان	۴۵۹	۱۶۷۱/۶	۱۳	۴۷/۴	۴۱۸	۱۵۲۰/۴	۲۹	۱۰۳/۷
	مردان	۵۱۲	۲۱۸۰/۴	۱۴	۶۰/۳	۴۵۴	۱۹۳۴/۵	۴۴	۱۸۵/۶
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۸۷۴	۲۸۵۷/۷	۲۳	۷۶/۳	۷۹۸	۲۶۰۸/۲	۵۳	۱۷۳/۳
	زنان	۴۲۵	۲۶۶۰/۴	۱۱	۶۷	۳۹۲	۲۴۵۷/۴	۲۲	۱۳۶/۱
	مردان	۴۴۹	۳۰۷۳/۳	۱۳	۸۶/۴	۴۰۵	۲۷۷۳	۳۱	۲۱۳/۹
۷۵ تا ۷۹ سال	هر دو	۱۱۳۳	۵۳۸۲/۲	۲۹	۱۳۸/۳	۱۰۵۱	۴۹۹۵/۲	۵۲	۲۴۸/۷
	زنان	۵۴۵	۵۱۵۲/۳	۱۳	۱۲۲/۲	۵۱۲	۴۸۳۴/۲	۲۱	۱۹۶
	مردان	۵۸۷	۵۶۱۴/۹	۱۶	۱۵۴/۷	۵۴۰	۵۱۵۸/۲	۳۲	۳۰۲/۱
۸۰ سال و بالاتر	هر دو	۳۷۷۷	۱۲۳۲۶/۶	۱۱۵	۳۷۴/۵	۳۵۵۰	۱۱۵۸۵	۱۱۳	۳۶۷/۲
	زنان	۱۶۹۲	۱۲۵۳۳/۲	۴۶	۳۴۱/۲	۱۶۰۲	۱۱۸۶۴/۹	۴۴	۳۲۷/۱
	مردان	۲۰۸۵	۱۲۱۶۳/۹	۶۹	۴۰۰/۶	۱۹۴۸	۱۱۳۶۴/۵	۶۸	۳۹۸/۸

امید زندگی (سال) در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ در استان

جنسیت	بدو تولد		۶۰ تا ۶۴ سال		۶۵ تا ۶۹ سال		۷۰ تا ۷۴ سال		۷۵ تا ۷۹ سال		۸۰ سال و بالاتر	
	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰
زنان	۶۷/۷	۷۸/۱	۱۶/۶	۲۲/۵	۱۲/۹	۱۸/۳	۹/۷	۱۴/۵	۷/۱	۱۱/۱	۵/۷	۸/۴
مردان	۶۲/۶	۷۱/۳	۱۵/۴	۲۰/۷	۱۲	۱۷	۹	۱۳/۵	۶/۵	۱۰/۶	۵/۱	۸/۱

روند زمانی تعداد در مقابل میزان استاندارد شده سنی مرگ در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سطح ملی و استان



^۱ در این گزارش تمامی میزان‌ها در ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت گزارش شده‌اند.




میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

علت ^۲	مردان								زنان							
	۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰		۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰	
	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه ^۳	میزان
بیماری‌های قلبی-عروقی	۸	۲۲۵۹/۷	۷	۲۳۴۵/۳	۴	۳۰۸۳/۹	۳	۳۸۱۶/۴	۵	۲۲۹۴/۸	۷	۲۳۲۵/۱	۵	۲۹۰۱	۵	۳۵۵۷/۳
سرطان‌ها	۱۳	۶۵۲/۳	۱۳	۵۹۹	۹	۵۸۰/۳	۷	۷۴۶/۵	۱۲	۴۱۸/۱	۱۶	۳۸۳/۱	۹	۳۴۷	۱۰	۴۱۷/۴
اختلالات عصبی	۱۰	۳۵۳/۱	۱۱	۲۸۲/۹	۷	۲۶۶/۸	۵	۳۳۱/۸	۹	۴۲۴/۸	۱۳	۳۶۰/۷	۸	۳۰۷/۱	۶	۳۶۴/۵
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۱۹	۲۱۲/۵	۱۸	۱۸۸/۲	۱۷	۱۵۷/۷	۱۸	۱۷۸/۲	۱۶	۲۳۹/۹	۱۷	۱۹۵/۸	۱۹	۱۶۱	۱۷	۱۷۳/۳
بیماری‌های مزمن تنفسی	۱۲	۲۱۵/۱	۹	۲۵۰/۳	۱۰	۲۸۷/۵	۱۰	۳۷۴/۸	۱۰	۱۶۲/۲	۹	۱۸۰/۶	۷	۲۱۹/۱	۸	۲۴۵/۹
بیماری‌های گوارشی	۱۲	۱۱۴/۴	۱۳	۱۰۶/۹	۷	۱۲۲	۶	۱۸۹/۹	۱۲	۹۴/۸	۱۴	۹۲/۹	۹	۸۹/۶	۸	۱۳۱/۳
سوانح حمل و نقل	۱۱	۹۸/۴	۸	۱۲۲/۸	۵	۱۶۸/۳	۵	۱۹۸/۶	۱۳	۴۰/۴	۱۱	۴۸/۵	۱۰	۵۴/۹	۸	۶۱/۹
سوانح غیرعمدی	۱	۱۱۶/۸	۱۰	۵۹/۶	۷	۷۱	۹	۹۰	۱	۹۷/۶	۴	۵۱/۸	۴	۵۶/۴	۵	۷۱

میزان استاندارد شده سنی **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

مشکل سلامتی	مردان								زنان							
	۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰		۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰	
	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه ^۴	میزان
بیماری‌های قلبی-عروقی	۱۴	۳۱۲۷/۱۹	۱۵	۳۱۵۲۹/۴	۱۲	۳۱۳۹۸/۱	۱۵	۳۱۵۴۲/۱	۱۱	۳۲۷۴۰/۵	۱۴	۳۲۱۹۵	۱۲	۳۲۱۹۰/۳	۱۶	۳۲۶۶۲/۱
سرطان‌ها	۱۴	۳۶۰۶/۶	۲۰	۲۸۷۲/۵	۱۱	۲۱۵۳/۲	۹	۲۰۸۸/۷	۲۳	۲۰۹۴/۶	۲۴	۱۸۱۱/۸	۱۸	۱۲۹۰/۶	۱۶	۱۲۷۹/۶
اختلالات عصبی	۲۸	۵۲۱۲۳/۲	۲۸	۵۲۱۲۴/۷	۲۷	۵۱۹۷۰/۴	۲۸	۵۱۲۴۴/۲	۲۸	۵۸۱۹۵/۷	۲۵	۵۸۱۹۷/۱	۲۳	۵۷۵۸۰/۲	۲۵	۵۷۲۳۴
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۱۸	۴۶۱۵۵/۹	۱۸	۴۱۱۹۲/۶	۱۸	۳۹۶۹۷/۸	۱۷	۳۸۹۸۴/۵	۱۷	۵۷۳۳۸/۱	۱۸	۵۰۸۲۵/۲	۱۹	۴۸۱۹۸/۱	۲۱	۴۷۷۵۴/۱
بیماری‌های مزمن تنفسی	۹	۱۳۴۶۰/۵	۱۰	۱۳۵۲۷/۶	۱۱	۱۳۶۷۰	۱۱	۱۴۵۹۶/۹	۱۰	۱۶۰۴۴/۶	۹	۱۷۱۵۳/۴	۱۰	۱۶۶۷۲	۱۲	۱۶۸۲۱/۶
بیماری‌های گوارشی	۱۹	۶۶۵۳۷/۳	۱۸	۶۳۲۴۷/۸	۱۹	۵۹۶۵۴/۷	۱۶	۵۷۷۱۸/۱	۱۵	۵۳۲۰۲/۷	۱۶	۵۱۲۹۵/۶	۱۷	۴۷۶۶۰/۴	۱۶	۴۶۵۸۱/۶
سوانح حمل و نقل	۱۳	۹۵۳۷/۱	۱۲	۱۱۵۵۸/۳	۱۲	۱۱۹۳۶/۳	۱۳	۱۲۱۴۶/۱	۱۸	۶۰۷۶/۹	۱۶	۷۱۹۷/۲	۱۷	۶۸۷۵/۸	۲۲	۷۱۳۲/۳
سوانح غیرعمدی	۳۱	۲۸۳۵۹/۲	۲۸	۲۹۸۲۳	۲۴	۲۷۵۷۰/۲	۲۲	۳۱۰۵۳/۷	۷	۲۲۴۵۷/۸	۶	۲۲۴۱۹/۸	۸	۲۱۲۸۵/۳	۸	۲۴۰۹۷/۹

میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی و **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سال ۲۰۱۷ در سطح ملی و استان




^۲ علل براساس میزان استاندارد شده سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ و هر دو جنسیت در سطح ملی مرتب شده‌اند.


^۳ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی مرگ به تفکیک علت، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.

^۴ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی شیوع به تفکیک مشکل سلامتی، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.







جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۴۲۱/۲	۱۹۹۶/۵	۱۳۰۰/۳	۱۳۶۵/۶
زنان	۲۲۰۶/۳	۱۸۴۸/۹	۱۲۲۸/۲	۱۳۱۲/۶
مردان	۲۵۸۳/۴	۲۱۱۰/۴	۱۳۸۷/۹	۱۴۳۵/۴




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۰۳۰	۸۰۱/۴	۵۵۵/۸	۵۳۴/۷
زنان	۱۰۴۶/۹	۸۱۳/۱	۵۸۸	۵۷۴/۳
مردان	۱۰۱۰/۵	۷۸۹/۱	۵۳۵/۱	۵۰۳/۳




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۳۰۹	۲۵۱/۸	۲۷۸/۹	۳۴۲/۸
زنان	۳۳۵/۵	۲۸۱/۴	۳۳۰/۱	۳۹۱/۲
مردان	۲۸۳/۵	۲۲۴/۷	۲۳۷/۳	۳۰۲/۴



جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۳۱/۷	۳۵/۴	۴۹/۲	۷۷/۶
زنان	۳۳/۴	۳۹/۶	۵۶/۹	۹۳/۶
مردان	۳۰/۱	۳۲/۱	۴۲/۵	۶۱/۷




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۹۳/۱	۷۶	۷۷/۹	۷۹/۴
زنان	۸۴	۶۹	۷۰/۴	۷۱/۹
مردان	۱۰۰/۲	۸۱/۴	۸۴/۶	۸۶/۶




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۶/۵	۲۳/۷	۲۴/۶	۲۲/۴
زنان	۲۰/۹	۱۹	۲۲/۹	۲۰/۶
مردان	۳۰/۹	۲۷/۴	۲۶/۷	۲۴/۷




Ischemic heart disease




Stroke




Alzheimer's disease and other dementias




Diabetes mellitus type 2




Lower respiratory infections




Falls







اختلالات افسردگی				اختلالات اضطرابی				جنسیت
۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	
۶۳۱۴/۲	۶۳۲۷/۲	۶۱۸۹/۳	۶۲۱۷/۱	۶۵۰۷/۶	۶۶۳۶/۷	۶۲۸۲/۸	۶۲۸۴/۲	هر دو
۷۲۳۰/۸	۷۲۵۳/۸	۷۱۸۴/۲	۷۲۰۳/۱	۸۲۰۴/۷	۸۳۹۳/۷	۸۲۵۲/۸	۸۲۷۱/۴	زنان
۵۳۳۴/۱	۵۳۶۲/۱	۵۳۹۸/۳	۵۴۶۵/۱	۴۷۱۷/۷	۴۸۴۴	۴۷۲۳	۴۷۵۲/۷	مردان




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۱۰۱۸/۴	۱۱۳۵۹/۲	۱۱۴۴۹/۸	۱۰۷۴۶
زنان	۱۰۵۰۰/۶	۱۰۸۳۱/۵	۱۱۰۵۱/۷	۱۰۴۴۹
مردان	۱۱۴۳۴/۳	۱۱۷۶۹/۴	۱۱۸۱۶/۱	۱۱۰۴۶/۴




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۹۴۵۲/۴	۸۳۳۰/۸	۹۳۲۱	۸۶۸۳/۵
زنان	۷۶۶۶	۶۸۲۹/۵	۷۶۷۷/۷	۷۵۸۶/۴
مردان	۱۰۸۳۸	۹۵۱۵/۳	۱۰۹۷۰/۳	۹۸۳۷/۳



جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۸۵۰۵/۹	۸۷۰۴	۹۳۸۴/۴	۸۹۵۲
زنان	۹۵۵۱/۱	۹۹۵۳	۱۰۶۹۵/۴	۹۸۴۷/۸
مردان	۷۶۸۴/۴	۷۷۳۸/۴	۸۱۴۵/۷	۸۰۳۰/۲




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۷۹۶۰/۵	۷۱۷۷	۷۰۳۰/۹	۷۶۰۲/۶
زنان	۹۰۶۰/۳	۷۹۱۰/۱	۷۷۳۲/۵	۸۵۴۰/۹
مردان	۷۰۸۷/۸	۶۵۹۱/۸	۶۳۸۳	۶۶۶۷/۶




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۵۵۸۱/۹	۵۴۹۰/۳	۵۳۴۳/۶	۵۲۹۵/۹
زنان	۵۸۳۰/۳	۵۷۷۱/۹	۵۶۲۱/۴	۵۵۵۹/۵
مردان	۵۳۶۹/۲	۵۲۷۳/۶	۵۱۱۱/۱	۵۰۵۰/۳




Mental disorders
Female Male




Ischemic heart disease
Female Male




Falls
Female Male




Chronic obstructive pulmonary disease
Female Male



Stroke
Female Male



Alzheimer's disease and other dementias
Female Male



سیمای سلامت سالمندان

استان کهگیلویه و بویراحمد

میزان مرگ و شیوع بیماری ها



سیمای سلامت سالمندان

استان کهگیلویه و بویراحمد

(میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها در کل جمعیت، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (کمتر از ۶۰ سال) ساکن در استان کهگیلویه و بویراحمد و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس و گروه‌های سنی بیان شده است. به منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی حاوی: اطلاعات مقایسه‌ای با شاخص کل کشور و مقایسه با استان‌های مجاور استان کهگیلویه و بویراحمد شامل: استان‌های بوشهر، چهارمحال و بختیاری، فارس، اصفهان و خوزستان نیز تدوین و ترسیم شده است.

آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر این مطلب است که شایع‌ترین علل مرگ در سالمندان ساکن استان کهگیلویه و بویراحمد (هر دو جنس) براساس میزان در سال ۲۰۱۷، به ترتیب بیماری‌های غیرواگیر، سوانح و حوادث و بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای است. این شاخص در افراد غیر سالمند ساکن استان کهگیلویه و بویراحمد دارای الگویی مشابه با سالمندان است. روند زمانی تعداد مرگ به علت هر سه دسته اصلی بیماری‌ها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ در حال افزایش است. سالمندان ساکن در استان کهگیلویه و بویراحمد و در سال ۲۰۱۷ از لحاظ میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت هر سه دسته اصلی بیماری‌ها از میانگین کشوری پایین‌تر هستند.

سالمندان ساکن استان کهگیلویه و بویراحمد، بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ از بین علل مختلف مرگ در بیماری‌های قلبی-عروقی (زنان در سال ۲۰۱۷)، سرطان‌ها (زنان در سال ۲۰۱۰) و سوانح غیرعمدی (زنان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) واجد رتبه‌ی ده و یا کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

از نظر شیوع مشکلات سلامتی در سالمندان ساکن استان کهگیلویه و بویراحمد، این گروه جمعیتی در بیماری‌های سرطان‌ها (زنان ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، اختلالات عصبی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۷ و نیز زنان در سال ۲۰۱۷)، سوانح حمل و نقل (زنان در سال ۲۰۱۷) و سوانح غیر عمدی (زنان در سال ۲۰۱۰ و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) یکی از ده استان دارای بالاترین شیوع در کل کشور بوده‌اند.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، سکته، عفونت‌های تنفسی تحتانی و افتادن کاهشی و برای بیماری آلزایمر و دیابت نوع دو افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری دیابت نوع دو در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر بوده است. میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری آلزایمر در مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر بوده است. میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت افتادن در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ بیشتر بوده است.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع به علت مشکلات سلامتی در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) اختلالات اضطرابی، بیماری ایسکمیک قلب و بیماری آلزایمر کاهشی و برای اختلالات افسردگی، افتادن، بیماری مزمن انسدادی ریه و سکته افزایشی است. میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع برای بیماری ایسکمیک قلب در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان کهگیلویه و بویراحمد و نیز برای بیماری‌های مزمن انسدادی ریه در زنان در سال ۲۰۱۷ نسبت به تمام استان‌های مجاور کمتر بوده است. میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع برای بیماری آلزایمر در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان کهگیلویه و بویراحمد در سال ۲۰۱۷ نسبت به تمام استان‌های مجاور بیشتر بوده است.




تعداد و میزان^۱ مرگ به تفکیک گروه سنی در سال ۲۰۱۷ در استان

گروه سنی	جنسیت	همه علل		بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای		بیماری‌های غیرواگیر		سوانح و حوادث	
		تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان
همه سنین	هر دو	۲۷۷۳	۳۸۰/۷	۱۸۱	۲۴/۸	۲۱۲۲	۲۹۱/۳	۴۷۰	۶۴/۶
	زنان	۱۱۳۹	۳۱۸/۵	۷۹	۲۲/۲	۹۳۲	۲۶۰/۴	۱۲۸	۳۵/۸
	مردان	۱۶۳۳	۴۴۰/۸	۱۰۱	۲۷/۳	۱۱۹۰	۳۲۱/۱	۳۴۲	۹۲/۴
کمتر از ۶۰ سال	هر دو	۱۱۳۹	۱۶۸/۴	۱۳۷	۲۰/۳	۵۸۸	۸۶/۹	۴۱۴	۶۱/۳
	زنان	۴۱۳	۱۲۳/۹	۶۲	۱۸/۵	۲۴۳	۷۲/۹	۱۰۸	۳۲/۵
	مردان	۷۲۷	۲۱۱/۶	۷۵	۲۱/۹	۳۴۵	۱۰۰/۵	۳۰۶	۸۹/۲
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۶۳۴	۳۱۴۱/۷	۴۴	۸۳/۸	۱۵۳۴	۲۹۵۰	۵۶	۱۰۷/۹
	زنان	۷۲۷	۲۹۳۴/۶	۱۸	۷۱/۵	۶۸۹	۲۷۸۱/۹	۲۰	۸۱/۲
	مردان	۹۰۷	۳۳۲۹/۹	۲۶	۹۴/۹	۸۴۵	۳۱۰۲/۹	۳۶	۱۳۲/۱
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۱۴۰	۷۸۳/۸	۳	۱۸	۱۲۶	۷۰۵/۲	۱۱	۶۰/۶
	زنان	۶۳	۷۰۰/۵	۱	۱۵/۴	۵۸	۶۴۶/۲	۴	۳۸/۹
	مردان	۷۷	۸۶۹/۲	۲	۲۰/۶	۶۷	۷۶۵/۷	۷	۸۲/۹
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۱۴۹	۱۲۰۳/۴	۳	۲۶/۳	۱۳۷	۱۱۱۰/۲	۸	۶۶/۹
	زنان	۷۷	۱۲۱۴/۷	۲	۲۴/۹	۷۲	۱۱۳۶/۹	۳	۵۲/۸
	مردان	۷۱	۱۱۹۱/۴	۲	۲۷/۸	۶۵	۱۰۸۱/۸	۵	۸۱/۸
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۱۴۵	۱۹۶۰/۲	۳	۴۴/۳	۱۳۶	۱۸۳۱/۷	۶	۸۴/۲
	زنان	۶۷	۱۹۸۷/۶	۱	۴۱/۹	۶۴	۱۸۸۰/۵	۲	۶۵/۲
	مردان	۷۸	۱۹۳۷/۱	۲	۴۶/۳	۷۲	۱۷۹۰/۶	۴	۱۰۰/۲
۷۵ تا ۷۹ سال	هر دو	۲۲۰	۳۸۷۹/۴	۵	۹۱	۲۰۷	۳۶۵۵/۶	۸	۱۳۲/۸
	زنان	۹۲	۳۷۵۶/۶	۲	۸۳/۱	۸۷	۳۵۷۴/۴	۲	۹۹/۱
	مردان	۱۲۸	۳۹۷۲/۴	۳	۹۶/۹	۱۲۰	۳۷۱۷/۱	۵	۱۵۸/۴
۸۰ سال و بالاتر	هر دو	۹۸۰	۱۱۲۱۹/۵	۲۹	۳۲۸/۱	۹۲۸	۱۰۶۲۵/۱	۲۳	۲۶۶/۲
	زنان	۴۲۷	۱۲۰۴۶/۲	۱۱	۳۱۸/۴	۴۰۷	۱۱۴۸۴/۹	۹	۲۴۲/۹
	مردان	۵۵۳	۱۰۶۵۴/۶	۱۷	۳۳۴/۸	۵۲۱	۱۰۰۳۷/۷	۱۵	۲۸۲/۱

امید زندگی (سال) در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ در استان

جنسیت	بدو تولد		۶۰ تا ۶۴ سال		۶۵ تا ۶۹ سال		۷۰ تا ۷۴ سال		۷۵ تا ۷۹ سال		۸۰ سال و بالاتر	
	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰
زنان	۶۷/۱	۸۲/۵	۱۶/۶	۲۵/۷	۱۳/۱	۲۱/۳	۱۰/۶	۱۷/۲	۹/۲	۱۳/۲	۸/۶	۱۰/۳
مردان	۶۵/۸	۷۶/۹	۱۵/۴	۲۲/۶	۱۲	۱۸/۶	۹/۶	۱۴/۷	۸/۶	۱۱/۱	۸	۸/۳

روند زمانی تعداد در مقابل میزان استاندارد شده سنی مرگ در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سطح ملی و استان



^۱ در این گزارش تمامی میزان‌ها در ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت گزارش شده‌اند.




میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

علت ^۲	زنان								مردان							
	۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷		۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷	
	میزان	رتبه ^۳	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه
بیماری‌های قلبی-عروقی	۲۵۸۳/۷	۲۵	۲۰۸۲/۳	۲۵	۲۱۳۰/۱	۱۴	۲۱۵۵/۹	۹	۲۵۶۸/۸	۲۷	۱۸۹۱/۶	۲۹	۱۸۷۸/۷	۲۶	۱۸۲۰/۶	۲۷
سرطان‌ها	۳۴۲/۶	۲۰	۳۰۶	۲۰	۴۲۹/۱	۸	۴۱۳/۶	۱۳	۵۵۹/۸	۲۶	۴۳۷/۷	۲۵	۵۶۲/۵	۲۰	۵۶۰/۷	۲۶
اختلالات عصبی	۱۸۴/۹	۳۰	۱۷۳/۴	۳۰	۲۷۴/۹	۲۸	۳۰۱/۲	۲۹	۱۷۷/۳	۳۰	۱۴۶/۳	۳۰	۲۰۶/۵	۲۸	۲۴۵	۳۱
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۱۰۱/۴	۳۱	۸۸/۷	۳۱	۱۱۳/۲	۳۱	۱۳۱/۸	۳۱	۱۱۲/۵	۳۱	۸۷/۸	۳۱	۱۱۴/۹	۳۱	۱۲۹/۳	۳۱
بیماری‌های مزمن تنفسی	۱۰۱/۳	۲۹	۸۶/۱	۳۰	۹۰/۲	۳۰	۸۴/۶	۳۱	۱۹۳/۱	۲۷	۱۳۲	۲۹	۱۳۰	۲۹	۱۲۷/۸	۲۹
بیماری‌های گوارشی	۸۷/۵	۲۵	۶۲/۳	۲۶	۷۸	۲۴	۷۰/۸	۲۴	۱۱۸/۲	۲۳	۷۶	۲۵	۸۷/۳	۲۲	۸۳/۸	۲۸
سوانح حمل و نقل	۴۳/۴	۲۴	۳۷/۱	۲۵	۳۸	۲۴	۳۴	۲۲	۱۰۷	۲۷	۷۸/۸	۲۸	۷۵/۹	۲۷	۶۷	۲۶
سوانح غیرعمدی	۵۸	۸	۴۵/۹	۷	۴۷/۸	۶	۴۴/۲	۷	۶۸/۸	۲۴	۵۱/۲	۲۵	۵۰/۹	۲۴	۴۹/۹	۲۴

میزان استاندارد شده سنی **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

مشکل سلامتی	زنان								مردان							
	۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷		۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷	
	میزان	رتبه ^۴	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه
بیماری‌های قلبی-عروقی	۳۱۱۱۴/۲	۲۹	۳۰۶۸/۹	۳۱	۳۱۰۰۷/۸	۲۹	۳۱۶۶۷/۵	۲۸	۳۰۲۴۵/۳	۲۹	۲۹۹۸۵/۲	۳۰	۳۰۶۱۹/۲	۲۸	۳۰۵۰۰/۱	۲۶
سرطان‌ها	۱۲۴۱/۲	۱۹	۱۴۰۸/۵	۱۲	۲۳۳۳/۹	۶	۲۴۲۴/۷	۹	۱۵۶۰/۶	۲۹	۱۷۲۲/۹	۲۷	۲۷۴۵/۱	۲۶	۳۰۷۸/۲	۲۹
اختلالات عصبی	۵۷۲۶۱/۵	۱۰	۵۷۶۲۱/۵	۷	۵۸۲۲۵/۹	۶	۵۸۲۲۹/۹	۷	۵۱۲۸۸/۳	۱۰	۵۲۰۰۵	۱۰	۵۲۱۶۴/۴	۷	۵۲۱۴۱/۵	۱۴
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۴۴۸۱۷/۳	۳۱	۴۵۲۲۴/۸	۳۱	۴۷۶۴۴/۳	۳۱	۵۳۹۵۸/۸	۳۱	۳۶۰۸۱/۴	۳۱	۳۶۶۶۷	۳۱	۳۸۲۳۵/۴	۳۱	۴۳۱۴۰/۹	۳۰
بیماری‌های مزمن تنفسی	۱۳۷۳۶/۶	۲۹	۱۳۲۵۰/۳	۳۰	۱۴۲۷۷/۶	۲۸	۱۴۳۵۹/۶	۲۸	۱۱۷۷۵/۲	۲۹	۱۰۴۵۰/۶	۲۹	۱۰۶۶۲/۶	۲۹	۱۱۷۵۱/۸	۲۸
بیماری‌های گوارشی	۴۶۱۹۲/۶	۲۶	۴۷۳۳۳/۷	۲۷	۵۰۷۴۷/۵	۲۸	۵۲۶۶۱/۷	۲۹	۵۷۳۵۳/۶	۲۴	۵۹۲۷۶/۱	۲۷	۶۲۷۷۶/۸	۲۸	۶۶۱۱۲/۲	۲۹
سوانح حمل و نقل	۶۹۱۷/۶	۲۴	۶۶۲۰/۵	۲۳	۷۱۳۵/۶	۱۸	۶۲۸۸/۵	۹	۱۰۹۹۵/۴	۲۷	۱۰۶۰۵/۶	۲۷	۱۰۷۹۷/۵	۲۳	۹۴۹۷/۱	۱۵
سوانح غیرعمدی	۲۲۹۷۹/۸	۱۵	۲۰۱۷۴	۱۲	۲۲۰۶۵/۵	۷	۲۲۰۳۹/۸	۱۲	۳۴۰۳۶	۹	۲۹۷۴۸/۷	۱۱	۳۲۸۶۳/۹	۱۰	۳۱۱۲۳/۳	۸

میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی و **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سال ۲۰۱۷ در سطح ملی و استان




^۲ علل براساس میزان استاندارد شده سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ و هر دو جنسیت در سطح ملی مرتب شده‌اند.


^۳ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی مرگ به تفکیک علت، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.

^۴ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی شیوع به تفکیک مشکل سلامتی، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.







جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۶۰۹/۸	۱۲۹۲	۱۲۹۱/۸	۱۲۹۹/۶
زنان	۱۵۳۰/۲	۱۲۹۹/۴	۱۳۴۵/۱	۱۴۲۲/۶
مردان	۱۶۹۵/۲	۱۲۷۴/۹	۱۲۳۳/۵	۱۲۰۷/۴




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۶۷۵/۷	۴۷۹/۷	۴۴۷/۱	۴۲۳/۵
زنان	۷۰۱	۵۲۰/۱	۴۷۲/۶	۴۵۲
مردان	۶۴۶	۴۳۹/۶	۴۲۱/۲	۳۹۹/۴




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۶۰/۲	۱۴۰/۹	۲۰۹	۲۳۷/۵
زنان	۱۶۸	۱۵۶/۸	۲۵۰/۳	۲۷۵/۶
مردان	۱۵۰	۱۲۲	۱۷۲/۳	۲۰۸/۳



جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۳	۱۴/۶	۲۳/۱	۳۱/۲
زنان	۱۲/۴	۱۵/۳	۲۳/۳	۳۳/۲
مردان	۱۴	۱۴/۱	۲۲/۹	۲۹/۵




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۶۶/۸	۵۱/۷	۵۶/۷	۵۸/۷
زنان	۶۲/۵	۴۹/۷	۵۳/۷	۵۵/۱
مردان	۷۲	۵۳/۷	۵۹	۶۱/۵




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۶/۳	۲۲/۶	۲۳	۲۲/۱
زنان	۲۳/۱	۲۰/۴	۲۱/۵	۲۰/۳
مردان	۲۹/۳	۲۴/۲	۲۴/۲	۲۳/۷




Ischemic heart disease




Stroke




Alzheimer's disease and other dementias




Diabetes mellitus type 2





Lower respiratory infections





Falls







اختلالات افسردگی				اختلالات اضطرابی				جنسیت
۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	
۶۲۸۳/۸	۶۱۴۱/۳	۶۰۱۰/۹	۶۱۶۰/۱	۶۳۸۲/۹	۶۵۰۱/۹	۶۳۰۲/۶	۶۴۷۳/۹	هر دو
۷۳۹۸	۷۲۷۰/۷	۷۱۲۶/۲	۷۱۸۵/۳	۸۲۰۴/۷	۸۳۹۳/۷	۸۲۵۲/۸	۸۲۷۱/۴	زنان
۵۲۴۵/۶	۵۱۴۰/۳	۵۱۱۷/۳	۵۱۹۵/۲	۴۷۱۷/۷	۴۸۴۴	۴۷۲۳	۴۷۵۲/۷	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۹۵۷۲/۳	۱۰۲۶۲/۴	۱۰۰۰۹/۳	۹۶۵۷	هر دو
۹۳۱۹	۹۹۵۸/۹	۹۶۸۴/۷	۹۳۷۶/۳	زنان
۹۷۹۶/۳	۱۰۵۲۵/۳	۱۰۲۸۹/۹	۹۹۳۹/۹	مردان



۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۹۲۴۲/۸	۱۰۰۶۸/۴	۸۴۰۶/۱	۸۹۲۸/۷	هر دو
۷۶۲۶/۵	۷۸۳۱	۶۶۵۹/۷	۷۰۸۹	زنان
۱۰۷۰۰/۱	۱۲۰۰۳/۱	۹۸۳۸/۹	۱۰۷۲۶/۲	مردان







۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۷۰۸۵/۸	۶۴۹۳/۶	۵۷۹۶/۴	۵۹۷۰/۹	هر دو
۸۰۳۸/۲	۷۵۷۸	۶۵۸۷	۶۵۴۳/۳	زنان
۶۲۴۰/۶	۵۵۸۲/۸	۵۱۴۳/۴	۵۴۰۹/۴	مردان



۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۷۲۳۳/۷	۶۵۹۱	۶۲۹۴/۵	۷۲۰۶/۸	هر دو
۸۱۶۰/۲	۷۱۷۱/۳	۶۹۹۹/۳	۸۰۵۲	زنان
۶۴۴۰/۹	۶۰۸۴/۳	۵۶۸۸/۸	۶۳۱۳/۶	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۵۳۲۵/۹	۵۳۹۵/۴	۵۵۹۴/۵	۵۷۰۱/۷	هر دو
۵۶۳۲/۳	۵۶۹۷/۲	۵۸۶۴/۱	۵۹۲۴/۷	زنان
۵۰۸۶/۴	۵۱۵۲/۲	۵۲۳۴/۶	۵۴۳۹/۴	مردان





سیمای سلامت سالمندان

استان گلستان

میزان مرگ و شیوع بیماری ها



سیمای سلامت سالمندان

استان گلستان

(میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها در کل جمعیت، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (کمتر از ۶۰ سال) ساکن در استان گلستان و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس و گروه‌های سنی بیان شده است. به منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی حاوی: اطلاعات مقایسه‌ای با شاخص کل کشور و مقایسه با استان‌های مجاور استان گلستان شامل: استان‌های خراسان شمالی، مازندران و سمنان نیز تدوین و ترسیم شده است.

آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر این مطلب است که شایع‌ترین علل مرگ در سالمندان ساکن استان گلستان (هر دو جنس) براساس میزان در سال ۲۰۱۷، به ترتیب بیماری‌های غیرواگیر، سوانح و حوادث و بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای است. این شاخص در افراد غیر سالمند ساکن استان گلستان دارای الگویی مشابه سالمندان است.

روند زمانی تعداد مرگ به علت هر سه دسته اصلی بیماری‌ها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ در حال افزایش است. سالمندان ساکن در استان گلستان و در سال ۲۰۱۷ از لحاظ میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت هر سه دسته بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای، بیماری‌های غیرواگیر و سوانح و حوادث از میانگین کشوری بالاتر هستند.

سالمندان ساکن استان گلستان، از بین علل مختلف مرگ در بیماری‌های قلبی-عروقی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، سرطان‌ها (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، اختلالات عصبی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، دیابت و بیماری‌های کلیوی (زنان و مردان در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۰)، بیماری‌های مزمن تنفسی (زنان و مردان در سال ۲۰۱۷ و زنان در سال ۱۹۹۰)، بیماری‌های گوارشی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، سوانح حمل و نقل (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۷ و مردان در سال ۲۰۱۰) و سوانح غیرعمدی (مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) واجد رتبه‌ی ده و کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

از نظر شیوع مشکلات سلامتی مختلف در سالمندان ساکن استان گلستان، این گروه جمعیتی در بیماری‌های قلبی-عروقی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، سرطان‌ها (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ و زنان در سال ۲۰۱۷)، اختلالات عصبی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، دیابت و بیماری‌های کلیوی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۷) و ۲۰۱۷ و مردان در سال ۲۰۱۰)، بیماری‌های مزمن تنفسی (زنان و مردان در سال‌های ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) و بیماری‌های گوارشی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) واجد رتبه‌ی ده و کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، سکته، عفونت‌های تنفسی تحتانی و افتادن کاهشی و برای بیماری آلزایمر و دیابت نوع دو افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری ایسکمیک قلب و سکته در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان گلستان نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ بیشتر بوده است. میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت افتادن در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان گلستان نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر بوده است.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع به علت مشکلات سلامتی در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، افتادن، سکته و بیماری آلزایمر کاهشی و برای اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی و بیماری مزمن انسدادی ریه افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع برای مشکلات سلامتی افتادن در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان گلستان نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر و برای سکته و بیماری آلزایمر بیشتر بوده است. میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع برای اختلالات روانی در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان گلستان نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر بوده است.




تعداد و میزان^۱ مرگ به تفکیک گروه سنی در سال ۲۰۱۷ در استان

گروه سنی	جنسیت	همه علل		بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای		بیماری‌های غیرواگیر		سوانح و حوادث	
		تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان
همه سنین	هر دو	۹۵۶۳	۴۹۷/۶	۵۶۵	۲۹/۴	۷۸۹۲	۴۱۰/۷	۱۱۰۵	۵۷/۵
	زنان	۴۱۷۱	۴۳۶/۴	۲۴۴	۲۵/۵	۳۶۳۵	۳۸۰/۴	۲۹۲	۳۰/۵
	مردان	۵۳۹۲	۵۵۸/۱	۳۲۱	۳۳/۳	۴۲۵۷	۴۴۰/۷	۸۱۴	۸۴/۲
کمتر از ۶۰ سال	هر دو	۳۳۴۸	۱۸۹/۳	۳۹۳	۲۲/۲	۲۰۵۷	۱۱۶/۳	۸۹۸	۵۰/۸
	زنان	۱۲۳۱	۱۴۰/۵	۱۷۰	۱۹/۵	۸۴۰	۹۵/۹	۲۲۱	۲۵/۲
	مردان	۲۱۱۷	۲۳۷/۲	۲۲۳	۲۵	۱۲۱۷	۱۳۶/۳	۶۷۷	۷۵/۹
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۶۲۱۵	۴۰۵۷/۶	۱۷۲	۱۱۲/۳	۵۸۳۵	۳۸۰۹/۷	۲۰۸	۱۳۵/۵
	زنان	۲۹۴۰	۳۶۹۵/۵	۷۴	۹۲/۶	۲۷۹۵	۳۵۱۳/۳	۷۱	۸۹/۶
	مردان	۳۲۷۵	۴۴۴۸/۸	۹۸	۱۳۳/۷	۳۰۴۱	۴۱۳۰	۱۳۶	۱۸۵/۲
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۸۴۴	۱۴۳/۸	۲۳	۳۸/۸	۷۶۷	۱۳۰۶/۱	۵۵	۹۳/۱
	زنان	۳۸۳	۱۲۷۹/۷	۱۰	۳۳/۷	۳۵۵	۱۱۸۵/۲	۱۸	۶۰/۸
	مردان	۴۶۱	۱۶۰۲/۵	۱۳	۴۴	۴۱۲	۱۴۳۱/۸	۳۶	۱۲۶/۷
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۸۸۳	۲۳۸۸/۶	۲۲	۵۹/۴	۸۱۹	۲۲۱۵/۸	۴۲	۱۱۳/۴
	زنان	۴۲۶	۲۰۸۵/۶	۱۰	۴۸/۸	۴۰۱	۱۹۶۵/۴	۱۵	۷۱/۴
	مردان	۴۵۷	۲۷۶۲/۵	۱۲	۷۲/۴	۴۱۸	۲۵۲۴/۸	۲۷	۱۶۵/۳
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۸۶۶	۳۶۳/۹	۲۲	۹۲/۷	۸۱۲	۳۴۱۳/۶	۳۲	۱۳۲/۶
	زنان	۴۱۱	۳۲۳۰	۱۰	۷۶/۵	۳۹۱	۳۰۶۹/۶	۱۱	۸۳/۹
	مردان	۴۵۴	۴۱۱۰/۳	۱۲	۱۱۱/۳	۴۲۱	۳۸۱۰/۲	۲۱	۱۸۸/۹
۷۵ تا ۷۹ سال	هر دو	۹۸۹	۶۲۲۸/۳	۲۶	۱۶۱/۴	۹۳۵	۵۸۹۰/۵	۲۸	۱۷۶/۳
	زنان	۴۵۹	۵۸۰۴/۴	۱۱	۱۳۵/۵	۴۲۹	۵۵۵۲/۸	۹	۱۱۶
	مردان	۵۲۹	۶۶۴۹/۵	۱۵	۱۸۷/۲	۴۹۶	۶۲۲۶	۱۹	۲۳۶/۳
۸۰ سال و بالاتر	هر دو	۲۶۳۳	۱۴۷۸۱/۳	۸۰	۴۴۷/۲	۲۵۰۲	۱۴۰۴۵/۲	۵۱	۲۸۹
	زنان	۱۲۶۰	۱۴۷۳۹/۸	۳۳	۳۸۷/۵	۱۲۰۸	۱۴۱۳۴/۵	۱۹	۲۱۷/۸
	مردان	۱۳۷۳	۱۴۸۱۹/۷	۴۷	۵۰۲/۳	۱۲۹۴	۱۳۹۶۲/۸	۳۳	۳۵۴/۶

امید زندگی (سال) در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ در استان

جنسیت	بدو تولد		۶۰ تا ۶۴ سال		۶۵ تا ۶۹ سال		۷۰ تا ۷۴ سال		۷۵ تا ۷۹ سال		۸۰ سال و بالاتر	
	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰
زنان	۶۶/۸	۷۶/۴	۱۵/۶	۲۰/۶	۱۱/۸	۱۶/۸	۸/۵	۱۳/۴	۶	۱۰/۳	۵/۲	۷/۶
مردان	۶۴/۵	۷۰/۳	۱۵/۳	۱۷/۵	۱۱/۵	۱۴/۳	۸/۷	۱۱/۳	۵/۹	۸/۶	۵/۶	۶/۱

روند زمانی تعداد در مقابل میزان استاندارد شده سنی مرگ در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سطح ملی و استان



^۱ در این گزارش تمامی میزان‌ها در ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت گزارش شده‌اند.




میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

علت ^۲	زنان								مردان							
	۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷		۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷	
	میزان	رتبه ^۳	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه
بیماری‌های قلبی-عروقی	۴۱۷۱/۳	۱	۳۱۹۳/۶	۲	۲۳۸۵/۹	۲	۲۹۰۴/۹	۱	۳۸۳۴/۱	۲	۳۰۹۶/۱	۳	۲۷۵۷/۶	۱	۳۰۰۷	۱
سرطان‌ها	۵۵۷/۸	۲	۴۵۷/۵	۲	۴۵۸/۱	۴	۵۰۰/۷	۶	۸۳۲/۴	۴	۶۹۵/۳	۲	۷۲۸/۴	۶	۸۰۴/۵	۶
اختلالات عصبی	۳۴۸	۹	۲۹۸/۶	۱۰	۳۶۸/۲	۱۰	۴۲۶/۴	۸	۳۱۰/۸	۸	۲۶۷/۲	۵	۳۱۳/۴	۶	۳۹۳	۶
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۲۱۹/۹	۱۱	۱۹۳/۱	۱۲	۲۳۶	۱۱	۳۴۹/۳	۳	۱۸۸/۴	۱۵	۱۶۸/۴	۱۴	۲۴۳/۲	۹	۳۱۲	۳
بیماری‌های مزمن تنفسی	۲۳۵/۹	۱۰	۱۹۸/۱	۱۱	۱۷۳/۸	۱۱	۱۹۱/۴	۷	۳۳۵	۱۲	۲۵۴/۳	۱۳	۲۳۶/۴	۱۲	۲۶۴/۷	۸
بیماری‌های گوارشی	۱۷۵/۸	۳	۱۲۲	۳	۱۲۵/۲	۳	۱۱۷/۱	۳	۲۱۹/۵	۴	۱۵۳/۳	۴	۱۴۹/۳	۳	۱۴۲/۶	۳
سوانح حمل و نقل	۶۸/۲	۶	۵۷/۳	۷	۴۴/۱	۱۷	۴۹/۱	۴	۱۹۷/۹	۶	۱۶۶	۶	۱۲۳/۷	۷	۱۱۸	۳
سوانح غیرعمدی	۵۶/۵	۱۲	۴۲/۷	۱۳	۳۷/۷	۲۲	۳۸/۳	۱۳	۹۰/۷	۸	۷۲/۲	۵	۶۳/۹	۵	۶۵/۹	۶

میزان استاندارد شده سنی **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

مشکل سلامتی	زنان								مردان							
	۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷		۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷	
	میزان	رتبه ^۴	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه
بیماری‌های قلبی-عروقی	۳۴۹۸۶/۴	۱	۳۴۱۵۸/۸	۱	۳۳۵۴۹/۴	۲	۳۴۸۳۲/۵	۲	۳۲۷۸۳/۴	۱	۳۳۹۵۸/۸	۱	۳۴۱۶۴	۱	۳۳۹۵۹/۷	۱
سرطان‌ها	۱۵۴۹	۴	۱۶۱۵/۱	۴	۲۲۶۰/۸	۸	۲۵۲۸/۴	۴	۲۱۱۵/۹	۷	۲۳۸۱/۹	۸	۳۱۷۵/۲	۸	۳۵۱۳	۱۸
اختلالات عصبی	۵۷۲۷۳	۵	۵۷۶۲۴/۹	۵	۵۸۲۲۱/۹	۸	۵۸۲۳۸/۸	۳	۵۱۳۰۰/۸	۷	۵۲۰۳۳/۵	۵	۵۲۱۵۹/۷	۱۰	۵۲۱۶۹/۶	۳
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۵۰۴۱۱/۸	۵	۵۱۲۲۷/۳	۶	۵۱۵۵۱/۳	۱۵	۵۹۲۱۰/۹	۸	۴۲۶۴۲/۷	۵	۴۳۶۵۵/۲	۵	۴۴۳۸۴/۹	۸	۴۹۷۶۲/۴	۶
بیماری‌های مزمن تنفسی	۱۶۹۰۱/۶	۱۱	۱۷۳۶۵/۱	۸	۱۷۱۴۳/۹	۱۰	۱۶۱۸۹/۶	۸	۱۴۲۴۲/۶	۱۵	۱۴۰۶۴/۸	۹	۱۳۶۵۸/۵	۹	۱۳۵۴۰/۷	۸
بیماری‌های گوارشی	۴۷۳۵۲/۶	۵	۴۸۴۸۱/۶	۵	۵۱۷۵۹/۴	۵	۵۳۵۸۱/۱	۵	۵۸۲۷۹/۲	۶	۶۰۴۲۱/۸	۳	۶۳۸۸۸/۴	۳	۶۶۹۳۴/۵	۵
سوانح حمل و نقل	۷۲۱۶/۸	۱۹	۶۶۹۵/۵	۲۱	۶۵۸۳/۲	۲۶	۵۹۱۷/۳	۲۶	۱۱۹۸۴	۱۶	۱۱۸۲۹/۹	۱۳	۱۱۰۶۷/۱	۲۱	۹۲۱۷	۲۳
سوانح غیرعمدی	۲۱۵۱۲/۸	۲۶	۱۸۷۸۹/۵	۲۸	۲۰۰۱۳/۹	۳۰	۲۱۲۲۷/۸	۳۱	۳۱۷۵۵/۲	۲۰	۲۹۰۳۷/۹	۱۷	۳۲۰۷۰/۸	۱۵	۳۰۱۵۴/۵	۱۴

میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی و **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سال ۲۰۱۷ در سطح ملی و استان




^۲ علل براساس میزان استاندارد شده سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ و هر دو جنسیت در سطح ملی مرتب شده‌اند.


^۳ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی مرگ به تفکیک علت، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.

^۴ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی شیوع به تفکیک مشکل سلامتی، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.







جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۶۵۳/۶	۲۱۲۴	۱۵۱۴/۳	۱۷۹۲/۸
زنان	۲۶۳۲/۹	۲۰۶۶/۳	۱۳۳۸/۱	۱۷۱۱/۱
مردان	۲۶۵۵/۵	۲۱۷۰/۹	۱۶۹۱/۴	۱۸۸۵




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۱۲۲/۹	۸۲۶	۵۶۹	۶۶۷
زنان	۱۲۵۷/۵	۹۱۰/۶	۵۵۷/۷	۶۹۸/۲
مردان	۹۵۶/۱	۷۴۱/۲	۵۷۹/۱	۶۳۷/۳




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۹۱/۱	۲۴۷	۲۹۹/۵	۳۶۰/۴
زنان	۳۱۳/۹	۲۶۹/۶	۳۳۶/۱	۳۸۸
مردان	۲۶۲/۳	۲۲۳/۶	۲۶۳/۴	۳۳۳/۶



جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۴۷/۶	۵۱/۳	۴۷/۹	۸۳
زنان	۵۳/۳	۵۸/۹	۴۸/۴	۹۵
مردان	۴۲	۴۴/۳	۴۷/۳	۷۰/۴




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۸۸/۹	۷۰/۷	۷۱	۸۶/۵
زنان	۸۱/۹	۶۲/۷	۵۸	۷۲/۴
مردان	۹۶/۸	۷۷/۹	۸۴	۱۰۱




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۲	۲۰	۱۸/۶	۱۹/۴
زنان	۱۴/۲	۱۲/۶	۱۲/۶	۱۳/۴
مردان	۳۰/۲	۲۷	۲۴/۸	۲۵/۷




Ischemic heart disease




Stroke




Alzheimer's disease and other dementias




Diabetes mellitus type 2





Lower respiratory infections





Falls







اختلالات افسردگی				اختلالات اضطرابی				جنسیت
۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	
۶۳۶۷/۵	۶۲۴۹/۴	۶۰۷۱/۸	۶۱۴۸/۳	۶۵۲۹/۱	۶۶۷۰/۵	۶۳۹۸/۹	۶۴۵۵/۳	هر دو
۷۳۹۸/۴	۷۲۸۴/۹	۷۱۳۵/۷	۷۱۷۲	۸۲۰۴/۷	۸۳۹۳/۷	۸۲۵۲/۸	۸۲۷۱/۴	زنان
۵۲۴۶/۶	۵۱۴۱/۵	۵۱۱۰/۱	۵۲۰۲/۷	۴۷۱۷/۷	۴۸۴۴	۴۷۲۳	۴۷۵۲/۷	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۱۰۹۸۹	۱۱۶۴۹/۵	۱۱۷۳۴/۶	۱۱۳۸۵/۱	هر دو
۱۰۷۰۴/۳	۱۱۲۳۱/۷	۱۱۲۷۰/۶	۱۱۰۰۴/۳	زنان
۱۱۲۹۰/۴	۱۲۰۷۳/۱	۱۲۱۵۴/۷	۱۱۷۵۴/۹	مردان



۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۲۳۶/۸	۸۶۳۰/۷	۷۶۹۷/۴	۸۴۷۷/۶	هر دو
۷۰۱۸/۴	۶۵۰۹/۵	۵۷۵۵/۷	۶۳۴۵/۸	زنان
۹۵۴۳/۷	۱۰۸۴۳/۷	۹۴۶۱/۳	۱۰۵۳۵/۱	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۲۶۲/۳	۷۵۳۴/۸	۷۰۰۱/۱	۶۵۶۷	هر دو
۸۹۲۵/۶	۸۵۳۱/۳	۷۹۱۷/۳	۷۳۱۲/۸	زنان
۷۵۵۳/۴	۶۵۱۹/۴	۶۱۸۷/۵	۵۸۶۰/۱	مردان




۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۷۴۹/۲	۷۶۴۶/۷	۷۹۱۸/۷	۸۹۲۲/۳	هر دو
۹۸۲۶/۵	۸۰۲۶/۹	۸۷۸۴/۱	۱۰۴۹۶/۵	زنان
۷۶۱۶/۳	۷۲۴۶/۲	۷۱۲۴/۷	۷۳۱۷/۸	مردان


۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۵۳۲۶/۶	۵۳۷۸/۸	۵۵۳۵/۹	۵۶۲۳/۹	هر دو
۵۵۸۲/۶	۵۶۳۷/۱	۵۷۸۷/۱	۵۸۳۴/۵	زنان
۵۰۶۶/۴	۵۱۲۶/۴	۵۳۰۲/۹	۵۳۸۸/۵	مردان




Mental disorders
Female Male




Ischemic heart disease
Female Male




Falls
Female Male




Chronic obstructive pulmonary disease
Female Male



Stroke
Female Male



Alzheimer's disease and other dementias
Female Male



سیمای سلامت سالمندان

استان گیلان

میزان مرگ و شیوع بیماری ها



سیمای سلامت سالمندان

استان گیلان

(میزان میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها در کل جمعیت، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (کمتر از ۶۰ سال) ساکن در استان گیلان و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس و گروه‌های سنی بیان شده است. به منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی حاوی: اطلاعات مقایسه‌ای با شاخص کل کشور و مقایسه با استان‌های مجاور استان گیلان شامل: استان‌های اردبیل، مازندران، قزوین و زنجان نیز تدوین و ترسیم شده است.

آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر این مطلب است که شایع‌ترین علل مرگ در سالمندان ساکن استان گیلان (هر دو جنس) براساس میزان در سال ۲۰۱۷، به ترتیب بیماری‌های غیرواگیر، سوانح و حوادث و بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای است. این شاخص در افراد غیر سالمند ساکن استان گیلان دارای الگویی مشابه سالمندان است.

روند زمانی تعداد مرگ به علت بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای و بیماری‌های غیرواگیر از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ در حال افزایش است. سالمندان ساکن در استان گیلان و در سال ۲۰۱۷ از لحاظ میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری‌های غیرواگیر از میانگین کشوری بالاتر، از لحاظ بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای پایین‌تر و از لحاظ سوانح و حوادث برابر با میانگین کشوری هستند. لازم به ذکر است تغییر ناگهانی که در تعداد و میزان مرگ به علت سوانح و حوادث اتفاق افتاده به علت زمین لرزه رخ داده در خرداد سال ۱۳۶۹ در این استان است.

سالمندان ساکن استان گیلان از بین علل مختلف مرگ در بیماری‌های قلبی-عروقی (زنان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷ و مردان در سال‌های ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، اختلالات عصبی (مردان در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) و سوانح غیرعمدی (زنان و مردان در سال ۱۹۹۰) واجد رتبه‌ی ده و کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

از نظر شیوع مشکلات سلامتی مختلف در سالمندان ساکن استان گیلان، این گروه جمعیتی در بیماری‌های قلبی-عروقی (هر دو جنس در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، سرطان‌ها (مردان در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، بیماری‌های گوارشی (زنان در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷ و مردان در سال‌های ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) و سوانح غیرعمدی (زنان و مردان در سال ۱۹۹۰) واجد رتبه‌ی ده و کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، سکته و افتادن کاهشی و برای بیماری آلزایمر، دیابت نوع دو و عفونت‌های تنفسی تحتانی افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت افتادن در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان گیلان نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر و به علت آلزایمر و سکته بیشتر بوده است. میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت دیابت نوع دو در مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان گیلان نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ بیشتر بوده است.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای اختلالات اضطرابی، بیماری ایسکمیک قلب، سکته و بیماری آلزایمر کاهشی و در مقابل برای اختلالات افسردگی، افتادن و بیماری مزمن انسدادی ریه افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع به علت مشکلات سلامتی برای اختلالات روانی در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان گیلان نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر و برای بیماری ایسکمیک قلب و سکته بیشتر بوده است. میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع برای مشکلات سلامتی بیماری آلزایمر و افتادن در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان گیلان نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر بوده است.




تعداد و میزان^۱ مرگ به تفکیک گروه سنی در سال ۲۰۱۷ در استان

گروه سنی	جنسیت	همه علل		بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای		بیماری‌های غیرواگیر		سوانح و حوادث	
		تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان
همه سنین	هر دو	۱۶۲۶۷	۶۲۴/۶	۵۳۰	۲۰/۳	۱۴۳۸۸	۵۵۲/۵	۱۳۴۹	۵۱/۸
	زنان	۷۰۹۹	۵۴۷/۳	۲۲۶	۱۷/۴	۶۵۶۲	۵۰۵/۹	۳۱۱	۲۴
	مردان	۹۱۶۹	۷۰۱/۳	۳۰۴	۲۳/۳	۷۸۲۶	۵۹۸/۶	۱۰۳۸	۷۹/۴
کمتر از ۶۰ سال	هر دو	۳۷۰۴	۱۶۴/۵	۲۶۳	۱۱/۷	۲۴۷۶	۱۱۰	۹۶۶	۴۲/۹
	زنان	۱۲۰۵	۱۰۸	۱۰۹	۹/۸	۹۰۴	۸۱	۱۹۲	۱۷/۲
	مردان	۲۴۹۹	۲۲۰/۱	۱۵۴	۱۳/۵	۱۵۷۲	۱۳۸/۴	۷۷۴	۶۸/۲
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۲۵۶۳	۳۵۵۹/۴	۲۶۷	۷۵/۷	۱۱۹۱۳	۳۳۷۵/۱	۳۸۳	۱۰۸/۶
	زنان	۵۸۹۴	۳۲۵۲/۶	۱۱۷	۶۴/۵	۵۶۵۸	۳۱۲۲/۳	۱۱۹	۶۵/۸
	مردان	۶۶۶۹	۳۸۸۳	۱۵۰	۸۷/۶	۶۲۵۵	۳۶۴۱/۸	۲۶۴	۱۵۳/۷
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۱۱۹۲	۹۹۰/۳	۲۳	۱۹/۱	۱۰۹۳	۹۰۷/۹	۷۶	۶۳/۳
	زنان	۴۸۶	۷۹۲/۵	۹	۱۵	۴۵۵	۷۴۱/۷	۲۲	۳۵/۹
	مردان	۷۰۶	۱۱۹۵/۵	۱۴	۲۳/۳	۶۳۸	۱۰۸۰/۴	۵۴	۹۱/۸
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۱۳۷۶	۱۶۸۷/۲	۲۶	۳۱/۹	۱۲۸۲	۱۵۷۱/۸	۶۸	۸۳/۶
	زنان	۵۹۴	۱۳۹۴/۵	۱۱	۲۵/۵	۵۶۱	۱۳۱۸/۱	۲۲	۵۰/۹
	مردان	۷۸۲	۲۰۰۷/۲	۱۵	۳۸/۹	۷۲۱	۱۸۴۹/۲	۴۶	۱۱۹/۲
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۱۴۷۶	۲۷۱۳/۶	۲۹	۵۳/۹	۱۳۸۹	۲۵۵۴/۳	۵۷	۱۰۵/۳
	زنان	۶۴۱	۲۲۶۲/۲	۱۱	۴۰/۲	۶۱۳	۲۱۶۵/۷	۱۶	۵۶/۲
	مردان	۸۳۵	۳۲۰۳/۹	۱۸	۶۸/۹	۷۷۶	۲۹۷۶/۴	۴۱	۱۵۸/۷
۷۵ تا ۷۹ سال	هر دو	۲۰۱۹	۴۷۳۶/۷	۴۰	۹۴/۸	۱۹۲۰	۴۵۰۳/۳	۵۹	۱۳۸/۷
	زنان	۹۲۶	۴۳۲۱/۵	۱۷	۸۱/۵	۸۹۱	۴۱۵۸/۴	۱۷	۸۱/۶
	مردان	۱۰۹۳	۵۱۵۶/۵	۲۳	۱۰۸/۲	۱۰۲۹	۴۸۵۲	۴۲	۱۹۶/۴
۸۰ سال و بالاتر	هر دو	۶۵۰۰	۱۲۰۳۰/۳	۱۴۹	۲۷۵/۱	۶۲۲۹	۱۱۵۲۸/۶	۱۲۲	۲۲۶/۷
	زنان	۳۲۴۷	۱۱۷۷۶/۲	۶۸	۲۴۶/۵	۳۱۳۷	۱۱۳۷۶/۸	۴۲	۱۵۲/۹
	مردان	۳۲۵۳	۱۲۲۹۵/۳	۸۱	۳۰۴/۹	۳۰۹۲	۱۱۶۸۶/۹	۸۰	۳۰۳/۵

امید زندگی (سال) در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ در استان

جنسیت	بدو تولد		۶۰ تا ۶۴ سال		۶۵ تا ۶۹ سال		۷۰ تا ۷۴ سال		۷۵ تا ۷۹ سال		۸۰ سال و بالاتر	
	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰
زنان	۶۸/۶	۸۰/۲	۱۵/۹	۲۳/۶	۱۲/۲	۱۹/۴	۹/۲	۱۵/۵	۶/۶	۱۱/۹	۵/۵	۹
مردان	۶۴/۳	۷۴	۱۴/۱	۲۰/۲	۱۰/۷	۱۶/۴	۸	۱۳	۵/۵	۹/۸	۴/۹	۷/۳

روند زمانی تعداد در مقابل میزان استاندارد شده سنی مرگ در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سطح ملی و استان



^۱ در این گزارش تمامی میزان‌ها در ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت گزارش شده‌اند.




میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

علت ^۲	مردان								زنان							
	۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰		۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰	
	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه ^۳	میزان
بیماری‌های قلبی-عروقی	۵	۲۳۲۵/۶	۲	۲۴۶۷/۲	۱۰	۲۶۸۴/۷	۱۷	۲۹۷۸/۳	۶	۲۱۷۴/۳	۴	۲۳۶۷/۵	۸	۲۶۷۵/۲	۱۰	۳۰۳۳/۲
سرطان‌ها	۱۱	۶۸۶/۶	۱۴	۵۹۸/۴	۲۰	۴۵۹/۶	۲۵	۵۶۲/۷	۲۱	۳۷۱/۳	۲۶	۳۵۲/۸	۲۴	۲۶۹/۶	۲۵	۳۱۵
اختلالات عصبی	۹	۳۵۸/۵	۱۰	۲۸۹/۲	۱۹	۲۱۲/۸	۲۳	۲۳۵/۱	۱۴	۳۸۶/۲	۱۵	۳۵۱/۶	۱۸	۲۳۸/۷	۲۲	۲۵۸/۳
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۱۶	۲۳۰	۱۹	۱۸۵/۵	۲۲	۱۳۳/۴	۲۷	۱۳۲/۵	۱۳	۲۶۹/۸	۱۴	۲۰۹	۱۴	۱۷۱/۷	۲۰	۱۶۷/۳
بیماری‌های مزمن تنفسی	۱۹	۱۸۴	۱۸	۱۹۴	۱۸	۱۹۱	۲۶	۲۱۷/۴	۲۲	۱۱۰/۳	۲۱	۱۲۸	۲۱	۱۲۲/۶	۲۵	۱۲۴/۴
بیماری‌های گوارشی	۲۲	۸۸/۳	۲۸	۷۶/۱	۲۸	۶۴/۳	۳۰	۸۸/۴	۲۵	۶۹/۹	۲۷	۶۸/۸	۲۷	۵۴/۳	۲۹	۶۹/۷
سوانح حمل و نقل	۱۲	۹۷/۷	۱۳	۱۱۵/۶	۱۲	۱۴۲/۶	۱۸	۱۴۵/۲	۱۷	۳۷/۳	۱۳	۴۵/۳	۱۳	۴۸/۸	۱۶	۵۰/۱
سوانح غیرعمدی	۲۸	۴۶/۸	۳۰	۴۷/۲	۲۷	۴۸/۶	۱	۳۷۳۹/۱	۳۱	۲۵/۱	۳۰	۲۷/۱	۳۱	۲۷/۸	۱	۲۵۷۳

میزان استاندارد شده سنی **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

مشکل سلامتی	مردان								زنان							
	۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰		۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰	
	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه ^۴	میزان
بیماری‌های قلبی-عروقی	۵	۳۲۶۴۵/۹	۴	۳۳۲۴۴/۱	۴	۳۲۶۴۷/۶	۴	۳۲۷۳۷/۱	۵	۳۳۶۲۶/۲	۵	۳۳۳۳۴/۱	۵	۳۳۲۲۳/۸	۵	۳۳۹۹۲/۴
سرطان‌ها	۳	۴۳۵۱/۵	۹	۳۱۶۲/۷	۱۷	۲۰۱۶/۹	۲۴	۱۶۹۸/۹	۱۹	۲۱۹۱/۳	۲۱	۱۸۸۰/۳	۲۳	۱۲۲۱/۹	۲۹	۱۰۸۹/۸
اختلالات عصبی	۲۰	۵۲۱۳۰/۹	۲۷	۵۲۱۲۵/۵	۲۹	۵۱۹۵۹/۴	۳۰	۵۱۲۳۷/۳	۲۷	۵۸۱۹۵/۸	۲۸	۵۸۱۹۲/۱	۲۹	۵۷۵۶۱	۲۸	۵۷۲۲۴/۲
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۱۴	۴۶۸۹۷/۳	۱۶	۴۱۵۱۸/۵	۲۰	۳۹۲۵۷/۶	۲۳	۳۸۰۰۸	۱۱	۵۸۳۸۶/۹	۱۶	۵۱۲۶۱/۲	۱۸	۴۸۳۳۲/۷	۲۰	۴۷۸۱۵/۸
بیماری‌های مزمن تنفسی	۱۶	۱۲۷۷۰/۲	۱۵	۱۲۶۹۸/۹	۱۸	۱۲۳۲۶	۱۹	۱۳۴۷۱/۶	۱۹	۱۴۹۱۷/۳	۱۹	۱۵۵۷۲/۳	۲۲	۱۴۶۱۵	۲۰	۱۵۲۷۲/۷
بیماری‌های گوارشی	۴	۶۶۹۵۴/۶	۵	۶۳۶۹۸/۱	۹	۶۰۰۲۸/۴	۱۷	۵۷۷۰۹/۵	۹	۵۳۳۷۰/۳	۹	۵۱۵۰۸/۷	۱۴	۴۷۸۶۱/۸	۲۰	۴۶۴۸۸/۴
سوانح حمل و نقل	۱۹	۹۲۸۹/۳	۱۸	۱۱۳۵۹/۳	۱۹	۱۱۵۲۵/۵	۱۷	۱۱۹۰۸/۹	۲۲	۵۹۴۴/۹	۲۰	۷۰۹۰/۴	۱۵	۶۹۴۱/۶	۱۲	۷۵۴۳/۹
سوانح غیرعمدی	۲	۴۸۲۵۲/۷	۲	۴۹۱۴۴/۷	۱	۴۷۱۲۹/۲	۱	۴۶۷۲۷/۸	۲	۳۸۷۲۴/۱	۲	۳۷۰۸۹/۸	۱	۳۵۹۵۲	۱	۳۵۶۵۵/۷

میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی و **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سال ۲۰۱۷ در سطح ملی و استان




^۲ علل براساس میزان استاندارد شده سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ و هر دو جنسیت در سطح ملی مرتب شده‌اند.


^۳ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی مرگ به تفکیک علت، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.

^۴ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی شیوع به تفکیک مشکل سلامتی، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.







جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۹۶۲/۸	۱۷۸۹	۱۴۶۴/۲	۱۳۳۹/۳
زنان	۱۸۸۴/۲	۱۷۰۳/۴	۱۳۶۸/۹	۱۲۵۰/۴
مردان	۲۰۵۰/۲	۱۸۷۴/۶	۱۵۵۴/۸	۱۴۳۲/۴




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۸۵۵/۶	۷۲۳/۱	۵۹۲/۷	۵۳۱/۷
زنان	۹۲۶/۶	۷۸۰/۵	۶۱۴/۱	۵۴۱/۶
مردان	۷۵۶/۳	۶۵۸/۱	۵۶۷/۵	۵۲۱




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۱۹/۳	۱۹۸/۹	۲۸۴/۵	۳۳۱/۲
زنان	۲۳۴/۲	۲۱۶	۳۲۱/۵	۳۵۴/۶
مردان	۱۹۷/۱	۱۷۷/۷	۲۴۳/۷	۳۰۶/۴



جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۴۶	۵۶/۶	۸۳/۵	۱۲۳/۵
زنان	۵۳/۷	۶۹/۱	۹۵/۶	۱۴۵/۹
مردان	۳۶/۳	۴۳/۴	۷۰/۸	۱۰۰




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۵۵/۱	۴۹/۱	۵۶/۸	۵۸/۲
زنان	۵۰/۳	۴۳/۷	۵۰/۹	۵۰/۵
مردان	۶۱/۹	۵۵/۴	۶۲/۸	۶۶/۴




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۲/۷	۱۱/۷	۱۲/۹	۱۲/۳
زنان	۷/۳	۶/۵	۸	۷/۳
مردان	۱۹/۵	۱۷/۳	۱۸/۱	۱۷/۶




Ischemic heart disease
Female Male




Stroke
Female Male




Alzheimer's disease and other dementias
Female Male




Diabetes mellitus type 2
Female Male





Lower respiratory infections
Female Male





Falls
Female Male







اختلالات افسردگی				اختلالات اضطرابی				جنسیت
۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	
۵۶۲۱/۹	۵۳۹۸/۳	۵۲۶۲/۲	۵۴۶۵/۲	۶۵۰۹/۶	۶۶۶۱/۹	۶۴۶۸/۵	۶۵۶۸/۹	هر دو
۶۶۱۳/۷	۶۳۳۵/۶	۶۱۶۸/۵	۶۳۸۸	۸۲۰۴/۷	۸۳۹۳/۷	۸۲۵۲/۸	۸۲۷۱/۴	زنان
۴۵۷۲/۵	۴۴۱۲	۴۳۷۵/۲	۴۴۹۶/۲	۴۷۱۷/۷	۴۸۴۴	۴۷۲۳	۴۷۵۲/۷	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۱۱۰۷۵/۳	۱۲۰۳۳/۳	۱۱۸۸۵/۳	۱۱۵۹۳/۵	هر دو
۱۰۸۱۰/۸	۱۱۶۵۷/۹	۱۱۴۸۹/۴	۱۱۲۵۳/۳	زنان
۱۱۳۵۴/۱	۱۲۴۲۱/۳	۱۲۲۷۹/۴	۱۱۹۷۵/۳	مردان



۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۳۵۸/۷	۸۰۳۲/۴	۶۵۵۵/۲	۷۴۳۰/۷	هر دو
۷۰۴۷/۲	۶۱۷۹/۵	۵۱۳۷/۴	۵۷۷۰/۴	زنان
۹۷۴۴/۲	۹۹۶۶/۹	۷۹۶۹	۹۲۷۵/۱	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۷۷۲۸/۶	۷۵۱۲	۶۵۵۸/۷	۶۵۶۶/۹	هر دو
۸۳۳۰/۶	۸۴۴۷/۵	۷۳۴۱/۳	۷۲۰۱/۳	زنان
۷۰۹۴/۲	۶۵۵۰/۴	۵۷۹۶/۱	۵۸۷۱/۶	مردان




۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۰۱۱/۷	۷۷۳۰/۴	۷۵۳۱/۳	۸۳۴۵/۷	هر دو
۸۷۹۶/۷	۸۱۵۵/۷	۸۳۵۲/۲	۹۴۸۱/۶	زنان
۷۱۸۴/۴	۷۲۸۱/۷	۶۸۲۱/۹	۷۰۱۴/۴	مردان


۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۵۲۷۶/۱	۵۳۲۹/۸	۵۴۸۰/۶	۵۵۶۱/۸	هر دو
۵۵۱۹/۸	۵۵۷۳/۹	۵۷۱۰/۹	۵۷۵۳/۱	زنان
۵۰۲۰/۲	۵۰۷۸/۵	۵۲۳۵/۶	۵۳۰۸/۹	مردان




Mental disorders
Female Male




Ischemic heart disease
Female Male




Falls
Female Male




Chronic obstructive pulmonary disease
Female Male



Stroke
Female Male



Alzheimer's disease and other dementias
Female Male



سیمای سلامت سالمندان

استان لرستان

میزان مرگ و شیوع بیماری ها



سیمای سلامت سالمندان

استان لرستان

(میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها در کل جمعیت، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (کمتر از ۶۰ سال) ساکن در استان لرستان و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس و گروه‌های سنی بیان شده است. به منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی حاوی: اطلاعات مقایسه‌ای با شاخص کل کشور و مقایسه با استان‌های مجاور استان لرستان شامل: استان‌های چهارمحال و بختیاری، همدان، ایلام، اصفهان، کرمانشاه، خوزستان و مرکزی نیز تدوین و ترسیم شده است.

آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر این مطلب است که شایع‌ترین علل مرگ در سالمندان ساکن استان لرستان (هر دو جنس) براساس میزان در سال ۲۰۱۷، به ترتیب بیماری‌های غیرواگیر، بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای و سوانح و حوادث است. این شاخص در افراد غیر سالمند ساکن استان لرستان به ترتیب، بیماری‌های غیرواگیر، سوانح و حوادث و بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای است و دارای الگویی متفاوت با سالمندان است.

روند زمانی تعداد مرگ به علت هر سه دسته اصلی بیماری‌ها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ در حال افزایش است. سالمندان ساکن در استان لرستان و در سال ۲۰۱۷ از لحاظ میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت هر سه دسته بیماری‌ها از میانگین کشوری پایین‌تر بوده‌اند. سالمندان ساکن استان لرستان، بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ از بین علل مختلف مرگ در هیچ یک از بیماری‌هایی که مورد مطالعه قرار گرفته است واجد رتبه‌ی ده و یا کمتر در بین استان‌های کشور نبوده‌اند.

از نظر شیوع مشکلات سلامتی در سالمندان ساکن استان لرستان نیز، این گروه جمعیتی جز ده استان دارای بالاترین شیوع در کل کشور نبوده‌اند.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، سکته، عفونت‌های تنفسی تحتانی و افتادن کاهشی و برای بیماری آلزایمر و دیابت نوع دو افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت افتادن در مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان لرستان، نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر بوده است.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع به علت مشکلات سلامتی در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، سکته و بیماری آلزایمر کاهشی و برای اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی، افتادن و بیماری مزمن انسدادی ریه افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع بیماری مزمن انسدادی ریه برای زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان لرستان در سال ۲۰۱۷ نسبت به تمام استان‌های مجاور کمتر بوده است.




تعداد و میزان^۱ مرگ به تفکیک گروه سنی در سال ۲۰۱۷ در استان

گروه سنی	جنسیت	همه علل		بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای		بیماری‌های غیرواگیر		سوانح و حوادث	
		تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان
همه سنین	هر دو	۸۷۳۵	۴۸۷	۵۱۱	۲۸/۵	۷۱۱۹	۳۹۶/۹	۱۱۰۵	۶۱/۶
	زنان	۳۴۰۹	۳۸۶/۱	۲۰۴	۲۳/۲	۲۹۰۷	۳۲۹/۲	۲۹۸	۳۳/۷
	مردان	۵۳۲۶	۵۸۴/۹	۳۰۶	۳۳/۶	۴۲۱۲	۴۶۲/۶	۸۰۷	۸۸/۷
کمتر از ۶۰ سال	هر دو	۲۷۸۳	۱۷۱/۱	۳۲۶	۲۰	۱۵۳۱	۹۴/۱	۹۲۶	۵۶/۹
	زنان	۹۰۵	۱۱۳/۵	۱۳۳	۱۶/۶	۵۳۶	۶۷/۲	۲۳۶	۲۹/۶
	مردان	۱۸۷۸	۲۲۶/۶	۱۹۳	۲۳/۳	۹۹۵	۱۲۰/۱	۶۹۰	۸۳/۲
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۵۹۵۲	۳۵۵۵/۴	۱۸۵	۱۱۰/۴	۵۵۸۸	۳۳۳۸	۱۷۹	۱۰۷
	زنان	۲۵۰۴	۲۹۳۰/۵	۷۲	۸۴/۲	۲۳۷۱	۲۷۷۴/۴	۶۱	۷۱/۹
	مردان	۳۴۴۸	۴۲۰۷	۱۱۳	۱۳۷/۸	۳۲۱۸	۳۹۲۵/۶	۱۱۸	۱۴۳/۶
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۵۲۰	۹۵۴/۳	۱۷	۳۰/۳	۴۶۶	۸۵۵	۳۸	۶۸/۹
	زنان	۱۹۶	۶۶۹/۹	۶	۲۱/۵	۱۷۹	۶۱۱/۳	۱۱	۳۷/۲
	مردان	۳۲۴	۱۲۸۴/۳	۱۰	۴۰/۶	۲۸۷	۱۱۳۷/۹	۲۷	۱۰۵/۷
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۵۷۵	۱۴۸۹/۸	۱۷	۴۳/۶	۵۲۷	۱۳۶۷	۳۱	۷۹/۲
	زنان	۲۷۶	۱۲۷۱/۴	۸	۳۶/۸	۲۵۷	۱۱۸۱/۱	۱۲	۵۳/۶
	مردان	۲۹۸	۱۷۷۱/۴	۹	۵۲/۴	۲۷۱	۱۶۰۶/۸	۱۹	۱۱۲/۲
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۵۷۵	۲۲۲۵/۶	۱۷	۶۴/۶	۵۳۵	۲۰۷۱/۶	۲۳	۸۹/۴
	زنان	۲۵۸	۱۹۵۵/۴	۷	۵۳/۵	۲۴۲	۱۸۳۹/۶	۸	۶۲/۳
	مردان	۳۱۷	۲۵۰۶/۹	۱۰	۷۶/۲	۲۹۳	۲۳۱۳/۱	۱۵	۱۱۷/۶
۷۵ تا ۷۹ سال	هر دو	۷۵۹	۴۱۰۳/۷	۲۲	۱۱۶/۹	۷۱۶	۳۸۷۰/۱	۲۲	۱۱۶/۷
	زنان	۳۲۸	۳۷۰۷/۹	۸	۹۳/۹	۳۱۲	۳۵۲۷/۵	۸	۸۶/۶
	مردان	۴۳۱	۴۴۶۶/۳	۱۳	۱۳۷/۹	۴۰۴	۴۱۸۴/۱	۱۴	۱۴۴/۲
۸۰ سال و بالاتر	هر دو	۳۵۲۴	۱۱۷۲۹/۱	۱۱۳	۳۷۶/۸	۳۳۴۴	۱۱۱۳۱/۵	۶۶	۲۲۰/۸
	زنان	۱۴۴۶	۱۱۶۱۵/۸	۴۲	۳۳۹/۷	۱۳۸۱	۱۱۰۹۱/۱	۲۳	۱۸۴/۹
	مردان	۲۰۷۷	۱۱۸۰۹/۴	۷۱	۴۰۳/۱	۱۹۶۳	۱۱۱۶۰/۱	۴۳	۲۴۶/۱

امید زندگی (سال) در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ در استان

جنسیت	بدو تولد		۶۰ تا ۶۴ سال		۶۵ تا ۶۹ سال		۷۰ تا ۷۴ سال		۷۵ تا ۷۹ سال		۸۰ سال و بالاتر	
	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰
زنان	۶۶/۱	۸۳/۵	۱۵/۱	۲۶/۶	۱۱/۶	۲۲/۳	۸/۶	۱۸/۳	۶/۲	۱۴/۶	۵	۱۱/۷
مردان	۵۹/۷	۷۸	۱۴/۴	۲۴/۲	۱۱/۱	۲۰/۲	۸/۳	۱۶/۴	۶/۲	۱۳/۱	۵/۳	۱۰/۱

روند زمانی تعداد در مقابل میزان استاندارد شده سنی مرگ در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سطح ملی و استان



^۱ در این گزارش تمامی میزان‌ها در ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت گزارش شده‌اند.




میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

علت ^۲	زنان								مردان							
	۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷		۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷	
	میزان	رتبه ^۳	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه
بیماری‌های قلبی-عروقی	۲۷۹۵/۵	۲۰	۲۳۴۱/۸	۱۸	۲۰۴۴/۳	۱۶	۲۰۱۸	۱۶	۲۸۰۲/۸	۲۲	۲۱۳۲/۵	۲۴	۱۹۶۰/۶	۲۰	۲۱۶۵/۹	۱۳
سرطان‌ها	۳۷۱/۴	۱۷	۳۲۱/۸	۱۴	۳۹۲/۸	۱۴	۴۰۳/۶	۱۷	۵۹۷/۶	۱۹	۴۷۰/۴	۱۸	۵۶۴/۳	۱۹	۶۴۷/۸	۱۵
اختلالات عصبی	۲۵۶/۶	۲۳	۲۲۴/۷	۲۰	۲۹۸/۷	۲۵	۳۵۴	۲۵	۲۲۹/۳	۲۴	۱۸۰/۴	۲۶	۲۰۵/۳	۲۹	۲۹۰/۸	۲۵
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۱۲۵/۹	۲۸	۱۲۰/۵	۲۶	۱۴۴/۴	۲۸	۱۷۱/۵	۲۶	۱۲۵/۷	۳۰	۱۰۴	۲۹	۱۳۱/۷	۳۰	۱۷۱/۵	۲۷
بیماری‌های مزمن تنفسی	۱۱۰/۸	۲۸	۱۰۳/۱	۲۸	۱۰۱/۴	۲۷	۹۵/۹	۲۸	۱۶۳/۳	۳۱	۱۱۹/۳	۳۰	۱۱۵/۵	۳۱	۱۲۵/۵	۳۰
بیماری‌های گوارشی	۸۸/۲	۳۳	۶۴/۱	۲۴	۶۶/۸	۲۸	۶۶/۷	۲۸	۱۱۹/۳	۲۲	۸۱/۶	۲۳	۷۶/۱	۲۷	۸۷/۱	۲۴
سوانح حمل و نقل	۴۶/۶	۲۱	۴۲	۲۰	۳۸	۲۳	۳۳/۱	۲۳	۱۲۸/۲	۲۲	۱۰۳/۱	۲۵	۸۷/۵	۲۵	۷۸/۴	۲۳
سوانح غیرعمدی	۴۰/۱	۲۸	۳۱/۶	۲۷	۳۱	۲۸	۲۹/۳	۳۰	۵۵	۳۰	۴۱/۴	۳۱	۳۹/۷	۳۱	۴۱/۵	۳۱

میزان استاندارد شده سنی **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

مشکل سلامتی	زنان								مردان							
	۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷		۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷	
	میزان	رتبه ^۴	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه
بیماری‌های قلبی-عروقی	۳۱۹۷۹/۲	۲۴	۳۱۲۱۶/۷	۲۷	۳۱۲۵۲/۵	۲۵	۳۱۵۰۷/۳	۲۹	۳۰۶۲۳/۴	۲۶	۳۰۱۳۶/۴	۲۹	۳۰۵۸۷/۷	۲۹	۳۰۲۶۲/۲	۲۷
سرطان‌ها	۱۲۲۲/۴	۲۰	۱۲۹۰/۳	۱۹	۱۹۰۵/۷	۱۹	۲۰۹۰/۵	۲۴	۱۷۲۰/۴	۲۳	۱۸۶۰/۹	۲۳	۲۷۴۵/۵	۲۵	۳۳۵۱/۹	۲۲
اختلالات عصبی	۵۷۲۵۰/۲	۱۹	۵۷۵۸۵	۲۲	۵۸۱۹۸/۷	۲۴	۵۸۲۰۳/۲	۲۴	۵۱۲۶۵/۸	۲۰	۵۱۹۷۶	۲۵	۵۲۱۳۰/۲	۲۳	۵۲۱۲۷/۱	۲۳
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۴۶۱۸۳/۶	۲۷	۴۶۳۶۰	۲۸	۴۸۹۴۶/۶	۲۶	۵۵۶۹۳/۹	۲۵	۳۷۱۵۵/۵	۲۸	۳۷۸۷۸/۱	۲۹	۳۹۴۶۲/۳	۲۸	۴۴۸۸۵/۴	۲۵
بیماری‌های مزمن تنفسی	۱۴۳۷۳/۸	۲۸	۱۳۵۲۸/۸	۲۹	۱۴۲۵۳/۷	۲۹	۱۴۲۵۴/۱	۲۹	۱۱۸۵۷/۱	۲۸	۱۰۲۰۰/۳	۳۱	۱۰۴۹۳	۳۱	۱۱۷۲۲/۱	۳۰
بیماری‌های گوارشی	۴۶۴۳۱/۲	۲۱	۴۷۶۴۹/۵	۱۸	۵۰۹۹۸/۹	۲۳	۵۳۰۲۰/۸	۲۳	۵۷۵۴۷/۷	۲۰	۵۹۶۵۱/۱	۲۰	۶۳۱۶۹/۲	۲۲	۶۶۵۰۳/۸	۲۰
سوانح حمل و نقل	۷۴۳۴	۱۵	۶۸۷۲/۲	۱۸	۷۱۰۱/۲	۱۹	۶۰۵۸/۱	۱۹	۱۱۳۷۰/۶	۲۵	۱۰۸۸۳/۶	۲۵	۱۱۰۲۸/۸	۲۲	۹۲۱۹/۶	۲۲
سوانح غیرعمدی	۲۰۲۶۱/۱	۳۱	۱۷۹۱۶/۹	۳۱	۲۰۱۰۱/۸	۲۸	۲۱۴۸۱/۴	۲۷	۲۸۶۲۲/۲	۳۱	۲۵۲۳۵/۸	۳۰	۲۹۲۸۷/۹	۳۱	۲۸۸۶۰/۱	۲۷

میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی و **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سال ۲۰۱۷ در سطح ملی و استان




^۲ علل براساس میزان استاندارد شده سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ و هر دو جنسیت در سطح ملی مرتب شده‌اند.


^۳ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی مرگ به تفکیک علت، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.

^۴ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی شیوع به تفکیک مشکل سلامتی، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.







جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۶۹۲/۷	۱۳۶۸	۱۱۴۳/۳	۱۲۲۶/۱
زنان	۱۶۰۹/۵	۱۳۸۵/۱	۱۱۲۹/۹	۱۱۴۷
مردان	۱۷۵۱/۵	۱۳۴۶	۱۱۸۷/۵	۱۳۱۸/۵




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۷۸۶/۸	۵۹۸/۵	۴۵۵/۶	۴۳۲
زنان	۸۱۶/۸	۶۵۱/۹	۴۸۴/۳	۴۲۸/۷
مردان	۷۵۵/۷	۵۵۲/۷	۴۴۱/۲	۴۳۹/۳




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۱۴/۴	۱۷۶/۵	۲۱۵/۳	۲۸۲/۵
زنان	۲۳۴/۷	۲۰۴/۵	۲۷۴	۳۲۷/۶
مردان	۱۹۵/۱	۱۵۲/۱	۱۷۲/۳	۲۴۸/۷



جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۴	۱۶/۷	۲۵/۸	۴۰/۷
زنان	۱۴	۱۹/۱	۲۸/۴	۴۴/۴
مردان	۱۴	۱۴/۹	۲۳/۸	۳۷/۲




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۸۲	۶۵	۶۲/۱	۶۹/۵
زنان	۷۳/۷	۶۱/۶	۵۸/۹	۶۰/۲
مردان	۸۹/۱	۶۷/۶	۶۵/۶	۷۷/۹




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۶/۷	۱۴/۲	۱۳/۴	۱۳/۲
زنان	۱۳/۴	۱۱/۹	۱۱/۳	۱۰/۶
مردان	۱۹/۴	۱۵/۹	۱۵/۵	۱۶




Ischemic heart disease




Stroke




Alzheimer's disease and other dementias




Diabetes mellitus type 2





Lower respiratory infections





Falls







اختلالات افسردگی				اختلالات اضطرابی				جنسیت
۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	
۶۳۶۸/۹	۶۲۱۶/۱	۵۹۸۵/۲	۶۰۷۱/۶	۶۵۱۳/۸	۶۶۱۳/۲	۶۲۵۰/۷	۶۳۲۷/۴	هر دو
۷۴۰۲/۴	۷۲۸۰/۲	۷۱۲۹/۴	۷۱۶۷/۸	۸۲۰۴/۷	۸۳۹۳/۷	۸۲۵۲/۸	۸۲۷۱/۴	زنان
۵۲۴۷	۵۱۳۵/۲	۵۱۱۲/۷	۵۱۹۴/۱	۴۷۱۷/۷	۴۸۴۴	۴۷۲۳	۴۷۵۲/۷	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۱۰۴۲۴/۲	۱۱۱۲۱/۴	۱۰۹۵۳/۸	۱۰۸۲۲/۱	هر دو
۱۰۱۸۳/۷	۱۰۸۲۲/۸	۱۰۶۱۴/۶	۱۰۴۸۲/۶	زنان
۱۰۶۶۲	۱۱۳۹۴	۱۱۲۱۶/۳	۱۱۱۰۴/۶	مردان



۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۲۱۵/۸	۸۲۶۹/۵	۶۸۹۴/۲	۷۸۶۸/۴	هر دو
۷۱۰۹/۸	۶۵۴۸/۲	۵۵۹۲/۳	۶۳۷۰/۴	زنان
۹۳۶۳/۲	۹۹۲۰/۴	۷۸۸۹	۹۰۹۶/۴	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۶۹۸۲/۷	۶۶۲۴/۲	۵۹۵۰/۴	۶۳۱۶/۴	هر دو
۷۸۴۷/۴	۷۸۰۲/۹	۷۰۱۰/۳	۷۰۶۲/۷	زنان
۶۱۱۲/۱	۵۵۵۴/۶	۵۱۴۷/۱	۵۶۹۵/۲	مردان




۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۷۱۵۹/۷	۶۸۳۵/۴	۶۷۶۵/۹	۷۶۹۳/۶	هر دو
۷۷۵۷/۸	۷۲۷۷/۱	۷۴۷۰/۵	۸۶۷۸	زنان
۶۵۸۷/۴	۶۴۳۶/۹	۶۲۱۹/۶	۶۸۴۷/۱	مردان


۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۵۲۹۷/۴	۵۳۵۳	۵۵۱۸	۵۶۱۹/۲	هر دو
۵۵۷۱/۸	۵۶۳۸/۲	۵۷۹۲/۲	۵۸۶۲/۲	زنان
۵۰۵۸/۴	۵۱۳۱/۴	۵۳۰۱/۸	۵۳۹۷/۲	مردان




Mental disorders
Female Male




Ischemic heart disease
Female Male




Falls
Female Male




Chronic obstructive pulmonary disease
Female Male



Stroke
Female Male



Alzheimer's disease and other dementias
Female Male



سیمای سلامت سالمندان

استان مازندران

میزان مرگ و شیوع بیماری ها



سیمای سلامت سالمندان

استان مازندران

(میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها در کل جمعیت، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (کمتر از ۶۰ سال) ساکن در استان مازندران و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس و گروه‌های سنی بیان شده است. به منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی حاوی: اطلاعات مقایسه‌ای با شاخص کل کشور و مقایسه با استان‌های مجاور استان مازندران شامل: استان‌های البرز، گیلان، گلستان، قزوین، سمنان و تهران نیز تدوین و ترسیم شده است.

آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر این مطلب است که شایع‌ترین علل مرگ در سالمندان ساکن استان مازندران (هر دو جنس) براساس میزان در سال ۲۰۱۷، به ترتیب بیماری‌های غیرواگیر، سوانح و حوادث و بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای است. این شاخص در افراد غیر سالمند ساکن استان مازندران دارای الگویی مشابه با سالمندان است.

روند زمانی تعداد مرگ به علت هر سه دسته اصلی بیماری‌ها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ در حال افزایش است. سالمندان ساکن در استان مازندران و در سال ۲۰۱۷ از لحاظ میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای و بیماری‌های غیرواگیر از میانگین کشوری پایین‌تر و به علت سوانح و حوادث بالاتر بوده‌اند.

سالمندان ساکن استان مازندران، از بین علل مختلف مرگ در بیماری‌های قلبی-عروقی (زنان در سال ۲۰۱۰) سرطان‌ها (زنان در سال ۲۰۱۰)، اختلالات عصبی (زنان در سال ۲۰۰۰)، دیابت و بیماری‌های کلیوی (زنان در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) و سوانح حمل و نقل (زنان در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) واجد رتبه‌ی ده و یا کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

از نظر شیوع مشکلات سلامتی در سالمندان ساکن استان مازندران، این گروه جمعیتی در سرطان (زنان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۷ و مردان در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، دیابت و بیماری‌های کلیوی (زنان در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، بیماری‌های گوارشی (زنان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، سوانح حمل و نقل (زنان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۰) یکی از ده استان دارای بالاترین شیوع در کل کشور بوده‌اند.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، سکته و افتادن کاهشی و برای بیماری آلزایمر، دیابت نوع دو و عفونت‌های تنفسی تحتانی افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ برای هیچ کدام از شش علت بررسی شده در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان مازندران نسبت به استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر و یا بیشتر نبوده است.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، سکته و بیماری آلزایمر کاهشی؛ برای اختلالات افسردگی و بیماری مزمن انسدادی ریه افزایشی و برای اختلالات اضطرابی ثابت بوده است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع برای بیماری مزمن انسدادی ریه در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان مازندران در سال ۲۰۱۷ نسبت به تمام استان‌های مجاور کمتر بوده است.




تعداد و میزان^۱ مرگ به تفکیک گروه سنی در سال ۲۰۱۷ در استان

گروه سنی	جنسیت	همه علل		بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای		بیماری‌های غیرواگیر		سوانح و حوادث	
		تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان
همه سنین	هر دو	۱۶۷۸۰	۴۹۳/۶	۶۴۱	۱۸/۹	۱۴۵۰۵	۴۲۶/۷	۱۶۳۵	۴۸/۱
	زنان	۷۶۴۱	۴۵۲/۸	۲۸۲	۱۶/۷	۶۹۴۴	۴۱۱/۵	۴۱۵	۲۴/۶
	مردان	۹۱۴۰	۵۳۳/۸	۳۵۹	۲۱	۷۵۶۱	۴۴۱/۵	۱۲۲۰	۷۱/۳
کمتر از ۶۰ سال	هر دو	۴۲۵۷	۱۴۱/۹	۳۴۲	۱۱/۴	۲۷۱۷	۹۰/۵	۱۱۹۸	۳۹/۹
	زنان	۱۵۳۶	۱۰۳/۵	۱۵۱	۱۰/۲	۱۱۲۰	۷۵/۵	۲۶۴	۱۷/۸
	مردان	۲۷۲۱	۱۷۹/۳	۱۹۰	۱۲/۵	۱۵۹۷	۱۰۵/۲	۹۳۴	۶۱/۵
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۲۵۲۴	۳۱۴۱/۸	۲۹۹	۷۵/۱	۱۱۷۸۷	۲۹۵/۷	۴۳۷	۱۰۹/۶
	زنان	۶۱۰۵	۲۹۹۴/۹	۱۳۱	۶۴/۳	۵۸۲۴	۲۸۵۶/۷	۱۵۱	۷۳/۹
	مردان	۶۴۱۸	۳۲۹۵/۵	۱۶۸	۸۶/۴	۵۹۶۴	۳۰۶۲	۲۸۶	۱۴۷
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۱۲۳۷	۸۹۰/۳	۲۶	۱۸/۸	۱۱۲۲	۸۰۷/۵	۸۹	۶۴
	زنان	۵۴۷	۷۶۹/۳	۱۱	۱۵	۵۱۰	۷۱۶/۶	۲۷	۳۷/۷
	مردان	۶۸۹	۱۰۱۷/۳	۱۵	۲۲/۸	۶۱۲	۹۰۲/۹	۶۲	۹۱/۶
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۱۴۵۵	۱۵۲۳/۴	۲۹	۳۰/۷	۱۳۴۴	۱۴۰/۷	۸۲	۸۵/۷
	زنان	۷۰۳	۱۳۹۱/۵	۱۳	۲۶/۳	۶۶۱	۱۳۰/۹	۲۸	۵۶/۲
	مردان	۷۵۲	۱۶۷۱/۴	۱۶	۳۵/۵	۶۸۳	۱۵۱/۷	۵۴	۱۱۸/۸
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۱۴۵۱	۲۳۹۹	۳۱	۵۲	۱۳۵۶	۲۲۴۲/۴	۶۳	۱۰۴/۶
	زنان	۶۹۱	۲۲۱۸/۲	۱۳	۴۳/۱	۶۵۶	۲۱۰۷/۲	۲۱	۶۷/۹
	مردان	۷۶۰	۲۵۹۰/۸	۱۸	۶۱/۴	۷۰۰	۲۳۸۵/۹	۴۲	۱۴۳/۵
۷۵ تا ۷۹ سال	هر دو	۱۹۴۰	۴۲۶۶/۳	۴۴	۹۷	۱۸۲۸	۴۰۲۱/۶	۶۷	۱۴۷/۷
	زنان	۹۳۹	۴۲۴۰/۴	۱۹	۸۳/۹	۸۹۸	۴۰۵۷/۸	۲۲	۹۸/۷
	مردان	۱۰۰۱	۴۲۹۰/۹	۲۵	۱۰۹/۳	۹۳۰	۳۹۸۷/۳	۴۵	۱۹۴/۳
۸۰ سال و بالاتر	هر دو	۶۴۴۱	۱۱۰۵۹	۱۶۸	۲۸۹/۲	۶۱۳۷	۱۰۵۳۶/۸	۱۳۶	۲۳۳
	زنان	۳۲۲۵	۱۱۱۵۲/۴	۷۵	۲۵۹/۵	۳۰۹۸	۱۰۷۱۱/۷	۵۲	۱۸۱/۲
	مردان	۳۲۱۶	۱۰۹۶۶/۹	۹۳	۳۱۸/۵	۳۰۳۹	۱۰۳۶۴/۲	۸۳	۲۸۴/۲

امید زندگی (سال) در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ در استان

جنسیت	بدو تولد		۶۰ تا ۶۴ سال		۶۵ تا ۶۹ سال		۷۰ تا ۷۴ سال		۷۵ تا ۷۹ سال		۸۰ سال و بالاتر	
	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰
زنان	۶۶/۷	۸۱/۸	۱۴/۶	۲۴/۷	۱۱/۲	۲۰/۵	۸/۵	۱۶/۶	۶	۱۳/۱	۴/۸	۱۰/۲
مردان	۶۴/۸	۷۷/۷	۱۴/۴	۲۳/۳	۱۱	۱۹/۷	۸/۳	۱۶/۶	۵/۸	۱۳/۶	۴/۵	۱۱/۳

روند زمانی تعداد در مقابل میزان استاندارد شده سنی مرگ در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سطح ملی و استان



^۱ در این گزارش تمامی میزان‌ها در ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت گزارش شده‌اند.




میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

علت ^۲	زنان								مردان							
	۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷		۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷	
	میزان	رتبه ^۳	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه
بیماری‌های قلبی-عروقی	۲۷۹۱/۷	۲۱	۲۴۹۱/۹	۱۵	۲۲۶۲/۸	۱۰	۱۹۷۲/۴	۱۸	۲۴۹۰/۹	۲۹	۲۱۳۹/۱	۲۳	۱۹۴۰/۹	۲۳	۱۸۵۷/۸	۲۴
سرطان‌ها	۳۷۴	۱۵	۳۳۷/۹	۱۱	۴۰۰/۹	۱۰	۳۸۸/۶	۱۸	۵۶۹/۷	۲۴	۴۴۴/۶	۲۳	۵۹۰/۷	۱۶	۶۴۸/۹	۱۴
اختلالات عصبی	۳۱۳/۹	۱۲	۳۲۴/۳	۶	۳۶۷/۶	۱۱	۳۷۲/۵	۱۶	۲۱۶/۷	۲۷	۱۸۲/۲	۲۵	۲۳۶/۲	۲۴	۳۱۱/۷	۱۸
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۱۹۴/۶	۱۴	۲۰۰/۱	۱۱	۲۹۳/۳	۵	۳۴۳/۳	۴	۱۴۵/۱	۲۴	۱۴۰/۹	۲۱	۲۱۳/۴	۱۲	۲۵۲/۹	۱۱
بیماری‌های مزمن تنفسی	۱۱۵/۸	۲۷	۱۱۹	۲۳	۱۲۱	۲۴	۹۸/۲	۲۶	۱۸۷/۷	۲۹	۱۵۹/۵	۲۶	۱۵۲/۹	۲۵	۱۳۸/۴	۲۷
بیماری‌های گوارشی	۷۹/۶	۲۷	۶۸/۵	۲۱	۶۹/۹	۲۵	۶۴/۹	۳۰	۸۳/۳	۳۱	۵۹/۲	۳۰	۶۷/۵	۳۱	۷۵/۲	۳۱
سوانح حمل و نقل	۵۶/۴	۱۳	۵۳/۷	۱۱	۵۴/۸	۴	۴۲/۴	۱۰	۱۲۰/۴	۲۴	۱۰۹/۶	۲۱	۱۱۵/۴	۱۴	۹۶/۱	۱۴
سوانح غیرعمدی	۴۴/۹	۲۵	۳۷/۵	۲۳	۳۷/۲	۲۳	۳۲/۷	۲۴	۵۵/۷	۲۹	۴۵/۹	۲۹	۴۷/۶	۲۹	۴۶/۴	۲۹

میزان استاندارد شده سنی **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

مشکل سلامتی	زنان								مردان							
	۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷		۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷	
	میزان	رتبه ^۴	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه
بیماری‌های قلبی-عروقی	۳۳۰۷۰/۶	۱۱	۳۲۱۸۹/۵	۱۳	۳۲۳۹۵/۶	۱۱	۳۲۶۱۷/۳	۱۳	۳۱۵۶۵/۸	۱۴	۳۱۰۴۵/۴	۱۶	۳۱۵۴۱/۷	۱۴	۳۱۰۹۱	۱۷
سرطان‌ها	۱۳۶۴/۲	۹	۱۵۴۷/۱	۷	۲۱۴۳/۳	۹	۲۲۸۳/۶	۱۷	۱۹۵۲/۷	۱۳	۲۱۵۱/۹	۱۲	۳۳۶۹/۵	۶	۴۳۲۰/۶	۴
اختلالات عصبی	۵۷۲۴۰/۸	۲۳	۵۷۵۷۸/۹	۲۴	۵۸۲۰۳/۲	۲۲	۵۸۲۱۰/۶	۲۱	۵۱۲۶۴/۹	۲۲	۵۱۹۵۸/۱	۳۰	۵۲۱۴۸/۷	۱۳	۵۲۱۲۵/۷	۲۴
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۴۸۶۶۸/۴	۱۶	۴۹۲۸۵/۹	۱۴	۵۲۴۷۷/۷	۹	۵۹۲۲۴/۶	۷	۳۷۹۹۵/۲	۲۴	۳۸۹۳۷/۶	۲۲	۴۰۹۷۱/۶	۲۰	۴۵۹۰۴/۵	۲۲
بیماری‌های مزمن تنفسی	۱۵۵۶۴/۸	۱۸	۱۴۵۱۹/۱	۲۵	۱۵۶۸۲/۷	۱۷	۱۴۷۲۸/۵	۲۴	۱۳۰۱۷	۲۱	۱۱۲۹۵/۹	۲۷	۱۱۸۸۵/۲	۲۳	۱۱۸۶۸/۲	۲۶
بیماری‌های گوارشی	۵۷۳۷۲/۷	۲	۵۶۹۸۱/۳	۲	۵۶۷۵۳/۳	۱	۵۷۳۸۹/۳	۱	۵۷۸۰۹/۶	۱۲	۵۸۳۰۰/۹	۳۰	۶۱۵۰۱/۶	۳۰	۶۳۳۷۰	۳۰
سوانح حمل و نقل	۷۹۶۴/۹	۸	۷۱۶۳/۲	۱۲	۷۴۴۲/۳	۱۰	۶۲۲۲/۹	۱۳	۱۱۴۶۳/۴	۲۳	۱۰۸۸۲/۵	۲۶	۱۱۵۱۱/۲	۱۳	۹۵۵۸/۸	۱۱
سوانح غیرعمدی	۲۱۱۲۶/۴	۲۸	۱۸۰۴۸/۸	۲۹	۲۰۳۰۴/۸	۲۶	۲۱۷۱۴/۹	۲۱	۲۹۰۹۵/۸	۲۹	۲۵۱۸۸/۴	۳۱	۲۹۹۱۸/۳	۲۷	۲۸۷۵۴	۲۸

میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی و **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سال ۲۰۱۷ در سطح ملی و استان




^۲ علل براساس میزان استاندارد شده سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ و هر دو جنسیت در سطح ملی مرتب شده‌اند.


^۳ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی مرگ به تفکیک علت، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.

^۴ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی شیوع به تفکیک مشکل سلامتی، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.







جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۶۷۳/۶	۱۴۸۸/۴	۱۲۴۴/۷	۱۰۹۳/۴
زنان	۱۶۸۰/۲	۱۵۲۳/۸	۱۲۷۷/۷	۱۰۸۴/۵
مردان	۱۶۴۶/۶	۱۴۳۴/۲	۱۲۰۸/۵	۱۱۰۶/۶




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۷۳۷/۷	۶۱۴/۶	۵۲۰/۷	۴۴۴/۹
زنان	۸۱۶/۷	۶۹۲/۷	۵۸۶/۷	۴۸۲/۵
مردان	۶۴۱/۱	۵۳۵/۲	۴۵۵/۳	۴۰۸/۴




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۴۴/۶	۲۳۰/۹	۲۶۸	۳۰۵/۳
زنان	۲۸۷/۶	۲۹۸/۳	۳۳۷/۹	۳۴۳/۱
مردان	۱۸۲	۱۵۱/۴	۱۹۷/۸	۲۶۸/۱



جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۴/۲	۳۲/۱	۷۴/۳	۱۲۴/۲
زنان	۲۷/۸	۳۹/۱	۸۹/۷	۱۵۳/۱
مردان	۲۰/۴	۲۵/۴	۵۹	۹۴/۷




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۵۸/۸	۵۱/۹	۵۹/۸	۶۱/۵
زنان	۵۵/۶	۴۹/۹	۵۷/۳	۵۴/۳
مردان	۶۳	۵۳/۴	۶۱/۷	۶۸/۸




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۰/۱	۱۷/۷	۱۸/۴	۱۷/۱
زنان	۱۷/۷	۱۵/۷	۱۶/۵	۱۴/۶
مردان	۲۲/۲	۱۹/۳	۲۰/۳	۱۹/۷




Ischemic heart disease




Stroke




Alzheimer's disease and other dementias




Diabetes mellitus type 2





Lower respiratory infections





Falls







اختلالات افسردگی				اختلالات اضطرابی				جنسیت
۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	
۶۳۴۵/۸	۶۲۲۳/۱	۶۰۹۳/۷	۶۱۶۹/۲	۶۵۰۱/۴	۶۶۲۷/۴	۶۴۲۶/۳	۶۵۰۴/۱	هر دو
۷۳۸۷/۲	۷۲۸۶/۹	۷۱۴۴/۲	۷۱۷۰/۷	۸۲۰۴/۷	۸۳۹۳/۷	۸۲۵۲/۸	۸۲۷۱/۴	زنان
۵۲۵۰/۱	۵۱۴۳/۹	۵۱۱۴	۵۱۹۴/۶	۴۷۱۷/۷	۴۸۴۴	۴۷۲۳	۴۷۵۲/۷	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۱۰۴۶۰/۷	۱۱۳۲۸/۲	۱۱۱۶۵/۳	۱۱۰۳۳/۸	هر دو
۱۰۲۲۰/۷	۱۱۰۰۲/۵	۱۰۷۹۸/۲	۱۰۷۰۳/۹	زنان
۱۰۷۰۹/۶	۱۱۶۵۱/۸	۱۱۵۰۸/۵	۱۱۳۷۶/۳	مردان



۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۷۱۲/۹	۸۹۵۶/۳	۷۴۰۵/۶	۸۶۷۶	هر دو
۷۴۳۵/۷	۷۰۴۴/۶	۶۱۰۱/۳	۷۱۵۷/۹	زنان
۱۰۰۴۴/۵	۱۰۸۷۳/۲	۸۶۱۸/۴	۱۰۱۹۲	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۷۲۵۳	۷۲۶۴/۵	۶۴۴۳	۶۷۵۷/۵	هر دو
۸۱۰۹/۵	۸۴۸۸/۳	۷۴۵۵/۴	۷۵۴۲/۱	زنان
۶۳۶۲/۲	۶۰۵۲/۱	۵۵۰۴/۱	۵۹۶۲/۳	مردان




۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۷۴۰۷/۹	۷۰۳۹/۲	۶۸۶۴/۱	۷۸۷۴/۶	هر دو
۸۲۷۲/۱	۷۷۳۶/۶	۷۶۵۳/۶	۸۹۹۰/۴	زنان
۶۵۲۰/۷	۶۳۴۷/۹	۶۱۱۳/۱	۶۷۱۳/۴	مردان


۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۵۲۷۶/۱	۵۳۳۴/۳	۵۴۸۲/۸	۵۵۶۸/۸	هر دو
۵۵۳۲	۵۵۸۵/۶	۵۷۳۴/۳	۵۷۷۳/۸	زنان
۵۰۱۹/۳	۵۰۹۲/۷	۵۲۴۱/۹	۵۳۱۹/۳	مردان




Mental disorders




Ischemic heart disease




Falls




Chronic obstructive pulmonary disease



Stroke



Alzheimer's disease and other dementias



سیمای سلامت سالمندان

استان مرکزی

میزان مرگ و شیوع بیماری ها



سیمای سلامت سالمندان

استان مرکزی

(میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها در کل جمعیت، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (کمتر از ۶۰ سال) ساکن در استان مرکزی و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس و گروه‌های سنی بیان شده است. به منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی حاوی: اطلاعات مقایسه‌ای با شاخص کل کشور و مقایسه با استان‌های مجاور استان مرکزی شامل: استان‌های البرز، همدان، اصفهان، لرستان، قزوین، قم و تهران نیز تدوین و ترسیم شده است.

آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر این مطلب است که شایع‌ترین علل مرگ در سالمندان ساکن استان مرکزی (هر دو جنس) و براساس میزان در سال ۲۰۱۷، به ترتیب بیماری‌های غیرواگیر، بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای و سوانح و حوادث است. این شاخص در افراد غیر سالمند ساکن استان خوزستان به ترتیب، بیماری‌های غیرواگیر، سوانح و حوادث و بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای است و دارای الگوی متفاوت با سالمندان است.

روند زمانی تعداد مرگ به علت هر سه دسته اصلی بیماری‌ها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ در حال افزایش است. سالمندان ساکن در استان مرکزی و در سال ۲۰۱۷ از لحاظ میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای و بیماری‌های غیرواگیر از میانگین کشوری پایین‌تر و از لحاظ سوانح و حوادث از میانگین کشوری کمی بالاتر هستند.

سالمندان ساکن استان مرکزی، از بین علل مختلف مرگ به علت اختلالات عصبی (زنان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰)، دیابت و بیماری‌های کلیوی (زنان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ و مردان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰) و سوانح غیر عمدی (زنان در سال‌های ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) واجد رتبه‌ی ده و یا کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

از نظر شیوع مشکلات سلامتی در سالمندان ساکن استان مرکزی، این گروه جمعیتی در بیماری‌های مزمن تنفسی (زنان و مردان در سال ۱۹۹۰)، بیماری‌های گوارشی (زنان در سال‌های ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷ و مردان در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) و سوانح حمل و نقل (مردان و زنان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰) یکی از ده استان دارای بالاترین شیوع در کل کشور بوده‌اند.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) به علت بیماری ایسکمیک قلب، سکته، عفونت‌های تنفسی تحتانی و افتادن کاهشی و برای بیماری آلزایمر و دیابت نوع دو افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری آلزایمر در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان مرکزی، نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر بوده است.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع به علت مشکلات سلامتی در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، سکته و بیماری آلزایمر کاهشی و برای اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی، افتادن و بیماری مزمن انسدادی ریه افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع برای هیچ کدام از شش مشکل سلامتی بررسی شده در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان مرکزی نسبت به استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر و یا بیشتر نبوده است.




تعداد و میزان^۱ مرگ به تفکیک گروه سنی در سال ۲۰۱۷ در استان

گروه سنی	جنسیت	همه علل		بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای		بیماری‌های غیرواگیر		سوانح و حوادث	
		تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان
همه سنین	هر دو	۷۹۴۵	۵۴۵/۹	۴۹۵	۳۴	۶۶۴۸	۴۵۶/۸	۸۰۲	۵۵/۱
	زنان	۳۴۴۹	۴۸۱/۶	۲۱۴	۲۹/۹	۳۰۳۸	۴۲۴/۳	۱۹۷	۲۷/۵
	مردان	۴۴۹۶	۶۰۸/۲	۲۸۱	۳۸/۱	۳۶۱۰	۴۸۸/۳	۶۰۵	۸۱/۹
کمتر از ۶۰ سال	هر دو	۲۰۷۸	۱۶۱/۲	۲۷۴	۲۱/۳	۱۲۰۰	۹۳/۱	۶۰۴	۴۶/۸
	زنان	۶۶۶	۱۰۵/۸	۱۱۵	۱۸/۳	۴۲۷	۶۷/۸	۱۲۴	۱۹/۶
	مردان	۱۴۱۲	۲۱۴/۱	۱۵۹	۲۴/۱	۷۷۳	۱۱۷/۲	۴۸۰	۷۲/۸
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۵۸۶۷	۳۵۳۱/۴	۲۲۱	۱۳۲/۹	۵۴۴۸	۳۲۷۹	۱۹۹	۱۱۹/۶
	زنان	۲۷۸۳	۳۲۱۷/۴	۹۹	۱۱۴/۱	۲۶۱۱	۳۰۱۸/۸	۷۳	۸۴/۵
	مردان	۳۰۸۴	۳۸۷۲/۵	۱۲۲	۱۵۲/۴	۲۸۳۷	۳۵۶۱/۵	۱۲۶	۱۵۷/۷
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۴۸۱	۹۶۷/۳	۱۵	۲۹/۸	۴۲۸	۸۶۱/۱	۳۸	۷۶/۴
	زنان	۱۷۸	۶۹۰/۸	۶	۲۱/۸	۱۶۲	۶۲۹	۱۰	۴۰/۱
	مردان	۳۰۳	۱۲۶۵/۱	۹	۳۸/۴	۲۶۶	۱۱۱۱/۲	۲۸	۱۱۵/۵
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۴۳۸	۱۲۵۳/۳	۱۳	۳۷/۸	۳۹۹	۱۱۴۱/۳	۲۶	۷۴/۲
	زنان	۱۹۱	۱۰۰۱/۶	۵	۲۸/۸	۱۷۷	۹۲۸/۴	۸	۴۴/۳
	مردان	۲۴۷	۱۵۵۵/۸	۸	۴۸/۶	۲۲۲	۱۳۹۷/۱	۱۷	۱۱۰
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۵۸۲	۲۱۱۳	۱۹	۷۰	۵۳۸	۱۹۵۱/۷	۲۵	۹۱/۴
	زنان	۲۹۰	۱۹۶۹/۳	۹	۶۲/۴	۲۷۱	۱۸۴۱/۱	۱۰	۶۵/۸
	مردان	۲۹۲	۲۲۷۸/۲	۱۰	۷۸/۶	۲۶۶	۲۰۷۸/۹	۱۵	۱۲۰/۷
۷۵ تا ۷۹ سال	هر دو	۸۳۸	۳۹۸۹	۲۹	۱۳۶/۴	۷۸۲	۳۷۲۲/۷	۲۷	۱۲۹/۹
	زنان	۴۲۳	۳۸۸۲	۱۴	۱۲۷/۲	۳۹۸	۳۶۵۱/۱	۱۱	۱۰۳/۷
	مردان	۴۱۵	۴۱۰۴/۵	۱۵	۱۴۶/۲	۳۸۴	۳۸۰۰	۱۶	۱۵۸/۲
۸۰ سال و بالاتر	هر دو	۳۵۲۸	۱۰۷۱۷/۶	۱۴۵	۴۴۰	۳۳۰۱	۱۰۰۲۷/۴	۸۲	۲۵۰/۱
	زنان	۱۷۰۱	۱۰۶۲۰/۴	۶۴	۴۰۲/۶	۱۶۰۳	۱۰۰۰۹/۶	۳۳	۲۰۸/۲
	مردان	۱۸۲۸	۱۰۸۰۹/۶	۸۰	۴۷۵/۴	۱۶۹۸	۱۰۰۴۴/۳	۴۹	۲۸۹/۹

امید زندگی (سال) در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ در استان

جنسیت	بدو تولد		۶۰ تا ۶۴ سال		۶۵ تا ۶۹ سال		۷۰ تا ۷۴ سال		۷۵ تا ۷۹ سال		۸۰ سال و بالاتر	
	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰
زنان	۷۱/۳	۷۹/۶	۱۸/۲	۲۳/۵	۱۴/۴	۱۹/۴	۱۱/۳	۱۵/۵	۸/۷	۱۲	۶/۸	۹/۳
مردان	۶۷/۱	۷۴/۳	۱۷	۲۱/۹	۱۳/۴	۱۸/۱	۱۰/۶	۱۴/۸	۸/۲	۱۱/۷	۶/۶	۹/۳

روند زمانی تعداد در مقابل میزان استاندارد شده سنی مرگ در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سطح ملی و استان



^۱ در این گزارش تمامی میزان‌ها در ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت گزارش شده‌اند.




میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

علت ^۲	مردان								زنان							
	۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰		۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰	
	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه ^۳	میزان
بیماری‌های قلبی-عروقی	۲۸	۱۷۵۳/۱	۲۹	۱۷۶۴	۱۸	۲۳۴۲/۶	۲۵	۲۷۵۷	۲۷	۱۷۴۱/۱	۲۶	۱۸۵۴/۶	۱۶	۲۴۱۸/۳	۱۹	۲۷۹۶
سرطان‌ها	۲۴	۵۸۳/۴	۲۱	۵۶۲	۱۳	۵۱۸/۴	۱۵	۶۲۶/۷	۲۴	۳۶۳/۴	۲۸	۳۴۶	۱۵	۳۱۷/۱	۱۸	۳۷۰/۴
اختلالات عصبی	۲۴	۲۹۲/۳	۲۲	۲۴۰/۵	۱۲	۲۳۱/۵	۱۷	۲۵۸/۵	۲۴	۳۴۳/۳	۱۶	۳۵۰/۴	۹	۳۰۱/۳	۸	۳۵۱/۵
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۱۳	۲۳۹/۶	۱۱	۲۱۹/۶	۹	۱۹۵/۳	۹	۲۰۴/۳	۱۴	۲۶۱/۵	۱۰	۲۳۷/۱	۶	۲۲۸/۱	۷	۲۲۷/۸
بیماری‌های مزمن تنفسی	۱۴	۱۹۸	۱۶	۲۱۴/۸	۱۱	۲۷۲/۱	۱۳	۳۲۸/۸	۱۵	۱۳۴/۹	۱۴	۱۵۶/۸	۱۲	۱۹۴/۶	۱۲	۲۰۳/۸
بیماری‌های گوارشی	۱۹	۱۰۰/۳	۱۹	۹۸/۱	۱۸	۹۴/۸	۱۷	۱۲۸/۲	۱۵	۸۱/۸	۱۵	۸۷/۷	۱۴	۷۹/۲	۱۲	۱۱۱
سوانح حمل و نقل	۲۱	۸۶/۶	۱۶	۱۱۴/۸	۱۱	۱۵۴/۱	۱۲	۱۷۲/۳	۱۴	۴۰	۱۲	۴۶/۸	۱۲	۵۳/۳	۱۲	۵۶/۶
سوانح غیرعمدی	۱۹	۵۲/۱	۱۷	۵۶/۵	۱۴	۶۶/۶	۱۵	۸۱/۲	۱۰	۳۹/۵	۸	۴۴/۳	۸	۴۵/۱	۱۳	۵۶/۴

میزان استاندارد شده سنی **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

مشکل سلامتی	مردان								زنان							
	۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰		۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰	
	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه ^۴	میزان
بیماری‌های قلبی-عروقی	۲۴	۳۰۶۳۵/۳	۱۷	۳۱۲۲۰/۲	۱۵	۳۱۱۲۶/۴	۱۶	۳۱۴۸۰	۲۱	۳۱۹۶۷/۳	۱۹	۳۱۸۳۸/۴	۱۵	۳۲۰۱۴/۹	۱۳	۳۲۷۴۴/۵
سرطان‌ها	۲۰	۳۴۲۲/۹	۱۳	۳۰۵۹/۲	۱۳	۲۰۹۵/۶	۱۵	۱۸۷۵	۲۶	۱۹۷۹/۸	۲۷	۱۶۹۰/۸	۲۱	۱۲۲۶/۴	۲۱	۱۱۹۶
اختلالات عصبی	۲۵	۵۲۱۲۵/۳	۲۱	۵۲۱۳۸/۶	۱۵	۵۱۹۹۸/۱	۱۴	۵۱۲۷۸/۸	۱۸	۵۸۲۱۳/۵	۲۶	۵۸۱۹۶/۱	۱۹	۵۷۵۸۸/۹	۱۴	۵۷۲۵۳/۲
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۱۵	۴۶۷۳۷/۲	۱۳	۴۲۳۸۷	۱۳	۴۰۷۹۱/۱	۱۴	۳۹۸۳۷/۷	۱۶	۵۷۵۴۰/۴	۱۱	۵۱۹۵۵/۸	۱۲	۴۹۵۴۸/۶	۱۴	۴۸۹۵۸/۴
بیماری‌های مزمن تنفسی	۱۸	۱۲۵۸۳/۳	۱۳	۱۳۰۷۴/۹	۱۲	۱۳۶۴۱/۱	۸	۱۵۲۸۵	۱۸	۱۴۹۸۱/۱	۱۵	۱۶۲۱۸/۳	۱۲	۱۶۲۴۵/۹	۱۰	۱۷۱۱۶/۳
بیماری‌های گوارشی	۷	۶۶۷۵۷/۳	۶	۶۳۶۳۸/۵	۱۱	۶۰۰۲۰/۹	۱۳	۵۷۷۷۶/۱	۶	۵۳۴۰۸/۳	۸	۵۱۶۱۷	۱۰	۴۸۰۸۱/۴	۱۱	۴۶۷۸۴/۱
سوانح حمل و نقل	۱۶	۹۴۳۸/۵	۶	۱۱۹۳۸/۳	۴	۱۲۸۲۷/۴	۴	۱۳۲۵۶	۱۲	۶۲۲۸/۴	۷	۷۵۱۹	۶	۷۵۴۸/۵	۵	۸۱۶۲/۳
سوانح غیرعمدی	۱۵	۲۹۸۱۸/۹	۱۲	۳۲۳۳۶/۳	۱۲	۲۹۷۱۹/۴	۱۱	۳۳۸۵۹/۱	۱۴	۲۱۹۳۰/۴	۱۷	۲۱۰۸۱/۷	۱۵	۱۹۹۳۱/۸	۱۴	۲۳۴۱۹/۸

میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی و **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سال ۲۰۱۷ در سطح ملی و استان




^۲ علل براساس میزان استاندارد شده سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ و هر دو جنسیت در سطح ملی مرتب شده‌اند.


^۳ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی مرگ به تفکیک علت، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.

^۴ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی شیوع به تفکیک مشکل سلامتی، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.







جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۷۰۴/۴	۱۴۸۸/۷	۹۱۱/۴	۹۱۹/۵
زنان	۱۶۰۷/۴	۱۴۳۰/۶	۸۷۷/۲	۸۷۱/۱
مردان	۱۷۸۲/۲	۱۵۲۹/۳	۹۶۶/۳	۹۷۹/۹




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۸۵۰	۷۰۴/۸	۴۳۵/۳	۴۱۷/۴
زنان	۸۹۳/۶	۷۴۸/۶	۴۶۴/۹	۴۳۳
مردان	۷۹۶/۷	۶۵۶/۸	۴۱۴/۶	۴۰۴/۵




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۷۵/۱	۲۳۸/۸	۲۵۹/۸	۲۸۱/۸
زنان	۳۲۵/۷	۲۷۷/۶	۳۲۳/۱	۳۱۵/۵
مردان	۲۱۹/۶	۱۹۵/۵	۲۰۲/۴	۲۴۹/۴



جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۳۹/۸	۴۸	۴۸/۳	۷۳/۹
زنان	۴۳/۲	۵۵/۷	۵۵/۱	۸۶/۲
مردان	۳۶/۳	۴۰/۴	۴۲/۴	۶۱/۱




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۱۸/۶	۱۰۳/۹	۹۸	۹۵/۴
زنان	۱۰۹/۵	۹۶/۶	۹۴	۸۶/۸
مردان	۱۲۷/۳	۱۱۰/۶	۱۰۳/۱	۱۰۴/۴




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۶	۲۳/۲	۲۴/۲	۲۲/۵
زنان	۱۹/۶	۱۷/۹	۲۲/۸	۲۰/۶
مردان	۳۱/۹	۲۸/۱	۲۶/۱	۲۴/۸




Ischemic heart disease




Stroke




Alzheimer's disease and other dementias




Diabetes mellitus type 2





Lower respiratory infections





Falls







اختلالات افسردگی				اختلالات اضطرابی				جنسیت
۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	
۶۳۶۴/۱	۶۲۵۷/۳	۶۰۹۲/۵	۶۱۴۶	۶۵۴۳/۷	۶۶۹۵	۶۴۳۱	۶۴۴۳/۳	هر دو
۷۳۸۸/۶	۷۲۷۸/۸	۷۱۳۷/۱	۷۱۷۵/۳	۸۲۰۴/۷	۸۳۹۳/۷	۸۲۵۲/۸	۸۲۷۱/۴	زنان
۵۲۳۲/۲	۵۱۳۱/۱	۵۱۱۱/۹	۵۲۰۲/۴	۴۷۱۷/۷	۴۸۴۴	۴۷۲۳	۴۷۵۲/۷	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۱۰۵۲۷/۳	۱۱۳۵۵	۱۱۲۸۸/۴	۱۱۱۲۴/۶	هر دو
۱۰۳۳۸/۷	۱۱۱۰۱/۶	۱۰۹۸۳	۱۰۸۱۰/۲	زنان
۱۰۷۲۸/۲	۱۱۶۱۶/۴	۱۱۵۷۶/۳	۱۱۴۲۵/۵	مردان



۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۸۳۶/۸	۹۴۳۹/۶	۸۳۵۶/۷	۹۶۴۲/۵	هر دو
۷۶۴۵/۲	۷۵۸۴/۸	۶۸۲۰/۵	۷۹۰۹/۱	زنان
۱۰۱۴۴	۱۱۴۳۲/۴	۹۷۹۵/۲	۱۱۲۵۹/۲	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۷۷۴۷/۲	۷۹۰۹/۲	۷۴۷۳/۷	۷۶۳۵/۵	هر دو
۸۳۷۲	۸۹۶۳/۵	۸۴۲۸/۳	۸۴۲۶	زنان
۷۰۷۲	۶۸۳۸/۴	۶۵۹۴/۹	۶۸۸۲/۲	مردان




۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۷۲۱۳/۸	۷۰۴۴/۶	۷۲۱۹/۹	۸۱۰۴/۸	هر دو
۷۸۶۲/۵	۷۴۵۶/۷	۷۷۴۱/۳	۹۰۴۱/۱	زنان
۶۵۲۱	۶۶۱۸/۴	۶۷۲۶/۷	۷۱۹۱/۲	مردان


۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۵۳۰۱/۷	۵۳۵۳/۶	۵۵۰۷/۳	۵۵۸۸/۹	هر دو
۵۵۵۴/۸	۵۶۱۷	۵۷۶۰/۷	۵۸۱۰/۲	زنان
۵۰۳۹/۸	۵۱۰۱/۹	۵۲۶۹/۷	۵۳۶۱/۶	مردان




Mental disorders




Ischemic heart disease




Falls




Chronic obstructive pulmonary disease



Stroke



Alzheimer's disease and other dementias



سیمای سلامت سالمندان

استان هرمزگان

میزان مرگ و شیوع بیماری ها



سیمای سلامت سالمندان

استان هرمزگان

(میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها در کل جمعیت، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (کمتر از ۶۰ سال) ساکن در استان هرمزگان و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس و گروه‌های سنی بیان شده است. به منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی حاوی: اطلاعات مقایسه‌ای با شاخص کل کشور و مقایسه با استان‌های مجاور استان هرمزگان شامل: استان‌های بوشهر، فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان نیز تدوین و ترسیم شده است.

آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر این مطلب است که شایع‌ترین علل مرگ در سالمندان ساکن استان هرمزگان (هر دو جنس) براساس میزان در سال ۲۰۱۷، به ترتیب بیماری‌های غیرواگیر، بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای و سوانح و حوادث است. این شاخص در افراد غیر سالمند ساکن استان به ترتیب، بیماری‌های غیرواگیر، سوانح و حوادث و بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای است و دارای الگوی متفاوت با سالمندان است.

روند زمانی تعداد مرگ به علت هر سه دسته اصلی بیماری‌ها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ در حال افزایش است. سالمندان ساکن در استان هرمزگان و در سال ۲۰۱۷ از لحاظ میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای و بیماری‌های غیرواگیر از میانگین کشوری پایین‌تر و به علت سوانح و حوادث از میانگین کشوری بالاتر هستند.

سالمندان ساکن استان هرمزگان، از بین علل مختلف مرگ در بیماری‌های قلبی-عروقی (زنان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰)، بیماری‌های گوارشی (زنان در سال ۱۹۹۰ و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰)، سوانح حمل و نقل (زنان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ و مردان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷) و سوانح غیرعمدی (زنان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ و مردان در سال ۱۹۹۰) واجد رتبه‌ی ده و کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

از نظر شیوع مشکلات سلامتی در سالمندان ساکن استان هرمزگان، این گروه جمعیتی در سرطان‌ها (زنان در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، اختلالات عصبی (زنان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، بیماری‌های گوارشی (مردان در سال ۱۹۹۰)، سوانح حمل و نقل (زنان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰) و سوانح غیرعمدی (زنان در سال ۲۰۰۰ و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۰۰) واجد رتبه‌ی ده و کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، سکته، عفونت‌های تنفسی تحتانی و افتادن کاهشی و برای بیماری آلزایمر و دیابت نوع دو افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت سکته در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان هرمزگان نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر بوده است.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، افتادن، سکته و بیماری آلزایمر کاهشی و برای اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی و بیماری مزمن انسدادی ریه افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع برای مشکلات سلامتی بیماری مزمن انسدادی ریه در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان هرمزگان نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر بوده است.




تعداد و میزان^۱ مرگ به تفکیک گروه سنی در سال ۲۰۱۷ در استان

گروه سنی	جنسیت	همه علل		بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای		بیماری‌های غیرواگیر		سوانح و حوادث	
		تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان
همه سنین	هر دو	۶۹۹۸	۳۸۱/۳	۶۲۸	۳۴/۲	۵۱۵۱	۲۸۰/۷	۱۲۱۹	۶۶/۴
	زنان	۳۷۰۶	۳۰۱/۹	۲۶۸	۲۹/۹	۳۱۵۹	۲۴۰/۹	۳۷۹	۳۱/۱
	مردان	۴۲۹۲	۴۵۷/۲	۳۵۹	۳۸/۳	۲۹۹۲	۳۱۸/۷	۹۴۱	۱۰۰/۲
کمتر از ۶۰ سال	هر دو	۳۰۰۳	۱۷۴/۴	۴۸۹	۲۸/۴	۱۴۳۳	۸۳/۲	۱۰۸۱	۶۲/۸
	زنان	۹۹۶	۱۱۸/۸	۲۱۲	۲۵/۲	۵۴۸	۶۵/۳	۳۳۷	۲۸/۲
	مردان	۲۰۰۷	۲۲۷/۲	۲۷۸	۳۱/۴	۸۸۵	۱۰۰/۱	۸۴۵	۹۵/۶
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۳۹۹۴	۳۵۴۷/۱	۱۳۸	۱۲۲/۸	۳۷۱۸	۳۳۰/۲	۱۳۸	۱۲۲/۴
	زنان	۱۷۱۰	۲۹۷۷/۱	۵۷	۹۸/۶	۱۶۱۱	۲۸۰/۵/۸	۴۲	۷۲/۷
	مردان	۲۲۸۵	۴۱۴۰/۲	۸۲	۱۴۷/۸	۲۱۰۷	۳۸۱۸/۳	۹۶	۱۷۴/۱
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۴۱۵	۱۰۱۸/۷	۱۴	۳۴/۷	۳۶۷	۹۰۰/۴	۳۴	۸۳/۶
	زنان	۱۴۷	۷۰۴/۵	۵	۲۵/۷	۱۳۴	۶۴۰/۹	۸	۳۷/۹
	مردان	۲۶۸	۱۳۴۹/۷	۹	۴۴/۲	۲۳۳	۱۱۷۳/۷	۲۶	۱۳۱/۷
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۴۷۷	۱۶۷۷/۴	۱۵	۵۱/۶	۴۳۶	۱۵۳۱/۴	۲۷	۹۴/۴
	زنان	۲۱۳	۱۴۲۲/۷	۷	۴۳/۷	۱۹۸	۱۳۳۳/۱	۸	۵۵/۹
	مردان	۲۶۴	۱۹۶۰/۶	۸	۶۰/۴	۲۳۸	۱۷۶۳/۱	۱۸	۱۳۷/۲
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۳۲۹	۲۳۳/۸	۱۰	۷۱/۹	۳۰۵	۲۱۷۰/۸	۱۳	۹۵/۲
	زنان	۱۵۶	۲۰۵۷/۶	۵	۶۲/۱	۱۴۶	۱۹۳۲/۳	۵	۶۳/۲
	مردان	۱۷۳	۲۶۶۵/۶	۵	۸۳/۵	۱۵۹	۲۴۴۹/۶	۹	۱۳۲/۵
۷۵ تا ۷۹ سال	هر دو	۴۲۵	۴۲۷۲/۵	۱۳	۱۲۹/۲	۳۹۹	۴۰۱۰/۸	۱۳	۱۳۲/۵
	زنان	۲۰۱	۳۸۵۸/۵	۶	۱۱۲	۱۹۰	۳۶۵۵/۹	۵	۹۰/۶
	مردان	۲۲۵	۴۷۲۵/۳	۷	۱۴۸/۱	۲۰۹	۴۳۹۸/۹	۸	۱۷۸/۳
۸۰ سال و بالاتر	هر دو	۲۳۴۸	۱۲۱۱۵/۴	۸۶	۴۴۶	۲۲۱۱	۱۱۴۰۹/۷	۵۰	۲۵۹/۸
	زنان	۹۹۳	۱۱۳۳۶/۴	۳۴	۳۹۰/۶	۹۴۲	۱۰۷۶۳/۸	۱۶	۱۸۲
	مردان	۱۳۵۵	۱۲۷۵۷/۵	۵۲	۴۹۱/۶	۱۲۶۹	۱۱۹۴۲	۳۴	۳۲۳/۹

امید زندگی (سال) در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ در استان

جنسیت	بدو تولد		۶۰ تا ۶۴ سال		۶۵ تا ۶۹ سال		۷۰ تا ۷۴ سال		۷۵ تا ۷۹ سال		۸۰ سال و بالاتر	
	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰
زنان	۷۴/۹	۷۸/۸	۲۰	۲۴/۳	۱۶	۲۰/۵	۱۲/۴	۱۷/۱	۹/۲	۱۴/۳	۶/۸	۱۲/۱
مردان	۶۹/۵	۷۰/۸	۱۷/۷	۲۱/۳	۱۳/۹	۱۷/۹	۱۰/۷	۱۴/۹	۷/۷	۱۲/۶	۵/۴	۱۰/۳

روند زمانی تعداد در مقابل میزان استاندارد شده سنی مرگ در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سطح ملی و استان



^۱ در این گزارش تمامی میزان‌ها در ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت گزارش شده‌اند.




میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

علت ^۲	مردان								زنان							
	۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰		۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰	
	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه ^۳	میزان
بیماری‌های قلبی-عروقی	۱۱	۲۲۱۰/۵	۸	۲۳۳۶/۷	۸	۲۸۲۴/۶	۵	۳۶۸۸/۱	۲۲	۱۸۸۰/۶	۲۰	۱۹۶۹/۷	۹	۲۶۳۹/۵	۶	۳۵۰۴
سرطان‌ها	۲۷	۵۵۸	۲۸	۵۱۰/۱	۲۸	۴۱۲/۲	۲۸	۵۴۰	۲۵	۳۵۸/۲	۲۰	۳۶۷/۱	۲۵	۲۶۱	۲۶	۳۰۹/۶
اختلالات عصبی	۱۳	۳۳۴/۵	۱۳	۲۷۵	۱۳	۲۲۷/۶	۱۱	۲۸۸/۹	۲۵	۳۴۱/۵	۲۴	۳۰۰/۳	۲۴	۲۱۹	۲۴	۲۵۳/۳
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۱۴	۲۳۸	۱۴	۲۰۷/۳	۱۵	۱۶۸	۱۱	۱۹۷/۹	۱۸	۲۲۶/۵	۱۸	۱۹۰/۸	۱۳	۱۸۶/۶	۱۲	۲۱۸/۴
بیماری‌های مزمن تنفسی	۲۳	۱۵۷/۶	۲۴	۱۵۷/۴	۲۵	۱۶۸/۴	۲۲	۲۳۳/۲	۳۰	۹۰/۲	۲۹	۹۷/۲	۲۴	۱۱۵/۳	۲۱	۱۳۶/۴
بیماری‌های گوارشی	۶	۱۲۵/۴	۶	۱۱۸/۹	۵	۱۳۷/۹	۵	۲۱۷	۱۳	۹۰/۴	۱۳	۹۴/۲	۱۱	۸۷/۳	۱۰	۱۲۰/۴
سوانح حمل و نقل	۱۰	۹۸/۴	۱۱	۱۱۸/۸	۱۳	۱۳۵/۷	۱۰	۱۷۵/۵	۱۶	۳۷/۶	۱۴	۴۴/۹	۹	۵۵/۸	۵	۶۸/۵
سوانح غیرعمدی	۱۲	۵۵/۴	۱۲	۵۸/۷	۱۱	۶۸/۳	۷	۹۱/۹	۲۲	۳۳/۲	۲۴	۳۷	۱۰	۴۳	۱۰	۵۷/۷

میزان استاندارد شده سنی **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

مشکل سلامتی	مردان								زنان							
	۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰		۲۰۱۷		۲۰۱۰		۲۰۰۰		۱۹۹۰	
	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه ^۴	میزان
بیماری‌های قلبی-عروقی	۲۵	۳۰۵۶۶/۳	۲۴	۳۱۰۱۷/۸	۲۰	۳۰۸۰۱/۹	۲۵	۳۰۸۵۰/۶	۳۱	۳۱۱۳۱/۹	۳۱	۳۰۷۶۵/۷	۲۹	۳۱۰۰۱/۲	۲۶	۳۱۷۲۱/۵
سرطان‌ها	۱۳	۳۶۳۱/۱	۱۷	۲۹۱۷/۶	۱۹	۱۹۱۰/۵	۲۲	۱۷۲۶	۷	۲۴۴۷/۳	۵	۲۳۳۸/۴	۱۳	۱۴۰۳/۸	۱۸	۱۲۵۰/۴
اختلالات عصبی	۴	۵۲۱۶۸/۷	۴	۵۲۱۸۲	۴	۵۲۰۳۹/۱	۴	۵۱۳۲۲/۶	۱۲	۵۸۲۱۹/۶	۱۶	۵۸۲۱۲/۹	۱۰	۵۷۶۰/۷۲	۹	۵۷۲۶۲/۳
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۱۶	۴۶۶۱۳	۱۵	۴۱۵۸۳/۲	۱۵	۳۹۹۷۶/۲	۱۶	۳۹۴۶۸/۳	۲۲	۵۶۴۱۲/۵	۲۰	۵۰۴۳۰	۱۷	۴۸۶۷۵/۶	۱۵	۴۸۹۱۷/۸
بیماری‌های مزمن تنفسی	۳۱	۱۱۵۶۲/۵	۲۸	۱۱۰۱۴/۳	۲۵	۱۱۴۱۲/۲	۲۶	۱۲۳۱۵/۳	۳۱	۱۳۵۵۶/۴	۳۰	۱۴۰۹۶/۶	۲۶	۱۴۲۸۴/۴	۲۶	۱۴۵۶۵/۳
بیماری‌های گوارشی	۲۸	۶۶۱۳۴/۸	۲۷	۶۲۹۰۵/۷	۱۴	۵۹۷۳۲/۸	۸	۵۸۰۳۵/۴	۲۸	۵۲۶۸۰/۱	۲۶	۵۰۸۳۵/۲	۱۹	۴۷۶۰/۷۳	۱۴	۴۶۶۸۳/۲
سوانح حمل و نقل	۱۲	۹۵۳۷/۶	۱۶	۱۱۴۷۹	۱۱	۱۲۰۴۶/۵	۱۲	۱۲۱۴۹/۹	۱۷	۶۰۷۷/۹	۱۴	۷۲۴۹/۴	۷	۷۴۲۹/۹	۱۰	۷۸۵۷
سوانح غیرعمدی	۱۳	۳۰۲۳۵/۶	۹	۳۳۰۴۵/۶	۴	۳۲۵۷۶	۴	۳۶۴۶۴	۳۰	۲۱۲۵۸/۸	۲۲	۲۰۷۵۸/۷	۹	۲۰۸۹۵/۲	۱۳	۲۳۷۸۹

میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی و **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سال ۲۰۱۷ در سطح ملی و استان




^۲ علل براساس میزان استاندارد شده سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ و هر دو جنسیت در سطح ملی مرتب شده‌اند.


^۳ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی مرگ به تفکیک علت، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.

^۴ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی شیوع به تفکیک مشکل سلامتی، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.







جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۲۰۴	۱۷۱۳/۶	۱۲۴۴/۸	۱۲۰۴/۷
زنان	۲۰۵۷/۵	۱۵۸۸/۷	۱۰۸۴	۱۰۷۵
مردان	۲۳۳۸	۱۸۲۳/۴	۱۳۹۷/۵	۱۳۳۹/۱




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۹۳۲/۴	۶۷۰/۵	۴۹۶/۵	۴۳۰/۸
زنان	۹۲۰/۸	۶۴۴/۵	۴۶۴/۷	۴۰۷/۵
مردان	۹۴۳/۶	۶۹۵/۹	۵۲۶/۸	۴۵۴/۸




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۳۶/۹	۱۹۶/۳	۲۵۰	۲۹۸/۴
زنان	۲۲۸/۶	۱۹۸/۳	۲۷۲/۹	۳۱۲/۵
مردان	۲۴۷/۴	۱۹۴/۲	۲۳۱/۵	۲۸۶



جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۳۰	۳۳/۳	۴۶	۶۵/۹
زنان	۳۰/۹	۳۶/۱	۴۶/۱	۶۸
مردان	۲۹/۴	۳۱/۲	۴۵/۹	۶۳/۹




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۰۸/۱	۸۲/۳	۷۵/۹	۷۷/۸
زنان	۱۰۵/۱	۷۸/۶	۶۶/۱	۶۶/۸
مردان	۱۱۱/۵	۸۶/۲	۸۴/۹	۸۸/۶




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۱/۷	۱۸/۵	۱۷/۳	۱۶/۳
زنان	۱۶	۱۳/۶	۱۲/۷	۱۱/۷
مردان	۲۶/۹	۲۲/۸	۲۱/۷	۲۰/۹




Ischemic heart disease




Stroke




Alzheimer's disease and other dementias




Diabetes mellitus type 2





Lower respiratory infections





Falls







اختلالات افسردگی				اختلالات اضطرابی				جنسیت
۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	
۶۳۵۳/۲	۶۲۳۱	۶۰۳۴/۴	۶۰۹۱/۳	۶۵۱۰/۶	۶۶۳۴/۹	۶۳۱۸/۱	۶۳۶۶/۵	هر دو
۷۳۹۲/۷	۷۲۷۹/۸	۷۱۴۵/۹	۷۱۷۶/۳	۸۲۰۴/۷	۸۳۹۳/۷	۸۲۵۲/۸	۸۲۷۱/۴	زنان
۵۲۴۶/۱	۵۱۴۴/۶	۵۱۱۹/۶	۵۱۸۹/۶	۴۷۱۷/۷	۴۸۴۴	۴۷۲۳	۴۷۵۲/۷	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۹۳۴۹/۴	۱۰۰۵۳/۶	۹۹۶۲/۹	۹۴۹۰/۵	هر دو
۹۱۱۷/۵	۹۷۲۳/۷	۹۵۹۰/۳	۹۱۴۹/۸	زنان
۹۵۸۷/۵	۱۰۳۵۳/۷	۱۰۲۷۶/۸	۹۷۹۷/۸	مردان



۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۴۲۷/۸	۸۸۹۲/۲	۷۸۹۵/۴	۸۷۱۵/۹	هر دو
۷۰۸۵/۱	۶۸۰۷/۲	۵۹۱۰/۸	۶۴۱۷/۵	زنان
۹۸۳۷/۹	۱۰۹۶۰/۸	۹۵۴۰/۲	۱۰۷۲۳	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۶۷۶۰/۴	۶۵۴۷/۴	۶۱۸۴/۹	۶۱۴۰/۴	هر دو
۷۲۵۷	۷۳۴۷/۲	۶۹۵۴/۹	۶۷۷۱/۹	زنان
۶۲۴۱/۹	۵۷۸۹/۹	۵۵۵۳/۹	۵۵۸۳/۵	مردان




۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۷۲۹۲/۴	۷۰۲۰/۶	۷۱۶۹	۸۲۴۰/۵	هر دو
۷۸۴۵/۷	۷۲۰۰/۱	۷۶۲۵/۴	۹۲۵۰/۴	زنان
۶۷۳۰/۱	۶۸۲۷	۶۷۹۱/۸	۷۳۱۷/۶	مردان


۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۵۳۷۴/۱	۵۴۲۰/۵	۵۵۹۳/۹	۵۶۹۹/۷	هر دو
۵۶۲۵/۳	۵۶۷۱/۴	۵۸۴۰	۵۹۰۲/۹	زنان
۵۱۲۸/۴	۵۲۰۲	۵۳۸۰/۳	۵۴۸۶/۳	مردان




Mental disorders
Female Male




Ischemic heart disease
Female Male




Falls
Female Male




Chronic obstructive pulmonary disease
Female Male



Stroke
Female Male



Alzheimer's disease and other dementias
Female Male



سیمای سلامت سالمندان

استان همدان

میزان مرگ و شیوع بیماری ها


تعداد و میزان^۱ مرگ به تفکیک گروه سنی در سال ۲۰۱۷ در استان

گروه سنی	جنسیت	همه علل		بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای		بیماری‌های غیرواگیر		سوانح و حوادث	
		تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان
همه سنین	هر دو	۹۹۱۷	۵۶۲/۱	۵۷۷	۳۲/۷	۸۲۵۸	۴۶۸/۱	۱۰۸۱	۶۱/۳
	زنان	۴۱۹۰	۴۸۱/۸	۲۴۲	۲۷/۸	۳۶۹۶	۴۲۵	۲۵۲	۲۹
	مردان	۵۷۲۷	۶۴۰/۲	۳۳۵	۳۷/۵	۴۵۶۳	۵۱۰	۸۲۹	۹۲/۷
کمتر از ۶۰ سال	هر دو	۲۹۰۱	۱۸۵/۴	۳۸۲	۲۴/۴	۱۶۸۵	۱۰۷/۶	۸۳۴	۵۳/۳
	زنان	۸۸۳	۱۱۵/۲	۱۵۹	۲۰/۷	۵۵۷	۷۲/۸	۱۶۶	۲۱/۷
	مردان	۲۰۱۹	۲۵۲/۶	۲۲۴	۲۸	۱۱۲۷	۱۴۱/۱	۶۶۸	۸۳/۶
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۷۰۱۶	۳۵۲۶/۴	۱۹۵	۹۸	۶۵۷۴	۳۳۰۴/۲	۲۴۷	۱۲۴/۱
	زنان	۳۳۰۷	۳۱۹۲/۶	۸۳	۸۰/۲	۳۱۳۸	۳۰۲۹/۶	۸۶	۸۲/۸
	مردان	۳۷۰۸	۳۸۸۹/۱	۱۱۲	۱۱۷/۴	۳۴۴۵	۳۶۰۲/۷	۱۶۱	۱۶۹
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۶۹۸	۱۱۰۰/۳	۱۸	۲۸/۴	۶۲۴	۹۸۳/۵	۵۶	۸۸/۳
	زنان	۲۵۷	۷۷۹/۴	۶	۱۹/۵	۲۳۵	۷۱۲/۹	۱۵	۴۷
	مردان	۴۴۲	۱۴۴۶/۱	۱۲	۳۸	۳۸۹	۱۲۷۵/۲	۴۱	۱۳۲/۹
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۶۵۰	۱۴۴۹/۷	۱۶	۳۵/۲	۵۹۷	۱۳۳۰/۵	۳۸	۸۴/۱
	زنان	۲۹۹	۱۲۱۳/۵	۷	۲۷/۷	۲۷۹	۱۱۳۳/۷	۱۳	۵۲/۱
	مردان	۳۵۲	۱۷۳۷/۱	۹	۴۴/۲	۳۱۸	۱۵۷۰	۲۵	۱۲۲/۹
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۸۲۶	۲۴۹۵/۷	۲۱	۶۴/۱	۷۶۹	۲۳۲۵	۳۵	۱۰۶/۶
	زنان	۳۶۳	۲۰۶۹/۷	۹	۵۰/۱	۳۴۳	۱۹۵۳/۷	۱۲	۶۵/۹
	مردان	۴۶۲	۲۹۷۷/۵	۱۲	۸۰	۴۲۶	۲۷۴۴/۹	۲۴	۱۵۲/۶
۷۵ تا ۷۹ سال	هر دو	۱۱۰۱	۴۵۸۲/۹	۲۹	۱۲۱/۴	۱۰۳۶	۴۳۱۴/۲	۳۵	۱۴۷/۳
	زنان	۵۰۹	۴۰۷۴/۳	۱۲	۹۵/۷	۴۸۵	۳۸۸۱/۷	۱۲	۹۷
	مردان	۵۹۲	۵۱۳۴/۷	۱۷	۱۴۹/۳	۵۵۱	۴۷۸۳/۵	۲۳	۲۰۱/۹
۸۰ سال و بالاتر	هر دو	۳۷۴۰	۱۱۱۶۰	۱۱۱	۳۳۰/۷	۳۵۴۷	۱۰۵۸۳	۸۳	۲۴۶/۳
	زنان	۱۸۷۹	۱۱۷۵۳/۵	۴۹	۳۰۶/۹	۱۷۹۶	۱۱۲۳۵/۳	۳۴	۲۱۱/۴
	مردان	۱۸۶۱	۱۰۶۱۸/۶	۶۲	۳۵۲/۴	۱۷۵۱	۹۹۸۸/۱	۴۹	۲۷۸/۲

امید زندگی (سال) در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ در استان

جنسیت	بدو تولد		۶۰ تا ۶۴ سال		۶۵ تا ۶۹ سال		۷۰ تا ۷۴ سال		۷۵ تا ۷۹ سال		۸۰ سال و بالاتر	
	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰
زنان	۷۰/۲	۸۰/۶	۱۶/۹	۲۴/۵	۲۰/۴	۹/۷	۱۶/۶	۶/۸	۱۳/۲	۴/۹	۱۰/۷	۴/۹
مردان	۶۵/۸	۷۲/۵	۱۵/۴	۲۱/۱	۱۱/۹	۹/۴	۱۴/۲	۶/۵	۱۱/۵	۵/۱	۹/۲	۵/۱

روند زمانی تعداد در مقابل میزان استاندارد شده سنی مرگ در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سطح ملی و استان



^۱ در این گزارش تمامی میزان‌ها در ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت گزارش شده‌اند.




میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

علت ^۲	زنان								مردان							
	۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷		۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷	
	میزان	رتبه ^۳	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه
بیماری‌های قلبی-عروقی	۲۹۱۶/۸	۱۷	۲۳۲۴/۹	۲۱	۲۳۶۲/۳	۵	۲۱۲۲/۲	۱۲	۲۷۸۸/۷	۲۴	۲۰۹۰/۴	۲۶	۲۱۶۲/۴	۱۵	۲۱۳۱	۱۵
سرطان‌ها	۲۹۱/۳	۲۹	۲۳۶/۷	۲۹	۳۳۰/۱	۳۱	۳۴۰	۲۹	۴۸۷/۵	۳۰	۳۶۶/۵	۳۱	۵۰۷/۷	۲۹	۵۸۶/۴	۲۳
اختلالات عصبی	۲۷۳/۳	۱۹	۲۲۱/۹	۲۲	۳۵۶/۹	۱۴	۳۸۴/۱	۱۵	۲۰۷/۷	۲۸	۱۵۷/۵	۲۸	۲۱۶/۸	۲۶	۳۰۵/۵	۲۱
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۱۲۶/۳	۲۷	۱۱۵	۲۸	۱۶۴/۲	۲۴	۱۷۷/۵	۲۵	۱۲۹/۲	۲۹	۹۹/۸	۳۰	۱۴۳/۴	۲۸	۱۶۳/۵	۲۸
بیماری‌های مزمن تنفسی	۱۵۲/۷	۱۸	۱۳۴	۱۸	۱۴۲/۶	۱۸	۱۲۷/۶	۱۸	۲۴۰/۳	۲۰	۱۷۳/۷	۲۲	۱۸۶/۵	۱۹	۱۸۸/۳	۱۶
بیماری‌های گوارشی	۱۰۶	۱۵	۷۲	۱۹	۱۰۰/۷	۸	۹۸/۱	۱۰	۱۲۰/۱	۲۱	۷۸/۶	۲۴	۹۷/۳	۲۰	۱۱۸/۶	۸
سوانح حمل و نقل	۵۳/۵	۱۴	۴۵/۸	۱۶	۵۰/۳	۸	۴۱/۳	۱۱	۱۴۳	۱۹	۱۱۶/۳	۱۸	۱۱۵	۱۵	۹۶/۷	۱۳
سوانح غیرعمدی	۴۹/۴	۲۰	۳۷/۶	۲۲	۴۳/۱	۱۱	۳۸/۲	۱۴	۶۶/۸	۲۵	۵۰/۶	۲۶	۵۴/۲	۲۱	۵۳	۱۵

میزان استاندارد شده سنی **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

مشکل سلامتی	زنان								مردان							
	۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷		۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷	
	میزان	رتبه ^۴	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه
بیماری‌های قلبی-عروقی	۳۲۶۶۹/۹	۱۵	۳۱۸۶۳/۳	۱۸	۳۲۰۱۵/۵	۱۶	۳۲۳۳۹	۱۸	۳۰۹۰۹/۱	۲۳	۳۰۳۷۳/۵	۲۸	۳۰۹۷۱/۹	۲۵	۳۰۸۳۷/۸	۲۱
سرطان‌ها	۱۰۴۶/۷	۳۱	۱۰۵۸	۳۱	۱۶۲۹/۹	۳۰	۱۹۰۸	۲۹	۱۵۰۷/۳	۳۱	۱۵۷۳	۳۰	۲۵۰۴	۲۸	۳۲۹۷	۲۵
اختلالات عصبی	۵۷۲۵۴/۹	۱۳	۵۷۵۷۷/۹	۲۵	۵۸۲۱۲	۱۷	۵۸۲۱۱	۲۰	۵۱۲۵۵/۳	۲۵	۵۱۹۸۴/۹	۱۹	۵۲۱۲۸/۸	۲۵	۵۲۱۳۴/۴	۱۸
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۴۶۰/۱۱	۲۸	۴۶۳۲۷/۶	۲۹	۴۸۹۰۰/۵	۲۷	۵۵۳۳۲/۹	۲۷	۳۶۳۷۸/۲	۳۰	۳۶۹۳۷	۳۰	۳۸۸۸۶/۸	۳۰	۴۴۰۲۰/۹	۲۹
بیماری‌های مزمن تنفسی	۱۵۶۵۸/۵	۱۷	۱۴۷۲۸/۴	۲۱	۱۵۳۶۵/۳	۲۳	۱۴۸۵۹/۳	۲۰	۱۳۶۲۶	۱۸	۱۱۹۴۰/۲	۲۲	۱۲۱۰۱/۵	۲۰	۱۲۳۸۹/۲	۲۲
بیماری‌های گوارشی	۴۶۲۶۱/۹	۲۵	۴۷۴۶۲/۴	۲۴	۵۱۳۲۶	۱۴	۵۳۲۷۴/۴	۱۲	۵۷۱۵۲/۱	۲۷	۵۹۲۷۷/۸	۲۶	۶۳۲۳۳/۳	۲۰	۶۶۶۸۰/۱	۱۱
سوانح حمل و نقل	۸۰۵۰/۴	۶	۷۲۰۸/۵	۱۱	۷۴۴۸/۱	۹	۶۳۳۸/۷	۵	۱۲۲۸۵/۱	۱۰	۱۱۵۹۶/۲	۱۸	۱۱۶۸۸/۷	۸	۹۸۷۴/۱	۳
سوانح غیرعمدی	۲۲۴۳۵/۴	۱۹	۱۹۰۷۴/۳	۲۵	۲۰۰۱۶/۴	۲۹	۲۱۴۹۱/۱	۲۶	۳۱۰۶۱/۹	۲۱	۲۶۳۴۰/۴	۲۹	۳۰۰۹۲/۸	۲۵	۲۹۴۷۸/۳	۱۸

میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی و **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سال ۲۰۱۷ در سطح ملی و استان




^۲ علل براساس میزان استاندارد شده سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ و هر دو جنسیت در سطح ملی مرتب شده‌اند.


^۳ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی مرگ به تفکیک علت، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.

^۴ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی شیوع به تفکیک مشکل سلامتی، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.







جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۸۸۷/۵	۱۴۹۰/۶	۱۴۳۸	۱۳۵۷/۹
زنان	۱۸۲۷/۳	۱۵۱۰/۲	۱۴۶۶/۶	۱۳۱۳/۳
مردان	۱۹۲۴/۱	۱۴۶۳/۸	۱۴۵۲/۹	۱۴۲۰/۷




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۷۵۴/۳	۵۴۸/۳	۵۱۵	۴۵۶/۳
زنان	۸۲۶	۶۱۸/۹	۵۷۵	۴۸۲/۳
مردان	۶۷۰/۸	۴۸۱/۳	۴۷۲/۴	۴۳۵/۱




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۱۵/۷	۱۶۶/۱	۲۴۸/۱	۳۰۶/۵
زنان	۲۵۰/۳	۲۰۲/۲	۳۲۸/۴	۳۵۵/۴
مردان	۱۷۵	۱۳۰/۹	۱۸۰/۱	۲۶۰/۶



جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۶/۸	۱۸/۷	۲۸/۴	۳۹/۳
زنان	۱۹/۶	۲۳/۵	۳۳/۵	۴۶/۲
مردان	۱۴/۲	۱۴/۴	۲۴	۳۲/۲




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۷۰/۱	۵۳/۷	۷۱/۳	۷۲/۱
زنان	۶۳/۴	۵۰/۳	۶۶/۶	۶۲
مردان	۷۶/۲	۵۶/۳	۷۶/۹	۸۲/۶




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۲۳/۷	۲۰/۱	۲۴/۲	۲۲/۳
زنان	۱۹/۱	۱۶/۷	۲۲/۷	۲۰
مردان	۲۷/۶	۲۳	۲۶/۵	۲۵/۲




Ischemic heart disease




Stroke




Alzheimer's disease and other dementias




Diabetes mellitus type 2





Lower respiratory infections





Falls







اختلالات افسردگی				اختلالات اضطرابی				جنسیت
۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	
۶۳۷۵/۶	۶۲۵۷/۹	۶۰۸۱	۶۱۲۵/۴	۶۵۴۰/۵	۶۶۸۰/۷	۶۳۹۴/۶	۶۴۲۲/۲	هر دو
۷۳۹۶	۷۲۸۸/۹	۷۱۴۶/۶	۷۱۶۴/۹	۸۲۰۴/۷	۸۳۹۳/۷	۸۲۵۲/۸	۸۲۷۱/۴	زنان
۵۲۵۰/۸	۵۱۳۴/۹	۵۱۱۸/۶	۵۱۹۶/۵	۴۷۱۷/۷	۴۸۴۴	۴۷۲۳	۴۷۵۲/۷	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۱۰۵۱۶/۷	۱۱۳۲۵	۱۱۱۷۴/۵	۱۰۹۳۹/۵	هر دو
۱۰۳۰۹/۵	۱۱۰۳۹/۲	۱۰۸۵۷/۳	۱۰۶۲۸/۴	زنان
۱۰۷۳۶	۱۱۶۱۰/۳	۱۱۴۵۷/۳	۱۱۲۳۳	مردان



۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۷۶۸/۱	۹۱۱۰/۵	۷۹۷۸/۵	۹۳۰۲/۶	هر دو
۷۳۵۹/۸	۷۲۳۱/۹	۶۵۷۲/۸	۷۵۷۴/۵	زنان
۱۰۳۰۵/۵	۱۱۰۹۴/۶	۹۲۳۶/۵	۱۰۸۶۶/۷	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۷۶۳۴/۴	۷۳۲۹	۶۵۷۱/۴	۶۸۲۴	هر دو
۸۳۰۲/۳	۸۴۰۲/۹	۷۶۰۰/۲	۷۶۶۱/۴	زنان
۶۹۲۲/۴	۶۲۶۲/۱	۵۶۷۳/۵	۶۰۵۰/۴	مردان




۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۷۶۰۱/۹	۶۹۸۴/۵	۶۶۷۱/۵	۷۷۹۵/۴	هر دو
۸۴۴۲/۹	۷۸۲۰/۴	۷۷۱۴/۴	۹۱۲۶/۱	زنان
۶۷۱۸/۳	۶۱۸۷	۵۷۵۰/۵	۶۵۲۵/۸	مردان


۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۵۳۰۸	۵۳۵۱	۵۵۱۱/۵	۵۶۰۰	هر دو
۵۵۵۸/۱	۵۶۱۳/۳	۵۷۶۹/۱	۵۸۲۶/۱	زنان
۵۰۵۲/۳	۵۱۱۱/۶	۵۲۸۵/۳	۵۳۶۹/۷	مردان




Mental disorders
Female Male




Ischemic heart disease
Female Male




Falls
Female Male




Chronic obstructive pulmonary disease
Female Male



Stroke
Female Male



Alzheimer's disease and other dementias
Female Male



سیمای سلامت سالمندان

استان یزد

میزان مرگ و شیوع بیماری ها



سیمای سلامت سالمندان

استان یزد

(میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها)

در این بخش، جداول و نمودارهایی حاوی اطلاعات مرتبط با میزان مرگ و شیوع بیماری‌ها در کل جمعیت، سالمندان (افراد ۶۰ سال و بالاتر) و افراد غیر سالمند (کمتر از ۶۰ سال) ساکن در استان یزد و روند تغییرات شاخص‌های مربوطه در فواصل زمانی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ ارائه شده است. این اعداد و ارقام به تفکیک جنس و گروه‌های سنی بیان شده است. به منظور برقراری امکان استفاده از این داده‌ها در برنامه ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها جداول و نمودارهایی حاوی: اطلاعات مقایسه‌ای با شاخص کل کشور و مقایسه با استان‌های مجاور استان یزد شامل: استان‌های فارس، اصفهان، کرمان و خراسان جنوبی نیز تدوین و ترسیم شده است.

آمار و اطلاعات مندرج در این بخش بیانگر این مطلب است که شایع‌ترین علل مرگ در سالمندان ساکن استان یزد (هر دو جنس) براساس میزان در سال ۲۰۱۷، به ترتیب بیماری‌های غیرواگیر، بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای و سوانح و حوادث است. این شاخص در افراد غیر سالمند ساکن استان یزد به ترتیب، بیماری‌های غیرواگیر، سوانح و حوادث و بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای است و دارای الگوی متفاوت با سالمندان است.

روند زمانی تعداد مرگ به علت هر سه دسته اصلی بیماری‌ها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ در حال افزایش است. سالمندان ساکن در استان یزد و در سال ۲۰۱۷ از لحاظ میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت هر سه دسته‌ی بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای، بیماری‌های غیرواگیر و سوانح و حوادث از میانگین کشوری پایین‌تر هستند.

سالمندان ساکن استان یزد، از بین علل مختلف مرگ در اختلالات عصبی (زنان در سال ۱۹۹۰ و مردان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰)، دیابت و بیماری‌های کلیوی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، بیماری‌های مزمن تنفسی (مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷) و سوانح حمل و نقل (مردان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰) واجد رتبه‌ی ده و یا کمتر در بین استان‌های کشور بوده‌اند.

از نظر شیوع مشکلات سلامتی در سالمندان ساکن استان یزد، این گروه جمعیتی در سرطان‌ها (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و مردان در سال ۲۰۱۷)، دیابت و بیماری‌های کلیوی (زنان و مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۷)، بیماری‌های مزمن تنفسی (مردان در سال‌های ۱۹۹۰، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰)، سوانح حمل و نقل (مردان در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰) و سوانح غیر عمدی (مردان در سال ۲۰۰۰) یکی از ده استان دارای بالاترین شیوع در کل کشور بوده‌اند.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای بیماری ایسکمیک قلب، سکته، بیماری آلزایمر، عفونت‌های تنفسی تحتانی و افتادن کاهشی و برای دیابت نوع دو افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی مرگ به علت بیماری ایسکمیک قلب در زنان و مردان و بیماری آلزایمر در زنان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان یزد نسبت به تمام استان‌های مجاور در سال ۲۰۱۷ کمتر و به علت دیابت نوع دو در زنان و مردان بیشتر بوده است.

روند زمانی میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع به علت مشکلات سلامتی در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۱۹۹۰ (هر دو جنس) برای اختلالات اضطرابی، بیماری ایسکمیک قلب، سکته و بیماری آلزایمر کاهشی و برای اختلالات افسردگی، افتادن و بیماری مزمن انسدادی ریه افزایشی است.

میزان استاندارد شده‌ی سنی شیوع برای اختلالات روانی در زنان و مردان سالمند ۶۰ سال و بالاتر استان یزد در سال ۲۰۱۷ نسبت به تمام استان‌های مجاور کمتر و برای بیماری ایسکمیک قلب در زنان بیشتر بوده است.




تعداد و میزان^۱ مرگ به تفکیک گروه سنی در سال ۲۰۱۷ در استان

گروه سنی	جنسیت	همه علل		بیماری‌های واگیردار و تغذیه‌ای		بیماری‌های غیرواگیر		سوانح و حوادث	
		تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان
همه سنین	هر دو	۴۵۴۵	۳۸۹/۲	۳۲۲	۲۷/۶	۳۸۰۲	۳۲۵/۵	۴۲۱	۳۶/۱
	زنان	۲۰۶۴	۳۶۴/۷	۱۵۱	۲۶/۷	۱۸۰۶	۳۱۹/۱	۱۰۷	۱۹
	مردان	۲۴۸۱	۴۱۲/۲	۱۷۱	۲۸/۵	۱۹۹۵	۳۳۱/۶	۳۱۴	۵۲/۱
کمتر از ۶۰ سال	هر دو	۱۲۱۳	۱۱۴/۲	۱۹۰	۱۷/۹	۷۰۹	۶۶/۷	۳۱۴	۲۹/۶
	زنان	۴۱۹	۸۱/۷	۸۶	۱۶/۷	۲۶۳	۵۱/۳	۷۰	۱۳/۶
	مردان	۷۹۴	۱۴۴/۶	۱۰۴	۱۹	۴۴۶	۸۱/۲	۲۴۴	۴۴/۵
۶۰ سال و بالاتر	هر دو	۳۳۳۲	۳۱۵۷/۲	۱۳۳	۱۲۵/۶	۳۰۹۲	۲۹۳۰/۲	۱۰۷	۱۰۱/۴
	زنان	۱۶۴۵	۳۱۱۵/۵	۶۵	۱۲۲/۴	۱۵۴۳	۲۹۲۱/۱	۳۸	۷۱
	مردان	۱۶۸۷	۳۱۹۸/۹	۶۷	۱۲۷/۷	۱۵۵۰	۲۹۳۹/۲	۷۰	۱۳۱/۹
۶۰ تا ۶۴ سال	هر دو	۲۷۷	۸۳۴	۹	۲۶/۵	۲۴۸	۷۴۵/۸	۲۱	۶۱/۷
	زنان	۱۰۱	۶۲۸/۴	۳	۲۰/۹	۹۲	۵۷۴/۸	۵	۳۲/۷
	مردان	۱۷۷	۱۰۲۵/۲	۵	۳۱/۸	۱۵۶	۹۰۴/۹	۱۵	۸۸/۶
۶۵ تا ۶۹ سال	هر دو	۲۹۵	۱۲۲۱/۵	۱۰	۳۹/۷	۲۶۸	۱۱۱۱/۸	۱۷	۶۹/۹
	زنان	۱۱۴	۹۴۴/۴	۴	۳۰/۶	۱۰۶	۸۷۵/۷	۵	۳۸/۱
	مردان	۱۸۱	۱۴۹۹/۶	۶	۴۸/۹	۱۶۲	۱۳۴۸/۸	۱۲	۱۰۱/۹
۷۰ تا ۷۴ سال	هر دو	۳۳۹	۲۰۲۹/۱	۱۱	۶۶	۳۱۴	۱۸۸۰/۴	۱۴	۸۲/۷
	زنان	۱۶۰	۱۸۷۷/۱	۵	۶۱/۴	۱۴۹	۱۷۵۷/۶	۵	۵۸/۱
	مردان	۱۷۹	۲۱۸۶/۶	۶	۷۰/۹	۱۶۵	۲۰۰۷/۶	۹	۱۰۸
۷۵ تا ۷۹ سال	هر دو	۴۶۹	۳۷۴۷/۵	۱۶	۱۳۰/۳	۴۳۸	۳۴۹۸/۴	۱۵	۱۱۸/۹
	زنان	۲۲۹	۳۵۸۱/۳	۸	۱۲۱/۳	۲۱۶	۳۳۷۵/۶	۵	۸۴/۴
	مردان	۲۴۰	۳۹۲۱	۹	۱۳۹/۶	۲۲۲	۳۶۲۶/۴	۹	۱۵۴/۹
۸۰ سال و بالاتر	هر دو	۱۹۵۳	۱۰۲۹۸/۳	۸۷	۴۵۷/۹	۱۸۲۵	۹۶۲۴/۱	۴۱	۲۱۶/۲
	زنان	۱۰۴۲	۱۰۶۰۹/۴	۴۵	۴۵۹/۹	۹۸۰	۹۹۷۳/۲	۱۷	۱۷۶/۴
	مردان	۹۱۰	۹۹۶۳/۶	۴۲	۴۵۵/۹	۸۴۵	۹۲۴۸/۷	۲۴	۲۵۹/۱

امید زندگی (سال) در سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۷ در استان

جنسیت	بدو تولد		۶۰ تا ۶۴ سال		۶۵ تا ۶۹ سال		۷۰ تا ۷۴ سال		۷۵ تا ۷۹ سال		۸۰ سال و بالاتر	
	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۱۹۹۰
زنان	۷۱	۸۰	۱۷/۲	۲۳/۵	۱۳/۲	۱۹/۲	۹/۸	۱۵/۳	۶/۹	۱۱/۷	۵	۸/۹
مردان	۶۶/۵	۷۵/۸	۱۶/۱	۲۲	۱۲/۷	۱۸/۳	۹/۶	۱۵/۱	۶/۹	۱۱/۸	۵/۴	۹/۵

روند زمانی تعداد در مقابل میزان استاندارد شده سنی مرگ در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سطح ملی و استان



^۱ در این گزارش تمامی میزان‌ها در ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت گزارش شده‌اند.




میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

علت ^۲	زنان								مردان							
	۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷		۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷	
	میزان	رتبه ^۳	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه
بیماری‌های قلبی-عروقی	۲۳۶۱/۱	۲۷	۲۰۴۶/۱	۲۶	۱۸۰۰/۲	۲۷	۱۵۵۹/۳	۳۰	۲۸۸۹/۳	۲۰	۲۳۰۸/۸	۲۰	۱۸۰۴/۶	۲۸	۱۵۳۲/۴	۳۱
سرطان‌ها	۳۴۴/۸	۱۹	۳۰۴/۵	۲۱	۳۸۴/۷	۱۵	۳۵۵/۱	۲۶	۶۰۷	۱۸	۴۹۰/۵	۱۷	۵۲۲/۲	۲۷	۵۵۰/۱	۲۹
اختلالات عصبی	۳۴۳/۹	۱۰	۲۸۱/۵	۱۲	۳۴۵/۴	۱۸	۳۴۰/۱	۲۶	۳۲۹/۸	۶	۲۵۸/۹	۱۰	۲۵۷/۵	۱۶	۳۱۹/۲	۱۶
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۲۹۲/۷	۳	۳۰۰/۵	۳	۳۴۱/۹	۴	۳۲۰/۴	۶	۲۹۲/۱	۲	۲۷۳/۳	۲	۳۱۲/۹	۳	۲۹۶/۴	۶
بیماری‌های مزمن تنفسی	۱۸۴/۴	۱۵	۱۶۷/۲	۱۴	۱۷۰/۹	۱۲	۱۳۵/۸	۱۴	۴۵۱/۴	۵	۳۴۷/۱	۶	۲۸۱/۴	۷	۲۳۱/۴	۹
بیماری‌های گوارشی	۹۷/۶	۲۰	۶۳/۵	۲۵	۶۹/۱	۲۶	۶۱	۳۱	۱۴۶/۳	۱۳	۹۱/۳	۱۹	۷۹	۲۵	۸۷/۶	۲۳
سوانح حمل و نقل	۴۷/۶	۲۰	۴۳/۸	۱۹	۴۴/۶	۱۵	۳۲/۹	۲۴	۱۹۰	۹	۱۶۲/۹	۷	۱۱۱/۳	۱۷	۷۵/۴	۲۴
سوانح غیرعمدی	۴۸/۶	۲۱	۳۸/۴	۲۱	۳۸/۷	۱۸	۳۲/۶	۲۶	۸۵/۸	۱۱	۶۶/۷	۱۳	۵۶/۴	۱۸	۴۹/۵	۲۵

میزان استاندارد شده سنی **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در استان

مشکل سلامتی	زنان								مردان							
	۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷		۱۹۹۰		۲۰۰۰		۲۰۱۰		۲۰۱۷	
	میزان	رتبه ^۴	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه	میزان	رتبه
بیماری‌های قلبی-عروقی	۳۱۸۳۹/۳	۲۵	۳۱۷۸۸/۵	۲۱	۳۱۷۹۸/۵	۲۱	۳۱۷۴۳/۲	۲۴	۳۰۴۲۴/۶	۲۷	۳۰۶۵۳/۳	۲۳	۳۰۹۵۴/۳	۲۶	۳۰۰۹۲/۳	۳۰
سرطان‌ها	۱۳۷۲/۵	۸	۱۵۲۵/۳	۸	۲۳۱۳/۶	۷	۲۳۶۸/۷	۱۳	۲۰۸۸/۴	۱۰	۲۴۱۵/۴	۷	۳۱۹۱/۵	۷	۴۰۴۵	۶
اختلالات عصبی	۵۱۶۵۲/۶	۳۱	۵۲۱۱۴/۹	۳۱	۵۲۵۳۴/۷	۳۱	۵۲۵۲۹/۷	۳۱	۴۸۲۹۱/۳	۳۱	۴۹۱۹۹	۳۱	۴۹۲۷۲	۳۱	۴۹۲۶۸/۵	۳۱
دیابت و بیماری‌های کلیوی	۴۹۹۷۱/۳	۸	۵۱۲۶۵/۲	۵	۵۴۱۱۱/۴	۶	۵۹۰۱۵/۸	۹	۴۲۳۵۰/۱	۷	۴۳۵۸۶/۳	۶	۴۵۳۵۲	۵	۴۸۶۶۳/۳	۸
بیماری‌های مزمن تنفسی	۱۵۹۶۳/۳	۱۶	۱۵۹۲۹	۱۴	۱۶۴۳۴/۸	۱۳	۱۵۱۶۸	۱۵	۱۵۵۱۳/۲	۶	۱۴۴۴۴/۶	۷	۱۳۷۳۸/۲	۸	۱۳۲۱۵/۱	۱۱
بیماری‌های گوارشی	۴۶۳۲۳/۸	۲۳	۴۷۵۹۵/۷	۲۱	۵۱۱۱۷/۶	۲۰	۵۲۹۴۸/۵	۲۳	۵۷۴۹۸/۴	۲۱	۵۹۶۸۱/۶	۱۶	۶۳۲۵۱	۱۷	۶۶۵۴۱/۶	۱۷
سوانح حمل و نقل	۷۱۹۵/۸	۲۰	۶۹۸۶/۱	۱۴	۷۱۶۸/۹	۱۷	۵۸۹۳/۵	۲۵	۱۲۴۷۶/۸	۸	۱۲۴۳۹/۴	۶	۱۱۵۶۰/۷	۱۱	۸۸۵۴/۶	۲۷
سوانح غیرعمدی	۲۲۸۰۲	۱۶	۱۹۵۹۷/۶	۱۹	۲۰۸۴۵/۶	۲۱	۲۱۸۷۰/۹	۱۷	۳۳۳۸۰/۲	۱۲	۲۹۸۰۰	۱۰	۳۲۲۸۲/۸	۱۳	۲۹۳۹۱/۳	۱۹

میزان استاندارد شده سنی **مرگ** به تفکیک علل اصلی و **شیوع** به تفکیک مشکلات سلامتی در بین افراد ۶۰ سال و بالاتر در سال ۲۰۱۷ در سطح ملی و استان




^۲ علل براساس میزان استاندارد شده سنی مرگ در سال ۲۰۱۷ و هر دو جنسیت در سطح ملی مرتب شده‌اند.


^۳ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی مرگ به تفکیک علت، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.

^۴ رتبه استان‌ها براساس بیشترین به کمترین میزان استاندارد شده سنی شیوع به تفکیک مشکل سلامتی، جنسیت و هر سال از ۱ تا ۳۱ گزارش شده است.







جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۵۳۱/۸	۱۳۲۸/۲	۸۷۵/۴	۷۶۶/۱
زنان	۱۳۱۵/۴	۱۱۸۰/۸	۸۱۳/۲	۷۳۲/۳
مردان	۱۸۳۸/۶	۱۴۸۷/۱	۹۲۸/۸	۷۹۸/۳




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۸۱۵/۷	۶۷۴/۹	۵۴۸/۲	۴۱۴/۳
زنان	۷۹۱/۶	۶۷۴/۹	۵۶۰/۱	۴۳۳/۸
مردان	۸۶۴/۱	۶۷۱/۲	۵۲۷/۵	۳۹۲/۷




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۳۰۶	۲۴۳/۷	۲۷۰/۲	۲۹۱/۹
زنان	۳۱۸/۲	۲۵۸/۵	۳۱۴/۷	۳۱۰/۷
مردان	۲۸۵/۱	۲۲۰/۲	۲۱۴/۵	۲۷۴/۴



جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۶۱/۳	۱۸۵/۹	۲۲۴/۷	۲۰۴
زنان	۱۶۵/۲	۲۰۲/۳	۲۴۱/۴	۲۱۹/۸
مردان	۱۵۸/۶	۱۶۸/۱	۲۰۵/۸	۱۸۷/۴




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۲۸/۳	۱۱۱/۵	۱۱۲/۴	۹۸/۴
زنان	۱۱۵/۵	۱۰۲/۹	۱۰۷/۵	۹۴/۵
مردان	۱۵۱/۴	۱۲۲/۵	۱۱۶/۳	۱۰۲/۹




جنسیت	۱۹۹۰	۲۰۰۰	۲۰۱۰	۲۰۱۷
هر دو	۱۹/۱	۱۷/۸	۱۸/۶	۱۶/۴
زنان	۱۳/۲	۱۲/۵	۱۵/۳	۱۳/۵
مردان	۲۷/۳	۲۴	۲۱/۹	۱۹/۴




Ischemic heart disease
Female Male




Stroke
Female Male




Alzheimer's disease and other dementias
Female Male




Diabetes mellitus type 2
Female Male





Lower respiratory infections
Female Male





Falls
Female Male







اختلالات افسردگی				اختلالات اضطرابی				جنسیت
۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	
۵۸۴۹/۳	۵۸۰۳/۶	۵۷۰۱	۵۷۴۵/۷	۶۴۶۱	۶۶۷۵	۶۵۰۰/۳	۶۵۹۸/۳	هر دو
۶۸۵۱/۵	۶۷۹۶/۹	۶۶۷۳/۶	۶۶۷۱/۶	۸۲۰۴/۷	۸۳۹۳/۷	۸۲۵۲/۸	۸۲۷۱/۴	زنان
۴۸۵۳	۴۷۴۶/۱	۴۷۲۳/۱	۴۷۴۴/۳	۴۷۱۷/۷	۴۸۴۴	۴۷۲۳	۴۷۵۲/۷	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۱۰۳۶۸/۵	۱۱۱۸۴/۶	۱۱۰۷۲/۴	۱۰۷۰۶/۲	هر دو
۱۰۱۶۳/۴	۱۰۹۲۱/۲	۱۰۷۹۲/۷	۱۰۴۴۹/۲	زنان
۱۰۵۷۴/۵	۱۱۴۶۶/۶	۱۱۳۶۶/۳	۱۱۰۰۴/۸	مردان



۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۵۱۶/۱	۸۶۷۹/۷	۷۵۲۳/۵	۸۴۲۲/۷	هر دو
۷۳۹۲/۷	۶۹۹۴/۹	۶۱۲۹/۲	۶۸۹۵/۲	زنان
۹۶۴۶/۲	۱۰۴۷۴/۱	۸۹۸۷/۹	۱۰۱۶۱/۸	مردان







۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۸۴۰۹/۷	۸۸۵۷/۳	۸۳۱۴/۶	۸۰۵۲/۵	هر دو
۸۹۵۹/۷	۹۷۱۰	۸۹۳۱/۷	۸۴۶۷/۴	زنان
۷۸۵۹/۶	۷۹۶۳/۴	۷۶۹۶/۵	۷۶۲۷/۷	مردان



۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۶۵۸۶/۸	۶۸۴۴/۵	۶۷۹۵/۹	۷۱۶۷	هر دو
۷۳۵۶/۵	۷۳۲۴/۷	۷۴۰۷/۲	۷۹۷۹/۴	زنان
۵۷۹۳	۶۳۲۱/۵	۶۱۳۰/۱	۶۱۴۱/۱	مردان

۲۰۱۷	۲۰۱۰	۲۰۰۰	۱۹۹۰	جنسیت
۵۳۱۵/۹	۵۳۸۹	۵۵۵۲/۶	۵۶۳۵/۸	هر دو
۵۵۷۶	۵۶۴۹/۶	۵۷۹۹/۶	۵۸۳۳/۴	زنان
۵۰۴۱/۵	۵۱۰۴	۵۲۶۱/۲	۵۳۵۲	مردان







Ministry of Health & Medical Education
Population, Family & School Health Office
Elderly Health Department

Health Profile of Older Adults

Mortality Rate and Prevalence of Diseases

Farshad Farzadfar
Sahar Saeedi Moghaddam
Mohsen Shati
Seyede Salehe Mortazavi

Publisher: Andisheh Mandegar
First edition, 2022
ISBN: 978-622-5447-00-4
Printed in: Tehran, Iran

Health Profile of Older Adults

Mortality Rate and Prevalence of Diseases



مرکز تحقیقات بیماری‌های غیر واگیر
پژوهشگاه علوم و فناوری‌های سلامت